

Demo af intensive dyrkningssystemer i blommer

Nyt fra projektet august 2023



Arealet 23. august. Træer til spindel th. og til espalier tv.

Vækst

Der har været god vækst i træerne og væksten er ikke helt stoppet for nogle af træerne. Skudvæksten vil blive målt, når væksten er stoppet for at kunne demonstrere sorterens tilvækst og evne til at fylde de forskellige systemer ud. Vækst er hovedfokus ved nyetablering og derfor kan den sene vækst gå an. Generelt ønskes en tidligere afmodning, så energien kan gå til knopdannelsen. Beskæringen er planlagt til vinter/tidlig forår for sikre god vækstreaktion.

Tidspunkt	Vinter	Vinter - forår	Forår	Sensommer
	Okt - feb	Feb. - april	April - maj	- September
Størrelsesorden af vækstreaktion	↑	↑	↑	↑

Sammenhængen mellem tidspunkt for beskæring og vækstreaktion. Størst reaktion ved beskæring vinter men her er det vigtigt at tænke forebyggelse af bakteriekræft. Vinter skal der som udgangspunkt være minimum 5 dages tørvejr efter beskæring

Demo af intensive dyrkningssystemer i blommer

Nyt fra projektet august 2023

Ved beskæringen 17. maj blev der lavet øjesnit i bunden for at prøve at stimulere dannelsen af bundgrene. Det er lykket for en del træer, men reaktionen har været forskellig mellem træer og sorter. Ved næste vil beskæringen igen målrettes formning til henholdsvis spindel og espalier systemet.



Topend Plus 23. august, hele træet tv. med både tilstrækkeligt med grene i bund, midt og top og bunden th., hvor det er lykket at få tilstrækkeligt med grene ved at lave øjesnit ved beskæringen 17. maj. Det er ikke alle sorter, der har reageret lige villigt på øjesnit.

Etablering til spindel

Formning af træer til spindel handler om at sigte mod et træ med en "bredere" bund med minimum 3 og optimalt 4-5 bundgrene, en midter sektion med et antal "kortere" grene og en smal top med en topgren.

Demo af intensive dyrkningssystemer i blommer

Nyt fra projektet august 2023



Her et godt eksempel på en god vækstreaktion målrettet spindel. Her er det sorten Katinka, hvor der er skabt basis for et antal grene i bund og midte samt valgt en top.

Demo af intensive dyrkningssystemer i blommer

Nyt fra projektet august 2023

Etablering til espalier

Formning af træer til espalier sigter mod at have to sidegrene i flere højder fra bunden. To sidegrene i ca. 70 cm's højde bindes i V-form i rækkens retning samt to sidegrene i forskellig højde på hovedstamme, som lov at vokse ud og fylde en "væg af frugt" ud. Det er disse sidegrene, der bliver de bærende hovedgrene.



Her et godt eksempel på en god vækstreaktion målrettet espalier. Her er det igen sorten Katinka, hvor der på billedet tv. ses bundgrene hvor de to vil blive valgt og bundet i v-form i rækkens retning, på billedet i midten er der lige de to grene, der skal være og på billedet th. skal der vælges to grene, som også bindes i v-form. De grene, der vælges, vil være de bærende hovedgrene.