


Behandlingsmuligheder økologiske æbler 2019

Udvikling	Skadevolder	Produkt	kg/ltr pr. ha	Bemærkning	
	Grøn spids	Skurv	Kumulus S	4	Maksimalt 4 behandlinger pr. sæson ved præventiv behandling (6 kg/ha). Den maximale total dosering må ikke overstige 24 kg pr. ha pr. sæson. Minimum 7 dage mellem behandlinger. Sprøjtefrist 7 dage.
		Æg af spindemider	Fibro olie	20-30	Vandmængde: 100 l/ha pr. 2 l Fibro. Max. 1 behandling pr. år. Fibro olie brugt mod vinteræg af frugttræspindemider har sideeffekt mod æg af tæge og skjoldlus. Svovl og olie må ikke blandes.
	Museøre	Bladlus og æblesnudebille	Spruzit Neu	5 pr. m. kronehøjde	Max. 4 behandlinger med 7 dages interval. 3 dages behandlingsfrist
	Grøn knop	Skurv	Kumulus S	4	Maksimalt 4 behandlinger pr. sæson ved præventiv behandling (6 kg/ha). Den maximale total dosering må ikke overstige 24 kg pr. ha pr. sæson. Minimum 7 dage mellem behandlinger. Sprøjtefrist 7 dage.
		Skurv (kurativt)	Natron	2,5-5	Natron er basisstof. Bruges på våde blade. Max. 1% opløsning max. Max 8 gange med 10 dages interval. Bicarbonat kan kun blandes med svovl.
	Tæt klynge - Rød knop	Larver af bladviklere, ugler og målere	Turex WG/WP	1-2	1 kg/ha ved blanding med Neem Azal. Turex virker bedst over 15°C og på små larver.
		Bladlus og minerfluer	NeemAzal-T/S	3	Når blomsterfarven kan ses i de tidlige sorter. Vandmængde 600-1.000 l/ha. Max. 1 behandling hvert 3. år. Pas på afdrift af Neem til pære!
		Skurv og meldug	Kumulus S	4,0	Meldug er aktiv, når det er lunt og tørt. Skurv bekæmpes før regn eller i sporespiringsvinduet.
		Skurv (kurativt)	Natron	2,5-5	Natron max. 1% opløsning. Max 8 gange med 10 dages interval.
	Ballon	Æblebladhveps			Opsæt hvide limplader før blomstring.

	Blomstring	Skurv (kurativt)	Armcarb 85 SP/Natron	5,0/2,5-5	Armcarb må først bruges fra starten af blomstring. Bruges på våde blade og i 1000 l/ha for at sikre en god befrugtning. Max. 8 behandlinger. Natron max. 1% opløsning. Kumulus S må ikke bruges under blomstring.
	Ablomstring	Larver af ugle og hækvikler	Turex WG/WP	2	Turex virker bedst over 15°C og på små larver.
		Æblevikler og bladviklere	Isomate	800-1000 dispensere	Opsæt feromonfælder for æblevikler inden medio maj og for bladviklere inden 1. juni. Opsæt feromonforvirring før flyvning begynder. Afhængigt af smittetryk kombineres med anden behandling.
	Dunet frugt	Skurv og meldug	Kumulus S	4,0	Maksimalt 4 behandlinger pr. sæson ved præventiv behandling (6 kg/ha). Den maximale total dosering må ikke overstige 24 kg pr. ha pr. sæson. Minimum 7 dage mellem behandlinger. Sprøjtefrist 7 dage.
		Æbleviklerlarver	Madex Top	0,05-1	Flere behandlinger nødvendigt.
	Glat frugt til høst	Skurv (kurativt)	Armcarb 85 SP/Natron	5,0/2,5-5	Armcarb max. 8 behandlinger med min. 7 dages interval. 1 dags behandlingsfrist. Natron max. 1% opløsning. Max 8 gange med 10 dages interval. 1 dags behandlingsfrist.
		Sodplet	Armcarb 85 SP	5	Mindre anvendelse. Natron brugt mod skurv har sideeffekt mod sodplet.
		Æbleviklerlarver	Madex Top	0,05-1	Flere behandlinger nødvendigt.
		Sene viklere	Turex WG/WP	2	Turex virker bedst over 15°C og på små larver.
	Efter høst-bladfald	Frugttrækræft	Calciumhydroxid	15-25	Læsket kalk. Basisstof. Max. 7 gange med 5-14 dages interval. Fra bladfald til ultimo december.
		Hjortevildt	Trico	15-20	Afskrækningsmiddel til hjortevildt. 15-20 l/ha i op til 75 liter vand.