

KONVENTIONEL

INDHOLD:

KONVENTIONEL	1
Sætning - Udtynding	1
Pærer	1
Elstar	2
Larver i æbler	3
Lus i pærer	3

Sætning - Udtynding


- **Nogle sorter ser ud til at have et uventet stort drys nu efter blomstring.** Det er nærliggende at pege på (for hård) kemisk udtynding som årsagen, men der ses også drys i ubehandlede marker.
- **Inden der køres (mere) udtynding så sørg for at mærke/se efter, om blomster/frugter let kan pilles af! På afstand kan det nemlig se ud som om, der er behov for (mere) udtynding, men når man skubber til blomsterne/de mindste frugter, falder de af. Før man kører udtynding, skal man være HELT SIKKER på, at der stadig er et stort udtyndingsbehov. Se efter hvor mange veludviklede frugter som sidder tilbage i hver klase og hvor tæt klaserne sidder.**
- Regn med at der går omkring 2-3 uger fra behandling med Cerone/Pomoxon Extra til effekt kan ses.
- Læs om udtynding af Clara Frijs og Elstar i [ÆblepæreNYT 17 2022](#).

Pærer

- Clara Frijs, som ikke er kemisk udtyndet, drysser - dog ikke så meget som behandlede træer.
- Lucas drysser også.



Clara Frijs. Billeder fra ubehandlede træer. Mange steder er det midtblomsten, som falder af.



Lucas. Kraftigt drys nogle steder. Her er halvdelen faldet af ved berøring.

Elstar

- Udtynding og vækstregulering er modsatrettede tiltag:
- Behov for (mere) udtynding vil bero på, hvor meget der allerede er udtyndet og hvor mange frugter, som sidder tilbage nu.
- **Regalis Plus/Kudos er aktuelt, hvis udtyndingen har virket for kraftigt og/eller der drys-ser meget af.** Midlerne fremmer ikke sætningen direkte, men vil dæmpe tilvæksten og derigennem mindske yderligere drys.
- Hvis der allerede er behandlet, kan der behandles anden gang i hele træet med 0,75-0,8 kg/ha.
- Hvis der ikke er behandlet før, eller hvis der er forventning om kraftig tilvækst, kan doseringen øges til 1-1,25 kg/ha ved behandling af hele træet.
- Kudos bør tilsættes MAP 2 kg/ha.
- Regalis Plus/Kudos anbefales ikke i pærer.



<<< Elstar. Frugter, som er relativt store nu, og hvor der sidder mange veludviklede frugter i hver klase og hvor klaserne sidder tæt, kan have behov for udtynding, specielt hvis der ikke allerede er kørt udtynding.

Elstar. Ved stort drys, eller hvis der mange steder udgår 2 frugtpudeskud (tegner til et betydeligt junifald) kan det være aktuelt med Regalis Plus/Kudos nu. >>>



Larver i æbler

- Der er flere eksempler på, at 1 behandling med Lamdex før blomstring ikke har givet tilstrækkelig god bekæmpelse. Heller ikke selvom der har været brugt feromonforvirring de sidste sæsoner - dette burde bidrage til at holde populationen nede.
- Denne erfaring peger derfor i retning af 2 sprøjtninger før blomstring med 10-14 dages mellemrum i 2023.
- Hvis larverne på nuværende tidspunkt har spundet sig ind, kan der ikke forventes effekt af behandling, og behandling kan ikke anbefales.



Larver, som har spundet sig ind, sidder for godt beskyttet til, at man kan forvente tilstrækkelig effekt af behandling nu.



De forpupper sig og vil komme frem som voksne, der lægger æg henover sommeren (sene viklere).

Lus i pærer

Røde lus

- Enkelte steder er set røde lus i pærerne.
- Det er ikke rød æblebladlus, som bare er flyttet over i pærerne, men en specifik art, som lever i pærer. Livscyklussen minder om den for rød æblebladlus.
- Røde lus i pærerne vil ofte være begrænset til kraftige angreb i enkelte træer, men kan i nogle tilfælde også sprede sig til nabotræer. Den producerer store mængder honningdug. I løbet af sommeren flyver den til sin sommervært.
- Ved behov for bekæmpelse vælges Movento, hvis der også er behov for bekæmpelse af pærebladlopper.
- Hvis der ikke er bladlopper, kan Teppeki vælges. Tilsæt i begge tilfælde sprede/klæbemidlet Pronet Alfa (1-2 liter/ha). Brug ikke Mospilan i pærerne.
- Forvent ikke tilstrækkelig effekt af Siltac, da lusene sidder godt gemt inde i de krøllede blade.

Grønne lus

- Grønne lus i pærer ses sjældent som et problem.
- Bekæmpelsesstrategien svarer til strategien mod de røde lus i pærer jf. ovenstående.

Se billeder på næste side...



Røde lus i pærerne vil ofte være begrænset til kraftige angreb i enkelte træer, og så er behandling ikke nødvendigt. Ved omfattende angreb bør behandles.



Grønne lus i pærer ses sjældent som et problem.



Maya Bojesen
Tlf. 21 71 77 57
myb@hortiadvise.dk



Hanne Lindhard Pedersen
Tlf. 23 82 63 47
hlp@hortiadvise.dk