

Busk- og stenfrugtNYT

Nr.10 //10. november 2023.



Aronia kan få de smukkeste efterårsfarver. Foto: Stine Bach Nielsen

Efter en unormal varm september er det blevet almindeligt efterår. Både Stevnsbær og buskfrugt har næsten tabt bladene. For at øge omsætningen af bladene og dermed reducere smittetrykket fra kirsebærbladplet og skivesvamp til næste år er det vigtigt at slå græsset og også gerne udføre mekanisk ukrudtsbekæmpelse i busk- og træækkerne. Det sidste jo specielt i økologisk produktion.

Aktuelt

Sæsonen er nu ovre, og bladene falder af. Arbejdet i marken minimeres, og det væsentlige lige nu er ukrudtsbekæmpelse. Se nyhedsbrev nr. 9 for vejledning.

Det er meget vådt i Jylland. Der er faldet mere regn end normalt. I resten af landet er nedbøren mere normal for årstiden. Det er lunest i det sydlige Danmark med 9-10 °C. I Midt- og Nordjylland er det under 7-8 °C.

Kilde: <https://www.dmi.dk/vejrarkiv/>

Økologisk

Grøngødsning til buskfrugt

Aronia (surbær) er en afgrøde, som i Danmark dyrkes på 90 ha, hvoraf 51 ha (57 %) dyrkes på økologiske arealer. Den største avler har ca 38 ha.

HortiAdvice har i år etableret demonstration af effekten af brug af grøngødning til økologiske aronia. Der er sået kvælstofsamlende afgrøder i buskrækken, foretaget indkast af afklip fra køregangen og sammenlignet med tilførsel af gylle. 2023 var 2. år. Demonstrationen fortsættes ikke i 2024. Tak til Produktionsafgiftsfonden for Frugt og gartneriafgrøder

Resultaterne i år tyder på at mekanisk henhold giver det største udbytte.

Nyt om kulturerne

Buskfrugt

Solbær

Solbærknopgalmider: Angrebne knopper begynder at kunne ses nu, og gennemgang af områder og bortklipping kan starte op allerede i december, hvilket kan være særligt aktuelt i områder med stort angreb. Angrebne knopper vil dog være nemmere at se senere på vinteren. Angrebne knopper skal fjernes inden foråret for at undgå spredning. På billedet herunder ses store runde knopper som følge af knopgalmideangreb.



Hvis det ikke allerede er gjort, kan der beskæres gennem hele vinteren og før knopbrydning. Beskær ikke lige før udbringning af jordmidler.

Stenfrugt

Beskæring

Det anbefales generelt ikke at begynde beskæringen før sidst i februar – først i marts, og tørt vejr anbefales altid pga. bakteriekræft. Risikoen for sygdomme efter beskæring er størst i vådt og fugtigt vejr i vinterperioden, hvor sårhelingen sker langsommere. Anbefalingen ved beskæring er derfor som minimum fem dages tørvejr ved beskæring om vinteren modsat to dage om sommeren, hvor helingen sker hurtigere.

Hvis der startes op på beskæringen tidligere, bør beskæringen planlægges til perioder med tørt vejr. Samtidig er det værd at huske, at jo mere vækstreaktion, der ønskes, og jo svagere træerne er, jo tidligere skal der beskæres. Den største vækstreaktion fås i vinterperioden – den laveste lige efter høst.

Arrangementer

Busk- og stenfrugtNYT

Nr.10 //10. november 2023.

8. februar 2024

Noter datoen. **Sprøjteopdateringskursus Odense.** Kernefrugt, busk- og stenfrugt og bær.

Konsulent



Hanne Lindhard Pedersen

Mobil: 23826347

hlp@hortiadvic.dk

Hortiadvic tager forbehold for tastefejl og lign. Nyhedsbrevet må ikke videresendes. Hortiadvic har copyright på billederne.