


Øko Temadag
13. November 2023
på
Pometet

*Københavns Universitet, KU
Institut for Plante og Miljøvidenskab*


Rasmus Madsen, Helle Mathiasen og
Hanne Lindhard, HortiAdvice

Overvågning viklere i to forskellige marker




Ingen fangster af æblevikler og frugtskrælvikler



Overvågning viklere i to forskellige marker





Overvågning i læhegn

Overvågning rød og grå knopviklere i to forskellige marker







Rød knopvikler




Viklerfangster 1 mark



Frugtskader 2022





Figur fra Lars Stubsgaard, Borregård Bioplant.

Bekæmpelse:

Capex:

Capex (virus) og Turex er til rådighed i Danmark.

Capex optages ved at larverne spiser af behandlede blade og får virus i tarmen. Capex har ret lang virkningstid (> 7-14 dage), hvis det sprøjtes på tørre plantedele. Behandling skal ske på tørre blade.


Bt-middel TUREX:

Turex: Normalt anbefales en minimumtemperatur på 15°C for effekt af Bt. I det larverne skal være aktive, for at æde blade med Bt på. Ædegift. Turex har ret kort virkningstid: 3-4 dage. Turex virker også på forholdsvis store larver! Turex og Capex kan blandes.

Forebyggelse:

Undgå for kraftig skudvækst forår/forsommer. Larverne kan godt lide at være i skudspidser, så brug N med måde, evt. rodbeskæring og evt. sommerbeskæring til at fjerne skudspidser med larver.

Feromonforvirring som standard



Madex ud fra skadeshistorik og RimPro
Nemapom?