


Lagring - luft ud


Avlere, der lagrer frugt på kølelager hjemme, bør være opmærksomme på jævnligt at lufte ud på lageret. Der sker altid udvikling af gasarten ethylen på lageret. Udviklingen sker i takt med at frugten eftermodner. Ethylen øger frugtudviklingen i lageret. Koncentrationen af ethylen kan reduceres, hvis kølelageret jævnligt udluftes.

Svampesprøjtninger


Husk at de regelmæssige sprøjtninger mod skurv i løbet af sensommeren vil have sideeffekt på sodplet. Der er fare for infektioner af sodplet, når der er lange fugtige perioder og hvor frugten er våd i én til flere dage. Det er typisk de samme perioder, hvor der er fare for skurvinfektioner på frugten.



Varsling af sodplet (sooty blotch) i RIMpro. Når det gælder sodplet, går der forholdsvis lang tid fra infektionen sker, til angreb kan ses. De jævnlige svampesprøjtninger vil have sideeffekt på sodplet. Svovl har ingen sideeffekt på sodplet.



Varsling af skurv i sekundærsæsonen i RIMpro. Hvis der er skurv i plantagen, vil der ved længerevarende perioder med fugtighed være fare for skurvinfektioner på frugten.



Varsling af frugttrækæft i RIMpro. De små sår efter plukningen er indfaldsport for sygdommen. Er der sår og fugtighed opstår der infektionsfare.

Vanding efter høst

Hvis der er vandingskapacitet til det, er det en fordel at fortsætte vandingen af træerne efter høst (medmindre vi får yderligere/betydelige mængder regn), da det vil hjælpe træerne til at opbygge reserver og danne blomsterknopper til næste år.

KONVENTIONEL

Læs om bladprøver, sene viklere, svampesprøjtninger og calcium i [Æble/PæreNYT nr. 18 2018](#).

Cerone - vær obs på plukketidspunktet

Er der brugt høje doseringer af Cerone, kørt flere gange og/eller er der behandlet på et sent tidspunkt, bør man holde ekstra godt øje med frugtens modningsudvikling, så man undgår at blive overrasket, hvis frugten modner nogle dage tidligere end forventet.

Cerone

I december 2017 indsendte Michael Nielsen/Grøn Plantebeskyttelse ansøgning om godkendelse til mindre anvendelse af Cerone til farvedannelse (før høst) i æbler og til blomsterknopdannelse i pærer (efter høst). Det var altså nu vi gerne skulle have haft godkendelsen på plads, men ansøgningen ligger fortsat til behandling i Miljøstyrelsen, så Cerone til de nævnte anvendelser er ikke tilladt.