


FÆLLES

Skurv

- Det er en udfordring at planlægge skurv-sprøjtningerne dette forår. Vejrudsigten ændrer sig fra time til time. Der bliver meldt om regn som ikke kommer, og der kommer regn som ikke er varslet. Sørg så vidt det er muligt for at være på forkant med sprøjtningerne.
- Når der på fruitweb/RIMpro ses situationer med lav infektionsfare så husk at det er målinger fra 1 sensor/klimastation som afgør infektionsfaren. Små afvigelser i plantagen fra det som sensor/klimastation registrerer, vil påvirke den reelle infektionsfare i træerne.
- Om lav infektionsfare har betydning, afhænger af smittetrykket og af sortens modtagelighed. I modtagelige sorter og smittetryk fra sidste år må der ikke ses bort fra lave infektionsværdier.
- Bemærk! I RIMpro går grænsen for lav infektionsfare ved 100 RIM (vi har hidtil regnet værdier under 300 RIM for lav infektionsfare).
- Husk at den fremadrettede varsling i RIMpro og Fruitweb bygger på vejrudsigter, så når vejrudsigten ændrer sig, ændres varslingen tilsvarende.

INDHOLD


FÆLLES	1
Skurv	1
Meldug	2
Pærebladhvepse	2
Æblebladhveps	3
Feromonforvirring	3
Nyplantninger vanding	3
Maskinbeskæring	4
KONVENTIONEL	5
Skurv	5
Meldug	5
Merpan	5
Rød æblebladlus	5
Larver	6
Spindemider (rødt spind)	6
Pæregalmug/Pærehveps	6
Bladgødsning	7
Clara Frijs - ATS	7
Pærer - ekstra gødning	8
Jern til pærer	8
ØKOLOGI	9
Meldug	9
Skurv	9
Pærebladhvepse	9
Røde æblebladlus	9
Larver	10
Persondataforordningen	10



Varsling af skurv i RIMpro på Årslev. Bemærk at grænsen for lav infektionsfare indikeres ved værdier under 100 RIM.

Meldug

- Meldug overvintrer i knopperne og kan ses nu hvor knopperne folder sig ud.
- Klip meldugsskud væk så snart de er fremme for at reducere smittetrykket. Det er første forudsætning for god bekæmpelse. Ved højt smittetryk er det så godt som håbløst at holde melduggen i skak med sprøjtning alene.
- Når der kommer nye blade frem, er disse modtagelige for meldug.
- Frigivelse af sporer sker om dagen når det er tørt og varmt (temperaturen skal være over 15 °C).
- Sporerne spirer om natten når der er høj luftfugtighed.
- Regn ødelægger spore-strukturerne.
- Når temperaturen stiger vil melduggen blive aktiv.



Pærebladhvæpse

- På Fyn er der fanget pærehveps på hvide limplader de sidste dage.
- Pærehvepsens flyvning/æglægning sker på "hvid knop"/"lille ballon" og er meget kortvarig. Æggene begynder at klække i løbet af blomstringen.

(se billeder på næste side)

ØKOLOGI

Meldug

- Meldug overvintrer i knopper og begynder at kunne ses nu, hvor knopperne folder sig ud. Klip meldugsskud væk så snart de er fremme for at reducere smittetrykket. Det er første forudsætning for god bekæmpelse. Ved højt smittetryk er det så godt som håbløst at holde melduggen i skak med sprøjtning alene!
- Frigivelse af sporer sker om dagen når det er tørt og varmt (temperaturen skal være over 15 °C).
- Sporerne spirer om natten når der er høj luftfugtighed.
- Regn ødelægger spore-strukturerne.
- Ved bekæmpelse af skurv med en blanding af 4 kg svovl og 5 kg bagepulver (Armcarb) er der god sidevirkning på meldug. Svovlen beskytter mod infektioner og bagepulver reducerer mængden af sporer, der udslynges fra allerede etablerede infektioner.

Skurv

- Er man i tvivl om, hvorvidt der kommer infektion, kan man sprøjte i hver 2. række. Hvis der så kommer regn, skal der efterfølgende sprøjtes i de resterende rækker når varslingen viser 'spiringsvindue'.
- Hvis det rent praktisk er muligt er det mest effektive at behandle med svovl i spiringsvinduet.
- Hvis man er lidt sent ude kan svovl med fordel blandes med bagepulver (Armcarb), som har en mindre kurativ virkning.
- For at få en god virkning skal bladene være våde ved brug af bagepulver.

Pærebladhvæpse

Der er fanget pærebladhvæpse på hvide limplader de sidste dage.

Hvis der bekæmpes med Spruzit Neu mod grønne æblebladlus eller æblesnudebille vil der være sideeffekt mod de voksne pærebladhvæpse.

Pærebladhvæpse er lidt mindre og mørkere end æblebladhvæpse.

Røde æblebladlus

- Hvis I havde problemer sidste år kan der bekæmpes med 3 kg NeemAzal-TS. Det er moderlusen, som skal bekæmpes. Behandling udføres når blomsterfarven kan ses i de tidlige æblesorter. Hvis der også er problemer med frostmålere kan der blandes med ½ dosering Turex.
- Neem er meget skadeligt for Conference pærer, pas på vinddrift.
- Brug kun Neem når det er meget nødvendigt. Der må maksimalt udføres én behandling hvert 3. år! Husk at etablere blomsterstriber til at reducere smittetryk af røde æblebladlus.