

FÆLLES

Frugtsætning

Følgende forhold gør at vi generelt forventer stor frugtsætning i år:

- Moderat frugtbelastning sidste år.
- Mange blomster i år.
- Godt vejr under blomstringen i år: bier og andre bestøvende insekter er aktive og det giver god bestøvning. Befrugtningen dvs. pollenets vækst ned til frugtknuden går hurtigt, når det er varmt. Høj lysindstråling til bladene fotosyntese giver træerne overskud til frugtsætning.

Udvikling

Udviklingen i træerne har været voldsom hurtig den sidste tid. Det er ikke kun udviklingen i træerne som er hurtig; insekterne følger træernes udvikling.

Æblebladhveps


- Æblebladhveps og æblehveps er to navne på det samme insekt.
- RIMpro: brugere af RIMpro kan følge udviklingen af æblehveps i programmet. Der skal indtastes dato for første fangst på limplader.
- På Fyn var der fangst på limplader i sidste uge.
- Afhængig af lokaliteten og vejret forventes det, at æggene klækker i løbet af denne uge.

(se varslings på næste side)

INDHOLD

FÆLLES	1
Frugtsætning	1
Udvikling	1
Æblebladhveps	1
Feromonforvirring og feromonfælder	2
Skurv	2
Meldug	3
Maskinudtynding	3

KONVENTIONEL	4
Æblehveps	4
ATS og Cerone - Hvornår kan virkningen ses?	4
Cerone	5
Cerone og Regalis	6
Regalis - Vækstreduktion	6
Svampesprøjtninger	6
Stemphylium	7
Pæregalmyg	7
Pærebladlopper	7
Rød æblebladlus og Larver	7
Bladgødskning	8



Varsling af æblehveps på Årslev. Dato for fangst på limplader er sat til 9. maj.

Feromonforvirring og feromonfælder

Feromonforvirring skal være oppe inden afblomstringstidspunktet i æblerne. Fra da af begynder æblevikleren som regel at sværme. Feromonfælder for æblevikleren skal op nu. Husk at til biofix i RIMpro må dato for første fangst ikke være fra plantage/afdeling med feromonforvirring.



Feromonfælder for æblevikleren skal op nu.


Skurv

Endnu engang meldes om regn senere på ugen. Sørg for god dækning mod skurv under blomstringen/afblomstringen. Blomsterne fylder og kan "skygge" for at bladene rammes og dækkes godt.

Meldug

- Klip meldugsskud væk, så snart de er fremme, for at reducere smittetrykket. Det er første forudsætning for god bekæmpelse. Ved højt smittetryk er det så godt som håbløst at holde melduggen i skak med sprøjtning alene.
- Frigivelse af sporer sker om dagen når det er tørt og varmt (temperaturen skal være over 15 °C).
- Regn ødelægger spore-strukturerne.

RIMpro Apple Powdery Mildew Aarslev Imetos M24 – 2018



Varsling af meldug i RIMpro på Årslev. Melduggen er høj-aktiv og inficerende nu! Modellen simulerer, at der nu også er sekundære infektioner (gråt område i øverste del af figuren).

Maskinudtynding

Stor blomstring, hurtig udvikling og presset for at nå at udtynde kemisk, gør det fristende at overveje maskinudtynding under blomstring. Men i æblerne foretages mekanisk udtynding kun frem til begyndende blomstring. Udtynding under blomstring eller senere kan give mærker/skader på frugten.