

Æble/PæreNYT

Nr. 14 // 26. juni 2018

Ferieafvikling 2018

Hanne Lindhard: uge 27, 28, 29.

Maya Bojesen: uge 27, 29, 30.

Lene Baarts: uge 28, 29, 30.

FÆLLES

Skurv

- Sporetællingerne på Årslev viser, at der nu ikke længere udslynges sporer fra de gamle blade på jorden, når det regner.
- Varslingsprogrammerne viser afhængig af lokalitet, at der ved næste regnvejr kun opstår meget lille infektionsfare.
- Før der reduceres på skurvsprøjtningerne, skal man tjekke for skurv! Nogle steder var der høj infektionsfare 10. juni, og hvis man ikke havde dækning for denne infektionsperiode, skal man holde godt øje med skurvpletter den kommende tid.

Figur herunder: Varsling af skurv på Årslev foråret 2018


INDHOLD

FÆLLES	1
Skurv	1
Æblevikler	2
Rønnebærmøl	2
Bladgalmider	3

KONVENTIONEL	3
Steward	3
Bladviklere/sene viklere	3
Pærebladlopper	4
Switch	5
Tæger	5
Skurv	5
Difcor	6
Væksthæmning	7
Gødning	7
Bladgødskning - Calcium	7
Husk datoerne	8

ØKOLOGI	8
Bladviklere/sene viklere	8
Pærebladlopper	8
Sodplet	8
Meldug	8
Vanding	9
Gødning	9
Bladgødskning - Calcium	9


RIMpro-Venturia location: Aarslev Imetos M24 - 2018



Æblevikler

- Husk at skifte feromonkapslerne når der er gået 4-5 uger siden de blev lagt i/skiftet sidst. Skift også limplader, hvis de har hængt længe og har fanget meget eller er støvet til.
- Klækningen af æblevikler-æg har ifølge varslingsprogrammerne været i gang et stykke tid nu, og vi burde kunne begynde at finde skade, hvor der ikke er behandlet, hvis der er et smittetryk.

RIMpro-Cydia location Aarslev Imetos M24 - 2018



Æblevikler-varslings på Årslev viser, at klækning er aftagende nu. Om programmet vil vise en ny flyvetop eller en generation nr 2, må vi afvente og se. En generation nr 2 vil kun kunne forekomme, hvis der har været skade efter den første generation.

Rønnebærmøl

- I Norge blev forventet det værste angreb af rønnebærmøl i 20 år: <https://www.vips-landbruk.no/applefruitmoth/>
- Nyeste melding fra Norge er, at indflyvningen i plantagerne er senere og svagere end først antaget.
- Tidspunktet for klækning af æggene beregnes ud fra udviklingstrinnet i rønnebær: Total tid fra fuld blomstring i røn til de første æg klækker er 556 døgngrader. Dette tidspunkt er nu passeret og i teorien er æggene klækket/i gang med at klække.
- Producenter i Nordjylland som kender til skade af rønnebærmøl fra tidligere år, kan begynde at holde øje med skade af rønnebærmøl i æblerne. Aroma og tætte æbletræer foretrækkes af møllet.