



RIMpro Apple Thinning (Experimental) Aarslev Imetos M24 - 2018




RIMpro Apple Thinning (Experimental) Aarslev Imetos M24 – 2018




Under blomstring: ca 2 døgn fra blomsten åben/bestøvet til befrugtet
 Efter blomstring: Overskud på kulstofbalancen – frugten sidder fast
 Nu: Frugten har passeret den størrelse (10-12 mm), hvor den er nem at slå af OG der er overskud på kulstofbalancen.

RIMpro Fruit Thinning Arslev Virtual 2017 - 2017



Udtynding med ethephon under blomstring har større effekt end når frugten er 10 mm i diameter selvom dosering øges.

No. flowers/fruitlets per cluster



Summerred: midtblomsten åben (19. maj) 15.6 °C
10 mm in diameter (13. juni) 15.3 °C


- Mest effektiv under blomstring
- Jo større frugt, jo sværere at slå af
- Jo højere temperatur, jo større effekt

2018

- Mange og stærke blomster (moderat høst 2017)
 - Ingen frostskafer
 - Godt bestøvningsvejr under blomstringen
 - Kort blomstring – få gange ATS
 - Høj temperatur under blomstringen
 - Konklusion: Brug Cerone under blomstringen!
-
- Ingen kunne forudse at vi efterfølgende ville få Cerone-vejr non-stop!


Tørkeindeks

Foreløbige Data




Tørkeindeks

Foreløbige Data




Tørkeindeks

Foreløbige Data



Tørkeindeks


Foreløbige Data




Odense

Udsigt fra fredag d. 8. juni 2018 til fredag d. 15. juni 2018

Maks. UV-indeks: 6.0




RIMpro Apple Powdery Mildew Aarslev Imetos M24 - 2018




Meldug




RIMpro Apple Powdery Mildew Orskov - 2018




RIMpro Apple Powdery Mildew troldebakken - 2018




RIMpro-Venturia location: Aarslev Imetos M24 - 2018



RIMpro-Venturia location: Orskov - 2018



RIMpro-Venturia location: troldebakken - 2018







DPI

Skurv sekundær


Venturia location: Aarslev Imetos M24 - 2018



RIMpro-Cydia location Aarslev Imetos M24 - 2018



RIMpro-Cydia location Aarslev Imetos M24 - 2018




Æblevikler




- Madex:
- 50 ml/ha i hver behandling
- Behandling ca hver 7. dag i den periode hvor æggene klækker.
- Start: 6.-10. juni
- Afhængigt af smittetryk/fangst


RIMpro-Cydia location Orskov - 2018



RIMpro-Cydia location troldebakken - 2018



Æblevikler



▼ Cydia Einstellungen bearbeiten

BIOFIX: erste Männchen in der Falle.

20.05.2018


ACHTUNG: an zahlreichen Standorten geben die Fallenfänge die Situation nicht richtig wieder. Bitte Rücksprache mit örtlichen Pflanzenschutzdiensten:

Efter at hunnerne er parret går der et stykke tid før de begynder at lægge æg. Dette kaldes preoviposition fasen.


I Fruitweb kan man vælge varsling med og uden preoviposition fasen.

Include preoviposition
Ignore preoviposition


Preoviposition berücksichtigen
Preoviposition ignorieren



Her er der taget hensyn til preoviposition fasen
→ første larver 5. juni 2018



Her er der IKKE taget hensyn til preoviposition fasen
→ første larver 31. maj 2018



Sene viklere



Elstar 15. sept. 2011

Discovery 14. august 2012

Ildsot



Infektionsfare

- Smitte tilstede
- Åbne blomster
- Høj Temperatur
- Regn

