



De sidste 14 dage har træer og buske udviklet sig meget hurtigt. De første enkelte blomster er åbne i de tidlige sorter af buskfrugtkulturer, men generelt springer blomsterne først ud når der kommer lunt vejr. Kirsebær står også med store flotte knopper som er åbnet op og man kan se blomsterne i bunden af knopperne, men intet hvidt endnu.



Sporetællinger på Årslev

For både Skivesvamp og Kirsebærbladplet er der stor udslyngning af sporer. Det betyder at svampesprøjtninger skal være i gang for at hindre den primære infektion.

Det vides ikke om konidiesporer inficerer i det tidlige forår, men ascosporer vides at være årsag til primær infektion. Nedbør er registreret, da det er fugt der forårsager udslyngning.

Dato	Nedbør i mm	Ascosporer kirsebærbladpletudslyngning antal	Udslyngning vinterkonidier antal	Ascospore skivesvamp udslyngning antal	Konidiespore udslyngning antal
22-03-2016	2,8	0	0	0	0
26-03-2016	0,6 + 0,4	0	0	41	10
28-03-2016	3,3 + 1,2	0	0	144	32
29-03-2016	0,5	0	0	70	5
31-03-2016	2,7	4	0	279	45
05-04-2016	1,8	26	0	1391	38
06-04-2016	13,2	1	0	104	23
07-04-2016	1,7 + 0,5 + 0,3	5	1	227	25
08-04-2016	0,2 + 0,9	2	2	162	55
12-04-2016	.	47	11	183	42
18-04-2016	.	29	25	63	130