

Busk- og stenfrugtNYT


Nr. 6 // 18. maj 2018.



Hascap, sorterne Aurora tv. og Indigo Jam th. 17. maj, som afprøves i projektet "Danbær"

Aktuelt

Vi har haft gode vejr- og bestøvningsforhold lig med god befrugtning, så der er basis for god sætning.



Dog er vi ved at være der mange steder, hvor der er brug for vand. Varslingen om regn Kristi himmelfartsdag udeblev mange steder og der er nu efterhånden ved at være godt tørt mange steder. Sørg for vanding i kulturer med vandingsanlæg for at sikre god frugtudvikling.

Regler og lovstof

Overgangsperioden for brug af midler med den gamle CLP mærkning er blevet forlænget med et år, så disse kan bruges og opbevares indtil 31. maj 2019. I perioden vil Miljøstyrelsen vejlede om mærkningen, så det indenfor denne periode er muligt at få anvendt lagre af pesticider.

Økologi

Det er fortsat oplagt nu, hvor det er tørt og forholdene er optimale, at bekæmpe ukrudt mekanisk, hvis der er behov.

Kumulus S har fået en fornyet godkendelse til mindre anvendelse mod sygdomme og galmider i kirsebær, blomster, solbær, ribs og stikkelsbær, blåbær og hyben, som er gældende frem til 2020. Det er nu muligt at anvende Kumulus S op til 8 gange. Se mere om anvendelse, dosering og frister [her](#).

Nyt om kulturerne

Buskfrugt

Skivesvamp

Der er fortsat udslyngning af sporer, så ved regn vil der være infektionsrisiko. Der kan behandles med [Signum WG](#) (ikke stikkelsbær) eller [Kumulus S](#) i økologi. Hvis det solrige vejr fortsætter, bør udbringningen ske tidligt eller sent og for Kumulus S i overskyet vejr og med en doseringen på 3 kg for at undgå eller reducere svidning.

Bladhvepselarver

Der bør fortsat holdes øje med bladhvepselarver i buskfrugt. 17. maj blev der set både æg og små larver af stor stikkelsbærhveps.



Stor stikkelsbærbladhvepselarver i Tatjana 17. maj.

Der kan anvendes [Biscaya OD 240](#) og [LFS Thiacloprid](#) maks. 1 gang, som også har virkning mod bladlus, som er god gemt inde i sammenkrøllede blade.

Bladlus

Her i varmen kan det gå hurtigt med bladlus. Så hold øje og vurder behovet i forhold til angrebsgrad, og om der er nyttedyr som mariehøne- og svirrefluelarver tilstede. Der kan anvendes [pirimor G](#) eller [Biscaya OD 240](#) og [LFS Thiacloprid](#). Biscaya og Thiacloprid er systemiske midler og særligt effektive mod bladlus, der sidder i sammenkrøllede blade.

I økologi kan anvendes [Spruzit Neu](#), som vil have sideeffekt på bladhvepselarver.

Stenfrugt



I år har vi nogle steder set døde grene og udfald af grenpartier.

Vi tillægger det det regnfulde og fugtige vejr i 2017, hvor der var basis for stor smitte af monilia og bakteriekræft. For at undgå spredning af smitte bør døde grene fjernes fra plantagen og behandling tænkes ind senere i sæsonen.

Blomsterdød gren i blomme 16. maj

Vanding og bladgødskning

Af hensyn til celledeling, frugtudvikling- og størrelse og for undgå frugtfald, skal der sørges for at holde træerne godt med vand samt at tilføre de nødvendige næringsstoffer.

Afblomstring

Bittersalt 5 kg + urea 2 kg

I sødkirsebær er det for sent at tilføre Kalium plus, da det vil kunne genfindes i frugten.

Tidlig frugtudvikling

Aminomol 0,5 + Calciumklorid 4 kg + Mantrac pro 0,5 kg + Zintrac 0,15 kg

Larver og lus

Tjek for lus og larver nu.

Mod **bladlus** vil systemiske midler som [Movento](#) SC 100 og [Mospilan SG](#) have god effekt mod bladlus, der er viklet godt ind i bladene. Kontaktmidler som Karate og Pirimor skal ramme lusene direkte og virker derfor mindre effektivt mod lus, der er viklet ind i bladene.

Der er set små nyklækkede **viklerlarver** i sødkirsebær. Ved angreb kan anvendes [Turex](#) WG/WP, som har bedst virkning mod de små larver.

Kirsebær

Varsling for kirsebærfluerne

Det er snart tid til at sætte gule limplader op til overvågning af kirsebærfluerne i både sur- og sødkirsebær. Limplader sættes op i slut maj til start juni og flyvningen følges ugentligt til to gange om ugen i varme perioder.

Kirsebærbladplet

Der udslynges sporer af kirsebærbladplet, og der vil være infektionsrisiko, hvis der kommer regn og bladene er fugtige i flere timer. Hvis der varsles regn, anbefales det at behandle forebyggende. Der kan

anvendes [Delan WG](#), [Syllitt 544 SC](#) eller [Signum WG](#). I økologi kan anvendes [Kumulus S](#) og vær opmærksom på at undgå svidning ved at bruge en lavere dosis på 3 kg og at udbringe i overskyet vejr.

Sødkirsebær

Sødkirsebærrene ser ud til at have sat pænt i år, og den første frugtudvikling er gået stærkt i varmen. Nu er det vigtigt at tænke på frugtstørrelse og kvalitet samt at undgå at stresse træerne til forøget frugtfald.



Træerne skal have optimale forhold mht. vanding (gerne gødevanding), gødning, bladgødskning med mikronæringsstoffer og ikke mindst calcium til frugten.

I celledelingsperioden fastlægges den potentielle bærstørrelse, da bærrene kan blive større jo flere celler de består af. Cellerne skal dog også have stabile cellevægge, og det sørger calcium for.

Nu hvor celledelingen går så stærkt, bør calcium over gødevandet suppleres med calcium over frugten. Calcium gives hyppigt indtil taget lægges på.

Skadedyr

Der er fundet en del viklerlarver og mange bladlus i den foregående uge, se ovenfor for bekæmpelse.

Konsulenter			
	Helle Mathiasen Mobil: 40144095 hmat@seges.dk	Lene Baarts Mobil: 40459998 lba@seges.dk	Hanne Lindhard Pedersen Mobil: 23826347 hlp@seges.dk