

Æble/PæreNYT

Nr. 3 // 8. marts 2024

Pensionering

Hanne Lindhard går på pension fra HortiAdvice den 31. marts 2024.

Sidste arbejdsdag er 21. marts 2024.

INDHOLD:

FÆLLES.....	1
Skurv.....	1
Bladgalmider	2
Pærebladlopper	2
Olie	2
Bladgødning	2
Æblesnudebille	2
Gødning	2

FÆLLES

Skurv

- Der kan opstå fare for skurvinfektion, når følgende 3 forhold er opfyldt samtidig: sporer, grønt fremme og regnvejr.
- I skrivende stund melder vejrudsigten om regn mandag-tirsdag i næste uge.
- På nogle lokaliteter er det første grønne fremme i nogle sorter.
- I pæresorterne Lucas og Xenia/Katrine er der ved at være meget grønt fremme. Godt nok er specielt Xenia/Katrine robust overfor skurv, men hvis der er meget grønt fremme anbefales det at behandle forebyggende.
- Ved lave temperaturer skal der dog være lang tid med bladfugtighed før der kan opstå infektionsfare. Ved temperaturer på 5-7°C skal der ifølge Mills tabel være 17-26 timer med bladfugtighed før der bliver infektion. Men husk når det er koldt er det også længere tid om at tørre op!



Grøn spids i æblesorten PIA 41 torsdag 7. marts 2024. PIA 41 er skurv-resistent. Sorten indgår i et projekt med demonstration af nye sorter. Fotoet er fra træerne hos værten på Sjælland.

Bladgalmider

- Bladgalmider ses oftest i pærer, men kan også forekomme i æbler.
- Galmiderne overvintrer under knopskællene og begynder at blive aktive, når knopperne svulmer. Når galmiderne kommer frem fra overvintring, søger de mod friskt bladvæv, hvor de går ind i bladpladen. Inde i bladpladen sidder miderne godt beskyttet. Angrebne blade får efterfølgende et spættet udseende.
- Ved angreb af galmider reduceres bladkvaliteten betragteligt.
- **NB! Selvom det ikke er regnvejr/fare for skurvinfektion, vil galmiderne fortsætte deres aktivitet alligevel.**

Pærebladlopper

- Pærebladlopper overvintrer som voksne. De bliver aktive og lægger æg, når temperatur og daglængde giver forhold for det dvs. på de første lune forårsdage.
- De kan begynde at lægge æg (lige) før der grøn spids.
- Æggene bliver ofte lagt ved basis af knopperne.

Olie

- Fibro og Fibro EC er tilladt mod æg af pærebladlopper og spindemider, men har sideeffekt på æg af andre arter f.eks. tæger, rød æblebladlus og hækvikler.
- Fibro bliver forbudt 1. august 2024, men Fibro EC fortsætter.
- Når der er grønt fremme bør der ikke bruges olie, hvis der er udsigt til nattefrost.
- Olie og kobber kan blandes.

Bladgødning

Aktuelt på nuværende udviklingstrin:

- Kobberoxychlorid 0,5-0,7 kg/ha
- Svovl 80% (3-4 kg/ha)
- **Økologi: Gødningssvovl og kobber må kun bruges, hvis der foreligger konsulenterklæringer**


Gødning

Hvis kvælstof-gødningen ikke allerede er udbragt, bør det gøres snarest.

Æblesnudebille

- Vi forventer, at de overvintrede, voksne æblesnudebiller bliver aktive, næste gang det bliver "fint" vejr. Det er, **når temperaturen kommer over 10-11°C midt på dagen.**
- I konventionel produktion er Lamdex godkendt til bekæmpelse af æblesnudebille. Kan med fordel blandes med olie evt. i lav dosering.
- I økologisk produktion er Spruzit Neu godkendt til bekæmpelse af æblesnudebille.
- Behandlingen skal ske, når de voksne biller lægger æg.

Se varsling på næste side



Varsling af Æblesnudebille i Fruitweb på tidlig lokalitet.

Det første, der blev varslet (brune toppe), var, hvornår de allerførste biller kunne findes ved en bankeprøve. Pt. varsler programmet, at der vil være flere biller i træerne (røde toppe) sidst i næste uge (15. marts).



Maya Bojesen
Tlf. 21 71 77 57
myb@hortiadvise.dk



Hanne Lindhard Pedersen
Tlf: 23 82 63 47
hlp@hortiadvise.dk



Rasmus Madsen
Tlf: 61 45 89 26
rama@hortiadvise.dk