

KONVENTIONEL - UDTYNDING

Clara Frijs

- Mange har været ude med 1-2 gange ATS og 1 gang Cerone.
- Der går op til 2-3 uger før effekt af behandling med Cerone kan ses, derfor beror beslutning om yderligere udtynding på den totale blomstermængde.
- Har man kørt ATS og/eller Cerone skal man være HELT SIKKER på, at der stadig er et stort udtyndingsbehov før der køres yderligere udtynding.
- **Se efter hvor tæt klaserne sidder og hvor mange frugter, der er i hver klase.**
- **Måske er det også muligt at se, om alle frugterne i klase vokser med, eller om nogle forbliver små (sandsynligt at de falder af senere, se foto nedenfor).**
- **Se og mærk efter, om blomster/frugter let kan pilles af! På afstand kan det nemlig se ud som om, der er behov for (mere) udtynding, men når man skubber til blomsterne/de mindste frugter, falder de af.**
- Cerone: Ved store mængder totalt udbragt Cerone kan det ikke udelukkes, at det vil kunne øge tendensen til tidligt frugtfald/drys før høst. En generel anbefaling er derfor ikke at bruge mere end 500 ml/ha i alt.
- Pomoxon Extra: Udtyder bedst, når frugten er 5-12 mm i diameter (forudsat at temperaturen er høj nok).
- Tankblanding af **Cerone + Pomoxon Extra vil forstærke virkningen af hinanden.**
- Hvis der er stort udtyndingsbehov, kan tankblanding bruges:
Cerone 0,20-0,25 l/ha + Pomoxon Extra 0,30-0,35 l/ha (svarende til ca. 10 g aktivstof pr ha).



Før der udtynnes (yderligere) så se efter om alle frugterne i klase vokser med, eller om nogle forbliver små og gullige, og let kan pilles af.



Hvis alle frugterne i klase vokser med, så de er omtrent lige store, og der er udsigt til, at frugterne kommer til at sidde som i drueklaser, skal (yderligere) udtynding vurderes.

Husk!

Forhold som gør, at udtyndingen i år kan virke ekstra kraftigt:

- Stort udbytte i 2022
- Meget frugt som hang længe på træerne i efteråret/vinteren
- Kort eksplosiv blomstring i år

Brug lav dosering hvis udtyndingsbehovet ikke er stort

Elstar

- Let udtyndingsbehov: Cerone 0,15 l/ha.
- Ikke tidligere udtyndet/stort udtyndingsbehov: Cerone 0,25 l/ha. (Alternativt kan behandles ved førstkomende varme dage med 0,20 l/ha og så gentage behandlingen efter ca. 10 dage. Denne strategi forudsætter temperatur over 18°C til den tid).

Ingrid Marie

- Pomoxon Extra (29 gram aktivstof pr liter) kan bruges til udtynding i Ingrid Marie med ca 0,5 l/ha.
- Dosering vil afhænge af udtyndingsbehov, temperatur og træhøjde.
- Pomoxon Extra kan bruges fra frugterne er 5 mm til de er op til 13-14 mm i diameter.
- Afvent højere temperatur og vurdér udtyndingsbehovet, når temperaturen er høj nok til Pomoxon Extra.



Elstar. Lang stilk er tegn på, at frugterne vil blive siddende. Udtynding med Cerone kræver temperatur over 18°C.



Ingrid Marie. Udtynding med Pomoxon Extra kræver temperatur over 18°C.

Maya Bojesen
Tlf. 21 71 77 57
myb@hortiadvic.dk

Hanne Lindhard Pedersen
Tlf: 23 82 63 47
hlp@hortiadvic.dk

Rasmus Madsen
Tlf: 61 45 89 26
rama@hortiadvic.dk