


FÆLLES

Skurv

- Vejrudsigten melder om lidt højere temperaturer på op til omkring 8-10°C og regn.
- Som følge deraf varslers RIMpro infektionsfare torsdag-lørdag (afhængig af lokalitet).
- Hvor stor fare der bliver for infektion, vil afhænge af lokalitet, smittetryk, sort og udviklings-trin.
- I skurv-modtagelige sorter og hvor der var skurv i 2022, skal skurv-bekæmpelsen starte på grøn spids, når der er udsigt til lang tid med fugtighed. Der må ikke tages chancer.
- For billeder af grøn spids se [ÆblePæreNyt 03_2023](#).



Varsling af skurv i RIMpro med biofix sat til 15. marts. Ved regn de næste dage varsles infektionsfare.

Pærebladgalmider

- Galmiderne overvintrer under knopskællene og begynder at blive aktive, når knopperne svulmer. Når galmiderne kommer frem fra overvintring, søger de mod friskt bladvæv, hvor de går ind i bladpladen. Inde i bladpladen sidder miderne godt beskyttet. Angrebne blade får efterfølgende et spættet udseende.
- Ved angreb af galmider reduceres bladkvaliteten betragteligt, og det er vigtigt at bladgødskes med svovl 80% (minimum 3-4 kg/ha) **før** egentlige symptomer kan erkendes.
- Gødningssvovl må kun bruges i økologi, hvis der foreligger konsulentekklæring.

KONVENTIONEL

Skurvbekæmpelse og bladgødsning

- Hvis der ikke er behov for bladgødning med kobber, skal der bruges Syllit før regn eller umiddelbart efter regnen.
- Husk at Syllit ikke må blandes med noget andet end urea.

Udviklingstrin	Skurv	Bladgødsning
Grøn spids	Syllit	Kobberoxychlorid 0,5-0,7 kg/ha Svovl (80%) 4 kg/ha



Maya Bojesen
Tlf. 21 71 77 57
myb@hortiadvise.dk



Hanne Lindhard Pedersen
Tlf: 23 82 63 47
hlp@hortiadvise.dk



Rasmus Madsen
Tlf: 61 45 89 26
rama@hortiadvise.dk