

KONVENTIONEL

Clara Frijs tidligt frugtfald

- Der er ikke altid en klar årsag til, at Clara Frijs nogle år begynder at drysse før høst. Vi kan således ikke give et godt bud på, om det vil ske i år. Men nogle forhold kan man dog være opmærksom på.
- Erfaring: Hvis man har erfaring for, at det kan være et problem, er der grund til at holde øje.
- Kerner: Hvis det er sparsomt med kerner i frugterne, kan det betyde, at frugterne sidder lidt mere løst frem mod høst.
- Cerone: Er der brugt høje doseringer af Cerone til udtynding, behandlet flere gange og/eller er der behandlet på et sent tidspunkt, bør man holde ekstra godt øje med frugtens modningsudvikling, så man undgår at blive overrasket, hvis frugten modner nogle dage tidligere end forventet.
- Tørke/varme: Er det meget tørt og/eller varmt i tiden op til høst, bliver træerne og frugterne stresset, og vil have større tendens til at drysse før høst.

INDHOLD:

KONVENTIONEL	1
Clara Frijs tidligt frugtfald.....	1
Pomoxon Extra mod tidligt frugtfald i Clara Frijs	2
Stemphylium.....	2
Pomoxon Extra	2



De foregående år, har der nogle steder desværre været betydeligt drys før høst i Clara Frijs.

Pomoxon Extra

Dispensation til anvendelse gælder i perioderne:

- 22. april 2022 til 8. juli 2022.
- 1. august 2022 til 9. september 2022.
- Tilladelse til opbevaring bortfalder den 9. september 2022.
- Modvirkning af frugtfald: Maks. 2 behandlinger med 8-12 dages interval.
- Behandlingsfrist: 7 dage før plukning.

Pomoxon Extra mod tidligt frugtfald i Clara Frijs

- Hvis man har erfaring for, at Clara Frijs begynder at drysse før høst, kan man prøve at mindske dette ved brug af Pomoxon Extra.
- Brugt tæt på høst ses ikke påvirkning af frugtstørrelsen (generelt er aktivstoffet ikke godt for træernes trivsel, idet det sætter træerne "tilbage", men denne negative effekt af lave doseringer op til høst er lille).
- Behandling så tæt op til høst som 1 uge før høst, vil have effekt, men det anbefales at begynde 10-14 dage før høst.
- Dosering: 10 gram/ha aktivstof NAA i hver behandling. 10 gram/ha aktivstof NAA svarer til 0,35 l/ha Pomoxon Extra (29 gram/liter NAA).
- Der behandles 1-2 gange. Eftersom der plukkes over et stykke tid, bliver noget behandlet 1 gang, mens det man først når til at plukke senere bliver behandlet 2 gange.
- Behandlingsstrategi:
10 dage før forventet plukkestart lægges behandling nr. 1.
8 dage senere lægges behandling nr. 2 i den del af marken/parcellen, som man først når til at plukke senere.

Eksempel:

Dato		
10. august	1. sprøjtning (0,35 l/ha)	1. sprøjtning (0,35 l/ha)
18. august		2. sprøjtning (0,35 l/ha)
20. august	Plukkestart	
25. august og frem		Plukkestart

Stemphylium

- Vær opmærksom på sygdommen Stemphylium. Det er en svampesygdom, der angriber pærer og som kan være meget aggressiv. I 2019 så vi, at angreb lynhurtigt kan udvikle sig i løbet af nogle få uger op til høst.
- Symptomerne er mørkebrune pletter på frugterne, der udvikler sig til råd. På bladene er brune pletter og V-formede områder også typisk for sygdommen
- Svampen inficerer, når det er **varmt og fugtigt**.
- Svampemidler er kun effektive **før** symptomerne ses.

Brune rådpletter på frugten og V-formede områder på bladene er typisk for Stemphylium.

