Æble/PæreNYT

Nr. 8 // 19. april 2022

FÆLLES

Pærehveps hvide limplader

- **De hvide limplader skal op nu.**
- Pærehvepsens flyvning/æglægning kan ske allerede på "grøn knop".
- Pærehvepsens flyvning er meget kortvarig.
- Æggene klækker i løbet af blomstringen.



Pærehveps i gang med at lægge æg 30. april 2021.

Pæregalmyg spandfælder

- Find spand og glas frem til spandfælder til pæregalmyg. Fælden forudsætter, at der blev indsamlet opsvulmede pærer efter blomstring sidste år.
- Fælderne bruges udelukkende til at bestemme bekæmpelsestidspunktet – ikke til at sige noget om behovet for bekæmpelse. Mere om dette i kommende nyhedsbreve.

På det sted hvor de opsvulmede pærer blev placeret sidste år, anbringes en spand med bunden op og med et boret hul (3-4 cm) i bunden. Over hullet placeres et henkogningsglas. Da galmyg er dårlige flyvere sættes et par strå fra jorden gennem hullet og op i glasset. Derefter vil galmyg flyve op i glasset, når de søger mod lyset.



INDHOLD:

FÆLLES **1**
Pærehveps hvide limplader 1
Pæregalmyg spandfælder 1
Pærebladlopper 2
Rød æblebladlus 2
Skurv 3

KONVENTIONELT **3**
Pseudomonas i pærer 3

ØKOLOGI **3**
Pære- og æblehveps 3

Pærebladlopper

- Hold øje med mængden af æg og udviklingen. Æggene bliver orange, når de nærmer sig klækning.




Pærebladlopper. Voksen (til højre) lægger æg (pile) på ru overfalder.

Rød æblebladlus

- I RIMpro og Fruitweb ligger modeller for rød æblebladlus. Modellerne bygger på temperatursum. Varslingerne skal tages med forbehold. I begge varslinger ses det, at æggene begynder at klække nu.
- **Bekæmpelse nærmere blomstring.**



Rød æblebladlus 30. april 2021.



Varsling af rød æblebladlus i RIMpro viser, at æggene begynder at klække nu.

Skurv

- På nogle lokaliteter har der været infektionsfare i en eller flere af dagene 14.-16. april.
- **På de nuværende udviklingstrin kan vandet stå længe i bladene og det fører til lang optørringstid.**

KONVENTIONELT

Syllit

- Pærer: hvor der er ballon/åbne blomster vælges andre produkter.
- Æbler: bruges kun frem til rød knop. På senere stadier er der fare for skrub på frugten.
- Syllit kan kun blandes med urea.
- Syllit bruges forebyggende, men kan også bruges kurativt, hvis man er hurtigt ude efter at infektionen er begyndt.
- Syllit har kurativ virkning i op til 480 gradtimer dvs. 48 timer ved 10°C efter starten af regnvejr (ikke fra start af infektion!).

Scala

- Scala bruges kurativt til og med blomstring, når temperaturen er under 12-15°C.
- Scala slår lidt længere tilbage end Syllit.
- Midlet bruges højst to døgn efter, at infektionsperioden begyndte.
- Scala skal altid blandes med forebyggende middel (Delan WG/Delan Pro) og så kan doseringen af Scala reduceres til 0,75 l/ha.

Pseudomonas i pærer

- Husk det er nu i forårsperioden, at sygdommen inficerer. Se Æblepærenyt nr 7_2022.

ØKOLOGI

Pære- og æblehveps

Massefangst af pærehveps. **Det er nu de hvide limplader eller limbånd skal op.**
Det er stadig uklart om vi får lov at bruge Quassia til 20 ha på forsøgsdispensation i år.
For nærmere beskrivelse se Æble/PæreNyt nr. 5.

REDAKTØRER



Maya Bojesen
Tlf. 21 71 77 57
myb@hortiadvice.dk



Hanne Lindhard Pedersen
Tlf: 23 82 63 47
hlp@hortiadvice.dk

Hortiadvice tager forbehold for tastefejl og lignende. Nyhedsbrevet må ikke videresendes. Hortiadvice har copyright på billederne