

KONVENTIONEL

Clara Frijs

- Vær obs på modning og tidligt frugtfald i Clara Frijs.
- Enkelte avlere er begyndt at se tidligt frugtfald.
- Hvis der er få kerner i frugterne, kan det betyde, at frugterne sidder lidt mere løst frem mod høst.
- Er der brugt høje doseringer af Cerone, kørt flere gange og/eller er der behandlet på et sent tidspunkt, bør man holde ekstra godt øje med frugtens modningsudvikling, så man undgår at blive overrasket, hvis frugten modner nogle dage tidligere end forventet.
- En pegepind for værdier i Clara Frijs: Når fastheden nærmer sig 6, skal man have plukkere klar. Husk at bruge den smalle dorn til fasthedsmålinger i pærer. Forudsat at fastheden fortsat kan holdes på over 6, bør man vente på et sukkerindhold på mindst 11, men 12 er endnu bedre. Hvis der er for stor frugtmængde i forhold til bladmassen, kan det være svært at opnå et godt sukkerindhold, da frugten skal plukkes før fastheden bliver for lav.
- Plukketidspunkt:
 - For tidligt: Erfaringer på Årslev viser, at for tidligt plukket frugt taber mere vand end frugt, som er plukket på det optimale tidspunkt.
 - For tidligt: Brækker stilken, når der plukkes, er det fordi der skal bruges kræfter for at få frugten af træerne og det er tegn på at frugten plukkes for tidligt.
 - For tidligt: Udover kvaliteten, vil for tidlig høst, kunne gå ud over frugtstørrelsen og dermed udbytte og afregning.
- Frugt med skader f.eks. fra insektgnav frigiver store mængder ethylen. Ethylen er et stress- og ældningshormon og vil have negativ påvirkning på frugt, som ikke er skadet. Tag derfor ikke skadet frugt med i kasserne!
- Pærer med "sten" på grund af tægestik er ikke så iøjnefaldende som andre skader, så hold ekstra godt øje med dette i de områder/parceller, hvor dette er et problem.

INDHOLD:

KONVENTIONEL	1
Clara Frijs	1
Pomoxon Extra mod tidligt frugtfald i Clara Frijs	1
Stemphylium	3
SmartFresh	3

Pomoxon Extra mod tidligt frugtfald i Clara Frijs

- Der er ikke tradition for eller erfaring med brug af Pomoxon Extra til forebyggelse af tidligt frugtfald i Clara Frijs.
- I Holland er der god erfaring med at bruge 10 gram/ha aktivstof NAA i Conference før høst. Behandling 1 uge før høst har effekt. Brugt tæt på høst ses ikke påvirkning af frugtstørrelsen.
- 10 gram/ha aktivstof NAA svarer til 0,35 l/ha Pomoxon Extra (29 gram/liter NAA).
- Der er 7 dages behandlingsfrist på Pomoxon Extra.
- Vil man prøve dette i Clara Frijs, er det på eget ansvar.



Hvis stilken brækker, når der plukkes, er det fordi der skal bruges kræfter for at få frugten af træerne og det er tegn på at frugten plukkes for tidligt.



Frugt med skader frigiver store mængder ethylen, der er et stress- og ældningshormon og vil have negativ påvirkning på frugt, som ikke er skadet. Tag derfor ikke skadet frugt med i kasserne.




Frostskade i Clara Frijs kan vise sig som gult område omkring blomsten.



Hvis man er usikker på årsagen til at frugter falder af, så skær nedfaldne frugter igennem. Er der få eller ingen kerner i frugten kan det være forklaringen (frugten til venstre). Frugten med kerner (til højre) er plukket fra et træ ved siden af en bestøver.

Stemphylium

- Vær opmærksom på sygdommen Stemphylium. Det er en svampesygdom, der angriber pærer og som kan være meget aggressiv. I 2019 så vi, at angreb lynhurtigt kan udvikle sig i løbet af nogle få uger op til høst.
- Symptomerne er mørkebrune pletter på frugterne, der udvikler sig til råd. På bladene er brune pletter og V-formede områder også typisk for sygdommen
- Svampen inficerer, når det er varmt og fugtigt.
- Svampemidler er kun effektive før symptomerne ses.



Brune rådpletter på frugten og V-formede områder på bladene er typisk for Stemphylium.

SmartFresh

- Godkendt til æbler og pærer.
- Behandling med SmartFresh-behandlinger udføres af Jan Jager, som for bestilling kan kontaktes på telefon: 21 67 21 97.



Maya Bojesen
Tlf. 21 71 77 57
myb@hortiadvic.dk



Hanne Lindhard Pedersen
Tlf: 87 40 66 06 / Mobil: 23 82 63 47
hlp@hortiadvic.dk