

Skurv

Der kan opstå fare for skurvinfektion, når følgende 3 forhold er opfyldt samtidig:
modne sporer, grønt fremme og regnvej.

Ascosporer æble

Registreringer 22. marts viser, at der i forbindelse med regn forud er udslynget ascosporer fra æble. Det vil sige, at der nu er modne sporer.

INDHOLD:

Skurv	1
Ascosporer æble	1
Grøn spids	1
Infektionsfare	1
Hvornår skal der sprøjtes?	1
Biofix i RIMpro	2

Grøn spids



*Grøn spids i Jonagored
på Fyn 25. marts 2021.*

Infektionsfare

I skrivende stund er der meldt regn i weekenden og temperaturer på op til ca 8°C. Ved lave temperaturer skal der være mange timer med bladfugtighed for at der opstår infektionsfare.

Temp. °C	0-2	4	5	6	7	8	9	10	11	12-13	14-15	16-24	25
Timer våde blade	48	33	26	21	17	16	15	14	12	11	10	9	11

Hvornår skal der sprøjtes?


I modtagelige sorter og hvor var skurv i 2020 SKAL skurv-bekæmpelsen være optimal fra grøn spids.

Biofix i RIMpro

For at starte simuleringerne i programmet skal der sættes biofix. Foreløbig sættes biofix til 22. marts.

Følg disse trin:

1. My Parameters → Local Parameters



2. Biofix dates → Models for Apple and Pear

Simulation year

You can set the year for the simulations. RIMpro will try to find the weather data for this year from the data source you specified during the setup of your station.

The year for the simulations

Biofix dates


Several models need field information to perform correct simulations:
These adjustments to the real phenology in the field are called BIOFIX.
You need to provide this information for the main apple variety at the location.

Models for Apple and Pear

3. Indtast biofix. Vores foreløbige anbefaling er at sætte biofix til 22. marts.

Scab model:

Biofix Venturia simulation: first dischargeable ascospores



Varsling af skurv i RIMpro i Odense med biofix sat til 22. marts.