

FÆLLES

Risiko for frostskafer

- Æbler: Skal kunne klare ned til -3°C på stadiet "grøn knop".
- Pærer: Skal kunne klare ned til -6°C på stadiet "grøn knop".
- Vegetation nedsætter både indstrålingen om dagen og udstrålingen om natten. Med andre ord virker vegetation isolerende. Hold derfor græsset kort og jorden under træerne vegetationsfri.
- Vandindholdet i jorden har indflydelse både på hvor meget varme som kan lagres i jorden og hvor godt varmen ledes til jordoverfladen. God opfugtning af jorden 4-5 dage før forventet frost kan betyde, at hvis det fryser, falder temperaturen knapt så meget.

Pæregalmyg spandfælder

- Find spand og glas frem til spandfælder til pæregalmyg. Fælden forudsætter, at der blev indsamlet opsvulmede pærer efter blomstring sidste år.
- Fælderne bruges udelukkende til at bestemme bekæmpelsestidspunktet - ikke til at sige noget om behovet for bekæmpelse. Mere om dette i kommende nyhedsbreve.

På det sted hvor de opsvulmede pærer blev placeret sidste år, anbringes en spand med bunden op og med et boret hul (3-4 cm) i bunden. Over hullet placeres et henkogningsglas. Da galmyg er dårlige flyvere sættes et par strå fra jorden gennem hullet og op i glasset. Derefter vil galmyg flyve op i glasset, når de søger mod lyset.



INDHOLD:

FÆLLES	1
Risiko for frostskafer.....	1
Pæregalmyg spandfælder.....	1
Pærehveps hvide limplader.....	1
Pærebladlopper.....	2
Clara Frijs - blomsterknopper.....	2
KONVENTIONELT	2
Pirimor - lus.....	2
Dithane.....	2
Bladgødsning.....	3
Pomoxon Extra.....	3
ATS og Cerone.....	3
ØKOLOGI	3
Aminosol.....	3

Pærehveps hvide limplader

- De hvide limplader skal op nu.
- Pærehvepsens flyvning/æglægning kan ske allerede på "grøn knop".
- Pærehvepsens flyvning er meget kortvarig. Æggene klækker i løbet af blomstringen.

Pærebladløpper

- De voksne pærebladløpper har været i gang med at lægge æg.
- Hold øje med mængden af æg og udviklingen. Æggene bliver orange, når de nærmer sig klækning.



Pærebladløpper. Voksen (til højre) lægger æg (pile) på ru overfalder.

Clara Frijs - blomsterknopper

- Når knopperne let brækker af, er det tiden at maskinudtynde, eller der kan laves et ris/bundt af grene til at slå knopperne af med.
- Tjek blomsteranlæggene for eventuel frostskaade før udtyndingen påbegyndes.



Knopperne er lette at knække af, når de enkelte blomsteranlæg kan anes i knoppen.

KONVENTIONELT

Pirimor - lus

- Selvom vi har to dage med godt vejr, er temperaturen pt alligevel ikke høj nok til Pirimor.

Dithane

- Husk at der ligger godkendelse til, at Dithane må anvendes før 1. juni med 1 behandling.
- Dithane vil tilføre mikronæringsstofferne zink og mangan.

Bladgødskning

Grøn knop	Kvælstof	Urea	3	kg
	Zink	YaraVita Zintrac/Lebosol-Zink 700	0,15	litr.
	Mangan	Mantrac Pro/Lebosol Mangan 500	0,5	litr.
Tæt klynge	Kvælstof	Urea	3	kg
	Bor	Solubor	1,5	kg
	Magnesium	Bittersalt	5	kg
	Svovl	Pioner Svovlgødning 80	1-1,5	kg

Pomoxon Extra

- Miljøstyrelsen har givet til dispensation til frugtudtynding og forebyggelse af frugtfald i æble og pære
- Må kun anvendes til frugtudtynding og forebyggelse af tidligt frugtfald i æbler og pærer.
- Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for plantebeskyttelsesmidler.
- Dispensation til anvendelse gælder i perioderne: 20. april 2021 til 8. juli 2021 og 1. august 2021 til 9. september 2021.
- Tilladelse til opbevaring bortfalder den 9. september 2021.

ATS og Cerone

Sørg for at have ATS og Cerone til udtynding!

ØKOLOGI

Aminosol

- Aminosol (9 % N) er en kvælstofgødning, som bruges med ca. 5 l/ha.
- Den kan med fordel bruges sammen med sprøjtning med Neem, da Aminosol øger optagelsen af Neem.
- Blanding: 3 l Neem + 1-2 l Aminosol + 5 kg Svovl.
- Der er ikke lavet forsøg med virkning af svovl+Aminosol mod skurv, så det vides ikke om Aminosol forbedrer virkningen af svovl.
- På Conference anbefales det at have 2-3 dage imellem kobber og Aminosol behandlinger.
- Der ses ingen skrub ved brug af svovl alene.
- Det frarådes at bruge Aminosol efter blomstring i æbler, idet der er risiko for skrub på frugten.
- I økologi må Aminosol (9 % N) ikke bruges efter blomstring, da produktet er baseret på animalsk protein og derfor ikke må anvendes på spiselige dele.
- Hvis man ønsker at bruge Aminosol efter blomstring kan Aminosol PS (plantebaseret N, 5,5%) bruges.