


KONVENTIONEL

Skurv

- Afhængig af lokalitet har regn i denne uge ført til en eller to alvorlige infektionsfarer.



Varsling af skurv i RIMpro på Årslev. Regn onsdag 29. april og høj infektionsfare fra torsdag 30. april kl 12.

- Bekæmpelsesstrategien er vanskelig på grund af mangel på Delan.
- Hvis der ikke er sprøjtet forebyggende, SKAL der sprøjtes kurativt.
- I modtagelige sorter med højt smittetryk fra sidste år skal der også behandles kurativt selvom der er behandlet forebyggende, da infektionsfaren er så høj.

Syllit

- Syllit bruges kun frem til rød knop. På senere stadier er der fare for skrub på frugten.
- Syllit kan kun blandes med urea.
- Syllit bruges forebyggende, men kan også bruges kurativt, hvis man er hurtigt ude efter at infektionen er begyndt.
- Syllit har kurativ virkning i op til 480 gradtimer dvs. 48 timer ved 10°C efter starten af regnvejr (ikke fra start af infektion!).
- Ved start af regnvejr onsdag midt på dagen og temperatur på 10°C skal behandling udføres senest fredag morgen, men jo før jo bedre!



Syllit bruges kun frem til rød knop.

Scala

- Scala bruges kurativt til og med blomstring, når temperaturen er under 12-15°C.
- Scala slår lidt længere tilbage end Syllit.
- Midlet bruges højest to døgn efter at infektionsperioden begyndte. Ved start af infektion torsdag midt på dagen skal behandling udføres senest lørdag formiddag, men jo før jo bedre!
- Scala **skal** altid blandes med forebyggende middel (Delan WG/Delan Pro, Dithane eller svovl) og så kan doseringen af Scala reduceres til 0,75 l/ha. For at opnå effekt på gråskimmel skal doseringen af Scala øges til 1 l/ha, se nedenfor under Bægerråd.

Delan WG/Delan Pro

- Fra blomstring må Delan WG anvendes med 1 kg/ha. Doseringen kan uden problemer reduceres til 0,5 kg/ha (350 g af aktivstof dithianon).
- Doseringen af Delan Pro kan ikke reduceres. Mængden af aktivstof er allerede reduceret så der skal anvendes fuld dosering 2,5 l/ha (312 g af aktivstof dithianon).
- Med hurtig bladudvikling og høj infektionsfare må man ikke regne med at en forebyggende behandling giver mere end 3-4 døgns god dækning.
- Husk at der i henhold til etiketten skal være et interval på mindst 10 dage mellem sprøjtningerne på Delan WG og 8 dage mellem sprøjtningerne på Delan Pro.

Dithane NT

- Dithane NT (804-1) er godkendt på mindre anvendelse med 1 behandling før 1. juni.
- Dithane er ikke et stærkt skurvmiddel. Virkningen kan forstærkes ved tilsætning af 2 liter/ha KaliumPlus.
- Brug ikke Dithane i Conference, da frugterne får skrub.

	Forebyggende	Kurativ
Æbler indtil rød knop	Syllit + Urea 3 kg/ha	Syllit + Urea 3 kg/ha
Æbler i blomst	Delan WG/Delan Pro eller Dithane + KaliumPlus 2 liter/ha	Scala + Delan WG/Delan Pro eller Scala + Dithane NT
Clara Frijs afblomstring	Delan WG/Delan Pro eller Dithane + KaliumPlus 2 liter/ha	Scala + Delan WG/Delan Pro eller Scala + Dithane NT
Conference	Delan WG/Delan Pro	Scala + Delan WG/Delan Pro eller Scala + Svovl 5 kg

Bægerråd i æbler

- Fra **fuld blomstring til afblomstring** skal der behandles for bægerråd.
- Bægerråd er en fællesbetegnelse for nekrotiske områder (dødt væv) i blomsterenden, som er forårsaget af infektion i blomstringen.
- Bægerråd forårsages af forskellige svampe hvor gråskimmel (Botrytis) og frugttrækræft (Nectria) er de vigtigste.
- Scala, Switch, Signum virker ikke mod frugttrækræft.

- Hvis det er vådt og under 15°C i blomstringen bruges Scala. Doseringen af Scala skal øges til 1 l/ha for at have effekt mod gråskimmel.
- Gråskimmel & Skurv: hvis det er koldt og vådt:
 - Scala 1 l/ha + Delan WG/Delan Pro eller
 - Scala 1 l/ha + Dithane NT + KaliumPlus 2 liter/ha
- Gråskimmel: Hvis det er tørt og ikke er behov for behandling mod skurv:
 - Signum 0,5-0,75 kg/ha.


Maya Bojesen

Tlf. 21 71 77 57

myb@hortiadvise.dk


Hanne Lindhard Pedersen

Tlf: 87 40 66 06 / Mobil: 23 82 63 47

hlp@hortiadvise.dk