Æble/PæreNYT

Nr. 14 // 7. maj 2020

KONVENTIONEL

Pærebladlopper

- Hold øje med farven på æggene. Æggene bliver mørkorange, når de nærmer sig klækning.
- Movento virker på nymfestadiet, når nymferne via fødeoptag får aktivstoffet i sig.
- **Brug Movento 2 l/ha når størstedelen af æggene er mørkorange.**
- **På tidlige lokaliteter kan nymferne nu være for store til at behandling er effektiv. Så må man vente og behandle på de æg, som giver den næste generation.**
- Tilsæt spredeklæbemidlet Pronet Alfa ca 1 l/ha eller Aminosol ca 2 l/ha (modsat i æbler må Aminosol gerne bruges i pærer efter blomstring)
- Hvis der kun er tale om en så lille population af pærebladlopper, at der ikke er behov for Movento, kan man efter afblomstring styrke bladene med hyppige behandlinger med bittersalt 7 kg/ha. Brug ikke bittersalt i åben blomst.

INDHOLD:

KONVENTIONEL 1
Pærebladlopper 1
Larver i pærer 1
Udtynding 2
ATS i æbler 2
Cerone og Pomoxon Extra 2
Svamp i æbler 3

Larver i pærer

- Hvis man finder mange larver, er det nødvendigt at bekæmpe dem nu. Ofte er det målerlarver, vi finder i pærerne. Frostmålerlarver er lysegrønne og har bugtende gang.
- Turex har virkning på målerlarver, men temperaturen skal være over 15°C og larverne må ikke være alt for store. Når temperaturen ikke er høj nok til Turex, bliver man nødt til at bruge Steward eller Karate/Lamdex. Husk god væskemængde, så midlet bliver godt fordelt.



Målerlarver i pærer kan gøre stor skade, hvis der er mange. Målere har bugtende gang. Af hensyn til middelvalg er det vigtigt at kunne skelne mellem målerlarver og viklerlarver.

Udtynding

Se Æblepærenyt 9_2020 for information om udtynding.

ATS i æbler

- Særligt disse 3 forhold spiller ind på hvor hårdt der skal udtyndes nu: Blomstermængden, eventuel frostskade, udbyttet i 2019. Hvis frugtbelastningen var beskeden i 2019, er der som regel mange, stærke blomster i år, og udtynding er påkrævet (dog ikke i storfrugtede sorter medmindre man har anden erfaring, eller hvis det er for at ramme midtblomsten).
- Før der udtyndes, skal man tjekke for frostskade og biaktivitet. Læg også mærke til blomstringen i bestøvertræerne.
- På den samme lokalitet, kan der indenfor den samme sort, være meget stor forskel på blomstringen: Bunden kan være betydeligt længere fremme end toppen. Blomsterne på nordsiden af træerne kan være senere end på sydsiden. Hvis der er kuldelommer i plantagen, kan blomstringen også være noget senere her.
- **Hvis det er tørt i tiden fra fuld blomstring til afblomstring, kan ATS blandes med Signum for effekt mod gråskimmel (se nedenfor).**



Elstar i samme parcel. Indenfor den samme sort kan der være stor forskel på blomstringen. I toppen til venstre er der kun få åbne blomster. I toppen til højre er der mange åbne blomster.

Cerone og Pomoxon Extra

- Cerone: Ved dagtemperaturer under 15-18°C kan der ikke forventes udtyndingseffekt af betydning. Dagtemperaturen skal være over 18°C, også i dagene efter behandling. I skrivende stund er der ikke udsigt til, at det bliver aktuelt med Cerone foreløbig.
- Pomoxon Extra: Der foreligger endnu ikke svar på ansøgning om Pomoxon Extra. Pomoxon Extra og Cerone har omtrent samme krav til temperaturen for at få effekt. Så selvom vi havde haft Pomoxon Extra, ville det ikke have hjulpet i forhold til udtyndingen.



Clara Frijs. Det er ikke usædvanligt at tælle op til 10 "frugter" i en klase. Selvom frugten bliver sværere at slå af, jo større den bliver, er det i skrivende stund ikke aktuelt med Cerone.

Svamp i æbler

- Fra **fuld blomstring til afblomstring** skal der behandles for bægerråd. Fuld blomstring er, når de første kronblade sidder løst/drysser af.
- I skrivende stund er der ikke udsigt til regn i mængder, som kan give fare for skurvinfektion. Vurdér derfor tidspunkt/middel mod gråskimmel.

Vejr i blomstring	Svampe som trives	Middelvalg
Vådt	Skurv og Gråskimmel	Scala 1 l/ha + Delan WG/Delan Pro eller Scala 1 l/ha + Dithane NT + KaliumPlus 2 liter/ha
Tørt	Gråskimmel	Signum 0,5-0,75 kg/ha

- Hvis vejret skifter, og det bliver vådt og under 15°C i blomstringen bruges Scala. Doseringen af Scala skal øges til 1 l/ha for at have effekt mod gråskimmel.
- Hvis der bliver meldt regn under blomstring, og man har både Delan WG og Delan Pro, skal man bruge Delan Pro i blomstringen på grund af indholdet af fosfit.

REDAKTØRER



Maya Bojesen
Tlf. 21 71 77 57
myb@hortiadvice.dk



Hanne Lindhard Pedersen
Tlf: 87 40 66 06 / Mobil: 23 82 63 47
hlp@hortiadvice.dk

Hortiadvice tager forbehold for tastefejl og lignende. Nyhedsbrevet må ikke videresendes. Hortiadvice har copyright på billederne