

FÆLLES

Solskold

Hvad bør du undgå for at reducere faren for solskold?

- Slå ikke græsset
- Udsæt lysbeskæring
- Udsæt udtynding
- Brug ikke calciumklorid når temperaturen er over 27°C
- Brug ikke svovl eller bicarbonat

Discovery

Afhængig af lokalitet begyndte/begynder høsten af Discovery i denne uge (uge 33).

Clara Frijs

- Vær obs på modningen i Clara Frijs: Varmen kan stresse træerne. Hvis der er få kerner i frugterne, kan det også gøre at frugterne sidder lidt mere løst frem mod høst.
- Er der brugt høje doseringer af Cerone, kørt flere gange og/eller er der behandlet på et sent tidspunkt, bør man holde ekstra godt øje med frugtens modningsudvikling.
- En pegepind for værdier i Clara Frijs: Når fastheden nærmer sig 6, skal man have plukkere klar. Husk at bruge den smalle dorn til fasthedsmålinger i pærer. Forudsat at fastheden fortsat kan holdes på over 6, bør man vente på et sukkerindhold på mindst 11, men 12 er endnu bedre. Hvis der er for stor frugtmængde i forhold til bladmassen, kan det være svært at opnå et godt sukkerindhold da frugten skal plukkes før fastheden bliver for lav.
- Plukketidspunkt:
 - For tidligt: Erfaringer på Årslev viser, at for tidligt plukket frugt taber mere vand end frugt, som er plukket på det optimale tidspunkt.
 - For tidligt: Brækker stilken, når der plukkes, er det fordi der skal bruges kræfter for at få frugten af træerne og det er tegn på at frugten plukkes for tidligt.
 - For tidligt: Udover kvaliteten, vil for tidlig høst, kunne gå ud over frugtstørrelsen og dermed udbytte og afregning.
- Frugt med skader f.eks. fra insektgnav frigiver store mængder ethylen. Ethylen er et stress- og ældningshormon og vil have negativ påvirkning på frugt, som ikke er skadet. Tag derfor ikke skadet frugt med i kasserne!
- Pærer med "sten" på grund af tægestik er ikke så iøjnefaldende som andre skader, så hold ekstra godt øje med dette i de områder/parceller, hvor dette er et problem.

INDHOLD:

FÆLLES	1
Solskold.....	1
Discovery	1
Clara Frijs	1
Stemphylium.....	2
Sene bladprøver	3
KONVENTIONELT	3
Cerone - vær obs på plukketidspunktet	3
SmartFresh	3



Hvis stilken brækker, når der plukkes, er det fordi der skal bruges kræfter for at få frugten af træerne og det er tegn på at frugten plukkes for tidligt.



Frugt med skader frigiver store mængder ethylen, der er et stress- og ældningshormon og vil have negativ påvirkning på frugt, som ikke er skadet. Tag derfor ikke skadet frugt med i kasserne

Stemphylium

- Vær opmærksom på sygdommen Stemphylium. Det er en svampesygdom, der angriber pærer og som kan være meget aggressiv. I 2019 så vi, at angreb lynhurtigt kan udvikle sig i løbet af nogle få uger op til høst.
- Symptomerne er mørkebrune pletter på frugterne, der udvikler sig til råd. På bladene er brune pletter og V-formede områder også typisk for sygdommen
- Svampen inficerer, når det er varmt og fugtigt.
- Svampemidler er kun effektive før symptomerne ses. Ingen midler, af de midler som vi har, er godkendt til bekæmpelse af Stemphylium. Der kan opnås sideeffekt hvis der ved regn+varme behandles mod lagersygdomme med Switch 0,5 kg/ha eller Signum 0,5 kg/ha+Difcor 0,2 l/ha. NB! Husk behandlingsfristerne!



Brune pletter og V-formede områder på bladene er typisk for Stemphylium.

- **Mistanke om Stemphylium? Vi har et mindre projekt i år, hvor formålet er at få et overblik over udbredelsen af Stemphylium. Det betyder, at du i år kan få vurderet og analyseret blade/frugter gratis hos HortiAdvice. Kontakt Maya Bojesen på MYB@hortiadvic.dk**

Sene bladprøver

- Sene bladprøver kan tages frem til **ca 1. september**.
- Tag prøven **inden frugten plukkes**.
- Tag ikke prøver fra træer som viser tydelige tegn på tørkestress, da analyseresultatet næppe vil være retvisende.

Fremgangsmåde for udtagning:

- 1 prøve må kun indeholde blade fra samme sort, parcel, grundstamme og alder
- Vælg træer som har god til kraftig sætning
- 1 prøve består af totalt 100 blade (ca 100 gram)
- Udtag prøven i 0,5-1,5 meters højde.
- Tag blade fra både sol- og skyggesiden af træet og repræsentativt fra hele parcellen.
- **Bladene skal tages fra midten af årsskuddene** (dog hellere nærmere basis end mod skudspidsen).
- Tag kun 1 blad pr skud.
- Tag højst 2 blade fra samme træ.
- **Pluk bladene uden bladstilk.**
- Bladene bør ikke udtages kort efter kraftig regn (> 30-40 mm), og de skal altid være tørre ved plukningen. Hvis det har regnet kraftigt, så vent 3-5 dage inden bladprøven tages.
- Bladene sendes umiddelbart efter plukningen. Brug papirposer.
- Bladprøverne vedlægges analyserekvisition til laboratoriet.
- Spørg din producentorganisation vedrørende eventuelle aftaler.
- Råd fra konsulent: Giv din konsulent besked om, at du vil udtage prøver og du ønsker at vedkommende skal udarbejde gødningsanbefalingerne.

For information om laboratorier og følgesedler se [ÆblePærenyt Nr. 24](#) // 1. juli 2020

KONVENTIONELT

Cerone - vær obs på plukketidspunktet

Er der brugt høje doseringer af Cerone, kørt flere gange og/eller er der behandlet på et sent tidspunkt, bør man holde ekstra godt øje med frugtens modningsudvikling, så man undgår at blive overrasket, hvis frugten modner nogle dage tidligere end forventet.

SmartFresh

- Godkendt til æbler og pærer.
- Behandling med SmartFresh-behandlinger udføres af Jan Jager, som for bestilling kan kontaktes på telefon: 21 67 21 97.

Maya Bojesen
Tlf. 21 71 77 57
myb@hortiadvise.dk

Hanne Lindhard Pedersen
Tlf: 87 40 66 06 / Mobil: 23 82 63 47
hlp@hortiadvise.dk