

Busk&StenfrugtNYT

Nr. 6 // 19. maj 2016

Blomstring er forløbet i helt fantastisk vejr. I skrivende stund ser sætningen generelt god ud, og bliver der ikke for stort junifald, vil der blive rigtig flotte udbytter.


Vanding

Når kulturerne sætter frugt, vokser frugterne meget hurtigt. Det betyder der er fuld gang i celledelingen. Det er derfor nu man skal være opmærksom på at de ikke må mangle vand og at bladkvaliteten skal være i orden. Det er nu grundlaget for frugtstørrelsen lægges, så frugterne skal have de bedst mulige betingelser for celledeling. Vær derfor OBS på vandmangel.

Som det ses nedenfor, er der dele af landet, som allerede har det tørt.

INDHOLD

Vanding.....	1
Svampesygdomme	1
SMS vedr. kirsebærfluer	2
Buskfrugt	2
Surkirsebær	2
Sødkirsebær	3



Husk at græs og ukrudt konkurrerer med kulturen om vand. Hold derfor rent for ukrudt, og græs slået helt kort.

Svampesygdomme

Der findes en del forskellige svampesygdomme. Langt de fleste fremmes af fugtigt vejr. Svampesprøjtninger er derfor særligt aktuelle i fugtige perioder. Den næste tid og indtil bærrerne begynder at ændre farve, er det primært bladene, som skal beskyttes.

Midler som trænger ind i bladene virker længere, end midler der kun ligger uden på bladene. F.eks. Candidit og Signum, fordeler sig i de blade som rammes, og disse blade er derfor dækket ind over en længere periode. Dithane ligger uden på bladet, og virker således kun indtil nedbør har vasket det af, eller bladet er blevet større og altså ikke er dækket helt af. Midlerne har forskellige halveringstider, så det er svært at sige hvor mange dage midlerne generelt virker.

SMS vedr. kirsebærfluer

Sidste år var mange glade for tilbuddet om at modtage en SMS, når der blev fundet kirsebærfluer. De der var med sidste år, er automatisk med i år. Det kræver at man giver besked, når man selv finder fluer, og så skrives det ud i hvilket område der er fundet kirsebærfluer. Prisen er 300 kr. Vil du tilmeldes, så send besked til ghj@seges.dk

Husk også at bestille gule limplader.

.....

Buskfrugt

Lige nu er blomstringen overstået. Selvom man kan se blomsterne endnu, skal man lægge mærke til at der under blomsten, allerede er ved at blive udviklet frugter, og i nogle sorter er de allerede store.

Aktuelle sprøjtninger

Candit må benyttes to gange inden den 1. juni. Dette middel er oplagt at vælge nu. Har man benyttet svampemidler tidligt på året, bør smittetrykket af især skivesvamp være lavt. Hermed bør man kunne strække tiden mellem sprøjtningerne. Candit anbefales benyttet mindst en gang inden 1. juni.

Der er meget gang i skadedyrene. Lige nu kan de alle findes i plantagerne, og inspektion bør derfor foretages forud for sprøjtning. Især Bladlus udvikler sig hurtigt i varmt vejr, og Pirimor er det mest oplagte middel.

Galmyg er næsten umulige at bekæmpe, så det bør opgives, med mindre der mangler vækst i buskene. Viklere bekæmpes NU, hvis der er mange. Dette gøres med Karate.

Bladhvæpse skal der holdes øje med, men da der stadig vil være mange æg som ikke er klækkede, vil bekæmpelse derfor være for tidligt. Er der frostmålere noteres det med henblik på at bekæmpe dem til næste forår.



Bladlus i solbær



Tegn på frostmåler larve har været i denne solbær busk



Her gemmer sig enten vikler eller målerlarver

.....

Surkirsebær

Med årets flotte blomstringsvejr, ser det ud til at der bliver en stor sætning. Sådanne år kan der dog komme stort drys, hvorfor den egentlige sætning ikke kan vurderes før midten af juni.

En del bær er sat i stevnsbær, men intet er sikkert før de kommer fri af blomstersvøben > > >

Aktuelle sprøjtninger

Lige nu er det især vigtigt at forebygge mod angreb af kirsebærbladplet. De fleste midler har god effekt på denne skadevolder. Dithane må bruges fra den 1. juni, og er et oplagt valg, idet dette middel ikke er aktuelt senere på sæsonen, hvor der også skal beskyttes bær.

Monilia kan ses i plantagerne nu. Få noteret hvordan bekæmpelsen har virket, og tag evt. en snak med din konsulent hvis ikke det har virket godt nok.

Inden længe vil man kunne finde især sorte bladlus. Disse bekæmpes bedst med Pirimor. Er der andre skadevoldere som f.eks. larver eller kirsebærsnudebiller, kan Karate ligeledes benyttes.

Snudebiller kan konstateres via bankeprøver. De seneste år er det dog sjældent, der er set angreb af kirsebærsnudebiller.

Gødsning

Hvis udbytterne bliver høje, som man lige nu kan forvente, så vær klar til at gøde op til fuld norm, altså 150 kg N. Dette skal gøres forud for regn, med f.eks. kalksalpeter.

Prunus Nekrotisk Ringplet Virus

Træer som skiller sig ud lige nu, med sen blomstring, rødlige blomster og visner plamager på bladene, skal fjernes. Disse træer er formodentlig angrebet af Ringplet Virus, og vil smitte igen til næste år i blomstringen. På sigt vil disse træer ikke give udbytter. Smitte sker via pollen samt rodsammenvoksninger. Smør evt. stammen med Glyphosat, for at se om der er rodsammenvoksninger til nabotræer. Er der det, bør disse også fjernes.

Sødkirsebær

Det har været det perfekte vejr til bestøvning og befrugtning af de fleste sødkirsebærssorter, dog er de sene sorter nogle steder kun lige over fuld blomst. Frugtsætningen i de tidlige sorter er over al forventning, og Lapins har allerede en pæn frugtstørrelse på omkring 6 mm.

Vanding

Selvom der har været en del regn før den varme periode, og på nogle lokaliteter også de seneste dage, trækker de blomstrende træer og træer med frugt godt i vandbeholdningen. Vær derfor opmærksom på om træerne mangler vand.



Tidlig symptom på monilia i surkirsebær



Bakteriekræft i surkirsebær

Haglskader

Foråret har budt på udsædvanligt mange og lange haglbyger i år. Det har givet en del skader på blade og også på de tidlige sødkirsebærsorter. > >

Bladgødskning på afblomstring:

Bladene i mange sødkirsebærsorter er stadig meget lyse. Da frugtsætningen forventes at være stor, er det vigtigt at få gjort noget ekstra for at få optimeret bladkvaliteten.

3 kg urea (eller 3 L Aminosol) + 0,75 Mantrac + 0,15 Zintrac + 2 L Resistim / 1,5 KaliumPlus



Gødevanding

Husk at ammonium, kalium og magnesium ikke bør tilføres i gødevandet i denne periode. Giv i stedet magnesium over bladene og kalium først 4 uger efter blomstring.

Er der forventning om stor frugtsætning, kan der nu gives supplerende kvælstof på jorden eller i gødevandet, i form af kalksalpeter. Det vil være en fordel at få calcium med ud i celledelingsperioden. Er der meget calcium i vandet, kan man også gødevande med salpetersyre.

Mængden af gødning vurderes efter væksthiveau og grundstamme.

Hvis der ikke er mulighed for gødevanding, skal tildelingen planlægges i forhold til hvornår regntaget forventes opsat, så det kommer ud tidsnok til at få nedbør, blive opløst og optaget inden taget kommer på. Det gælder især hvis planen er at splitte kaliumgødskningen.

Skadedyr

Der er fundet godt med sorte kirsebær lus i bladene og i sødkirsebærtræerne er lusene godt i gang med at rulle bladene sammen og opformeringen er godt i gang. Hvis bekæmpelse ikke allerede er gennemført, skal det ske hurtigst muligt. Når lusene har krøllet bladene, er det svært at få effekt af pyrethroid. DMI lover muligvis vejrlig til Pirimor, og dette skal da vælges, alternativt så må man vælge Mospilan. Dog er det uheldigt at bruge Mospilan nu, da den kun må bruges max 2 gange med 0,25 kg/ha pr sæson, og den er nødvendig at bruge senere på sæsonen, hvis der bliver problemer med kirsebærfluen.

Er der stillet humlebier ud, så husk at tænke på dem inden der behandles.

Humlebier kan flyttes til andre steder i plantagen eller sælg evt. videre til en landmand med f.eks. hvidkløver frø.

Larver

I nogle kirsebærplantager er der problemer med larver. I øjeblikket kan der både findes frostmålere og viklerlarver i bladene.

Viklerlarverne kan bevirke problemer senere på sæsonen, hvis de optræder i stort antal.



Sorte bladlus i sødkirsebær

Gitte Hallengreen Jørgensen

Tlf: 21 71 77 49

ghj@seges.dk

Hanne Lindhard Pedersen

Tlf: 87 40 66 06 / Mobil: 23 82 63 47

hlp@seges.dk

Lene Baarts

Tlf: 40 45 99 98

lba@seges.dk