GrønsagsNYT

Nr. 1 // 13. marts 2018

INDHOLD

Jordbundsanalyser 1
Forårsklargøring af sprøjten.. 1
Lovstof og regler 2
Efterafgrøder..... 3
Økologi..... 3
Nyt om kemi 4
Varslingsværktøjer og håndbøger..... 5
Nyt om enkelte grønsagskulturer: 7
Salat, kinakål og kål..... 7
Løg 7
Gulerødder..... 8
Plukærter..... 9
Arrangementer 10

Aktuelt

Vinteren har her sent holdt sit indtog og trods en lille periode med lidt varmere vejr, lyder meldingen på koldt vejr igen fra slutningen af ugen. Der er kun sået meget begrænsede mængder af ærter og gulerødder. Nedbørsmængderne har oveni gjort det svært at køre i marken og tiden til udplantning lader vente på sig. Jordtemperaturer og prognoser for forskellige områder kan tjekkes på dette link:

Jordtemperatur

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Vejret/Sider/PL_Jordtemperatur.aspx

Jordbundsanalyser

Hvis man ikke har fået udtaget jordbundsanalyser henover vinteren, kan det stadig nås, hvis ellers jorden er tøet op! Det er især vigtigt på ny jord og på lettere jord, hvor indholdet af næringsstoffer falder hurtigere over tid.
Kendskab til de vigtigste mikro- og makronæringsstoffer er et meget vigtigt redskab i gødningsplanlægningen også i den økologiske produktion, hvor der er visse muligheder for at grundgødske ud fra jordbundstallene (se mere om dette under Økologi!).
Mange næringsstoffer udvaskes let henover vinteren. Det gælder specielt nitratkvælstof, kalium, calcium, magnesium, svovl og bor.
Er du i tvivl om noget i fbm. prøveudtagning, valg af laboratorium eller hvilke næringsstoffer, der skal analyseres for, er du velkommen til at kontakte en af konsulenterne i GartneriRådgivningen A/S.

Forårsklargøring af sprøjten

Sprøjten har stået stille vinteren over og bør gennemgås for fejl og mangler, inden den tages i brug til forårssprøjtningerne.

Rengør sprøjten, filtre og dyser

Start med at vaske sprøjten udvendigt og indvendigt, enten med et godkendt rengøringsmiddel til sprøjter, eller med tredobbelt salmiakspiritus (1 liter til 100 liter vand). Lad midlet virke i både tank, armatur, bom og dyser i en times tid. Husk at betjene ventiler m.m. for at skylle alle slangerne igennem. Rengøring af sprøjten skal enten foregå på en vaskeplads med opsamling eller ude i marken.

Fortsæt med at rense dyser og samtlige filtre. Nye dyser kan eventuelt monteres på sprøjten, hvis de gamle virker slidte. Det er en relativt lille udgift, set i forhold til sikkerheden for at sprøjtevæsken fordeles korrekt, og dyserne giver den rette mængde sprøjtevæske.
Når sprøjten er rengjort, gennemgås slanger for knæk og utætheder, samt alle bevægelige dele og pakninger smøres med syrefri olie.

Hvad gør man med frostvæsken?

Inden forårsklargøringen står sprøjten formentlig med frostvæske i slanger, filter og tank. Det giver en stor sikkerhed for, at der ikke opstår frostsprængninger i løbet af vinteren. Men hvad gør man med frostvæsken, når foråret kommer? Frostvæske har faremærkningen `Sundhedsfare`, og skal derfor bortskaffes som farligt affald. Det der kan opsamles, skal enten afleveres ved kommunes genbrugsstation, eller man kan gemme og genbruge frostvæsken.

Lovstof og regler

P regulering

Miljøministeriet har sendt sagen videre til Departementet.
Departementet oplyser, at:

- de erkender et behov for mere fosfor ved flerholds kulturer.
- de vil tage dette med i den kommende ændringsbekendtgørelse med høring medio marts måned, der gælder for næste plan år!
- de ikke vil tage andre helårs grøntsager med i en fosfor forhøjelse!
- de har stor velvilje til at løse problemet - også fra ministerens side

Der arbejdes videre med sagen, men indtil videre gælder det, at:
Der er 30 kg fosforbegrænsning pr ha i 2018, og at en overskridelse af P-loftet ikke vil medføre krydsoverensstemmelse.

Der er lidt mulighed for korrektion ved lave fosfortal:

Over 4	ingen
4,00-3,5	+1 kg P
3,50-3,00	+2 kg P
3,00-2,75	+4 kg P
2,75-2,50	+6 kg P
2,50-2,25	+8 kg P
2,25-2,00	+10 kg P
2,00-1,75	+12 kg P
1,75-1,50	+14 kg P


Og ved husdyrgødning:

Fra fjerkræ og kødædende pelsdyr	+13 kg P
Fra slagtesvin	+9 kg P
Fra søer og smågrise	+5 kg P

Gødningsregnskab og sprøjtejournalindberetning

Husk fristen for indsendelse af gødningsregnskab og sprøjtejournalindberetning d. 31. marts. Alle gartnerier uanset størrelse skal indberette sprøjtejournaler senest den 31. marts. 20. april er frist for indsendelse af fællesskema.

CLP mærkning



Alle midler med gammel mærkning skal "bruges" inden 30/5 2018. Det, der er købt efter 1/7 2017, skulle være ok.

Efterafgrøder

Der findes en del materiale om efterafgrøder i landbrugssædskifter men begrænset i forhold til grøntsagssædskifter. GartneriRådgivningen kører et treårigt projekt, der netop sætter fokus på brugen af efterafgrøder og grøngødning i grøntsagssædskifter. I 2017 er der blevet udarbejdet et katalog, der beskriver udvalgte efterafgrøders egenskaber, rolle for jordens frugtbarhed og dyrkningsmæssige forhold som f.eks. sædskiftesygdomme samt en vejledende information om brugen af efterafgrøder. Begge dokumenter samt en rapport om projektet kan findes på http://www.gartneriraadgivningen.dk/2929-sund-jord-sunde-planter1. Snak også gerne med din grøntsagskonsulent forud for planlægningen af eftergrøder.

Økologi

Regler for gødskning på økologiske brug

Hvis en aktuel jordbundsanalyse viser kalital under 8, må der uden konsulenterklæring gødes med kaliumsulfatgødninger som patentkali op til 8. Hvis en aktuel jordbundsanalyse viser magnesiumtal under 6, må der gødes uden konsulenterklæring med kieserit op til 6. Hvert tal svarer til 25 kg hhv. kali og magnesium. Anvendelse af mikronæringsstoffer i økologisk produktion forudsætter altid en konsulenterklæring.

Økologitilsagn

Hvis man ønsker at opstarte en økologisk produktion senest den 1.september og ønsker Økologisk Arealtilskud, skal der søges om tilsagn til arealerne i fællesskema med frist den 20. april her i foråret, selvom arealerne først lægges om senere.

Frødispensationer

Der er i år igen en hel del økologiske frø i Frødatabasen. Husk, at hvis man ønsker at anvende konventionel ubejdset frø, at der enten

- skal søges dispensation – f.eks. for kålroe, hvidkål, gulerod, kepaløg, og frø af de arter, der ikke findes på listen
- skal anmeldes til Landbrugsstyrelsen, f.eks. sukkermajs, grønkål, og mange flere
- eller at der er generel dispensation, hvor der ikke udbydes nogen økologiske sorter overhovedet

Henover frøudbuddet i den grønne bjælke på frødatabasens hjemmeside, kan du se, hvad du skal for at leve op til i reglerne for frø eller planter. Status for den enkelte art kan ændre sig fra dag til dag, så hold godt øje med databasen.
Ansøgningen skal udfyldes med antal frø, og ikke i vægt. Husk, at man ikke må påbegynde såning/plantning, før man har modtaget en eventuel dispensation, så søg i god tid – der kan være sagsbehandlingstid. For en god ordens skyld fremhæves, at udplantningsplanter altid skal være økologiske. Især for dem, der har mange sorter og arter, der skal søges frødispensation for eller som skal anmeldes, har LandbrugsStyrelsen udviklet et regneark, der kan bruges som bilag. Regnearket sendes sammen med det kendte skema med oplysninger om ansøger, og hvor der henvises til bilaget.

Nyt om kemi

Frø bejdset med Rovral

Rovral har i flere år været forbudt at anvende i Danmark. Aktivstoffet i Rovral hedder iprodion. Den 5. juni 2017 blev det forbudt i hele EU at sælge produkter med iprodion og fra den 5. december 2017 forbudt at anvende.

Bejdsede frø har som standard ofte været bejdset med iprodion. Det er lovligt at købe bejdsede frø, hvis blot frøene er lovligt bejdset i det land, hvorfra de kommer. Selv om iprodion er forbudt i Danmark, har det været lovligt at anvende frø bejdsede med iprodion.
Til sæsonen 2018 kan der endnu være frø på markedet bejdset med iprodion. Frøene er formentlig bejdset før den 5. december 2017, mens det endnu var lovligt at anvende iprodion i nogle EU-lande. Avler kan også have frø liggende på køl fra sidste sæson, som er bejdset med iprodion. Man skal her være opmærksom på, at hvis man anvender frø bejdset med iprodion, kan der være risiko for rester i grønsagerne. Det er endnu uklart, hvornår det er sidste frist for anvendelse af frø bejdset med iprodion, og hvornår der vil være nul-tolerance for rester af iprodion (MRL=0) i EU. Desuden skal man som avler være opmærksom på, at flere supermarkedskæder stiller særlige krav til MRL med nul-tolerance for forbudte midler uanset EU-reglerne. Det gælder i særdeleshed det tyske marked, hvor iprodion blev forbudt allerede i juni 2017.

Særligt for gulerødderne skal man være opmærksom på, at iprodion-bejdsede frø kan ende med at blive til gulerødder, som først bliver høstet og omsat i foråret 2019 – mere end et år efter, at

iprodion blev forbudt i EU. Hvis det er muligt, bør man derfor fortrinsvis vælge frø, som ikke er bejdset med iprodion.

Revurdering af Amistar

Amistar er blevet revurderet. I forbindelse med revurderingen er nedenstående regelrette godkendelser forsvundet:
Jordbær på friland, alle løgafgrøder inkl. forårsløg, porrer, purløg, persille, alle kålafgrøder (blomster, blad og hoved), blegselleri, knoldselleri, rødbede, salat og rucola.

Middel med gammel etikette må anvendes efter de gamle regler, og da Amistar ikke har fået nyt reg.nr., bliver der ikke sat en sidste anvendelses- og opbevaringsdato. Dunken må anvendes indtil den er tømt, og den skal anvendes inden evt. nyindkøbt Amistar med ny etikette. Der er eksempler på, at kontrollen i sådanne tilfælde vil se oversigter over nyindkøbt middel, og hvis der er indkøbt middel (Amistar) med ny etikette, der ikke findes på lageret, men der findes en dunk (Amistar) med gammel etikette, så har man et forklaringsproblem.

Varslingsværktøjer og håndbøger

Orange limplader til varsling for gulerodsfluen

Tidligere deltagere i varslingen mod gulerodsfluen får automatisk tilsendt tilmeldingsbrev. Nye deltagere kan tilmelde sig ved at kontakte Stig F. Nielsen (se kontaktoplysninger under ageruglevarsling). Ved tilmelding skal der angives, hvor mange fældesæt du ønsker og til hvilken generation af gulerodsfluer. Priser ses i nedenstående skema. Tilmelding senest fredag d. 6. april (se kontaktoplysninger i nedenstående).

Tilmelding til varsling for knoporme

Flyvningen af agerugler lå på et lidt lavere niveau i 2017 end tidligere år, og selvom tærsklen blev overskredet på en del lokaliteter, betød nedbørsmængden dårlige overlevelsesbetingelser en del steder og få varslinger om vanding eller sprøjtning. Der forventes lignende aktivitet i 2018, og vejret vil være afgørende for behandlingsbehovet.

Som deltager i ageruglevarslingen får du hver uge på baggrund af dine indberetninger besked om, hvorvidt og hvornår der er behov for behandling. Behandlingen består enten af vanding eller udbringning af et pyrethroid, så varslingen er relevant for både økologiske og konventionelle avlere.

Ageruglens flyveperiode og intensitet bestemmes ved hjælp af feromonfælder, hvor hanner bliver tiltrukket af et duftstof, som ligner det, hunnerne tiltrækker dem med ved parring. Fælderne skal tilses to gange om ugen, og antal fangede agerugler skal indrapporteres én gang ugentligt pr. mail sammen med registreringer af nedbør.

Avlere, som deltog i varslingen i 2017, bliver kontaktet direkte, mens nye avlere bedes tilmelde sig senest fredag den 6. april 2018.

Prisen for et sæt fælder à tre fældehuse er 1.754 kr. ekskl. moms. Selve fældehusene koster 375 kr. ekskl. moms pr. styk, men de har mange års levetid.

Tilmelding kan ske til:

Stig F. Nielsen
Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N
Direkte tlf.: 8740 5448 / mobil: 4010 9089
E-mail: sfn@seges.dk

Vareoversigt		
Orange limplader til gulerodsfluen, papæske med 16 stk.		238,00
Ageruglevarsling 2017	Sverige	2.058,00
Ageruglevarsling 2017		1.790,00
Orange limplader/gulerodsflue	1. generation	1.992,00
Orange limplader/gulerodsflue	2. generation	2.982,00

'Vejledning i planteværn 2018' er udkommet

Håndbogen giver overblik over mulighederne for plantebeskyttelse i eller på landbrugsafgrøder, frugt, bær og frilandsgrønsager. Det samme gælder prydplanter, væksthus- og planteskolekulturer, golfbaner, rekreative områder, skove, læhegn og juletræer.

Håndbogen har to vinkler på sit stof: Den giver dels vejledning om praktisk bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr, dels en beskrivelse af de enkelte midler, som bruges til formålet.
Alle kemiske og mikrobiologiske midler, der er godkendt og markedsført til erhvervsmæssig brug i Danmark, er medtaget foruden som noget nyt basisstoffer i 2018-udgaven.
Prisen for 2018-udgaven er 369 kr. inkl. moms plus forsendelse. Tegner man abonnement på håndbogen, vil der være en besparelse.
Vejledning i planteværn 2018 kan bestilles i Netbutikken.
Abonnement tegnes hos SEGES Forlag: forlag@seges.dk.

Nyt om enkelte grønsagskulturer:

Salat, kinakål og kål

Afhærdning

Vi anbefaler helt klart at afhærde de første hold af salat og kål på en hærdeplads. Der kræves først og fremmest godt læ og en høj placering i terrænet, så arealet ikke oversvømmes af overfladevand, der kan videreføre smitte med kålbrok eller drukne rødderne. Dæk kun planterne med fiberdug på hærdepladsen i tilfælde af nattefrost. Sørg altid for god opvanding af potter/bakker, da det også har en god buffervirkning ved let nattefrost. Er planterne ikke opvandet med startgødning med P og Mo, kan det med fordel gøres ud fra opskriften i nedenstående, mens planterne endnu står til afhærdning.

Korttidsopbevaring på køl

Har man ved modtagelsen ikke mulighed for at sætte planterne ud under beskyttede forhold, f.eks. i et væksthus, kan småplanter af salat og kål opbevares op til 14 dage på køl i mørke ved 2-4 °C. Hold øje med at planterne ikke tørrer ud under lagringen. Inden udplantning kræves der nogle dage på en hærdeplads, før det er tilrådeligt at plante, og der bør vandes med en svag gødningsopløsning for at vække planterne igen.

Udplantning

Når de første udplantningsplanter skal i jorden, kræver det naturligvis både god afhærdning og forsvarlig dækning med dobbelt lag fiberdug. Der dækkes normalt med to lag dug til og med uge 14, eller så længe der er udsigt til decideret nattefrost. Herefter vurderes forholdene individuelt.

Startgødning til konventionelle grønsagssmåplanter

Når jorden er kold, har planterne generelt svært ved at optage tilstrækkeligt med fosfor. Den gammelkendte startgødning til småplanterne er en blanding af DAP og natriummolybdat, der udsprøjtes/overvandes på hærdepladsen. Dette er især vigtigt i kålplanter.
Standardopskrift pr. 10.000 planter, der er sat til afhærdning:
25 g natriummolybdat + 300 g diammoniumfosfat (DAP) i 50 l vand. Det anbefales at skylle planterne efterfølgende med en tilsvarende mængde rent vand. Få gerne oplyst, om planterne allerede har fået startgødning fra plantetiltrækkeren. Det er både en ekstra omkostning, og giver en risiko for at svide rødderne at tilføre DAP i overskud.

Løg

Sætteløg

Hvis der ønskes tidlig høst, skal der anvendes store stikløg, og der skal ikke sættes mere end 500.000 pr. ha. Til lidt senere høst kan anvendes 600.000 pr. ha. Til høst endnu senere kan anvendes små stikløg, og der kan lægges 700.000 pr. ha. Til økologiske sætteløg lægges 50.000 færre end i de konventionelle.
Stikløg skal sættes så dybt, at alle løg er dækket af jord men heller ikke dybere. Der skal placeres 200 kg 12-23-0 eller 18-20-0 pr. ha.
Hvis sætteløgene er dækket med plastic eller fiberdug, skal I huske, at det skal af, inden bladene bliver så store, at dugen knækker bladene ned. Det tåler løgene ikke.

Efter lægning og inden fremspiring af løgene sprøjtes med Stomp CS, Fenix. Der kan måske også anvendes Boxer. Sprøjtningen skal udføres på fugtig jord. Valg af midler og dosering rettes ind efter jordtype. Jo sværere jord, jo højere dosering og mindre risiko ved anvendelse af Boxer. Når

nu vi ikke har Totril mere og skal gøre ukrudtsbekæmpelsen af tokimbladet ukrudt færdig med Xinca/Maya og Fenix, er det meget vigtigt, at der udføres en god bekæmpelse med jordmidlerne og med så høj dosering som muligt. Vi har jo set, at Xinca er hård ved store løg og især sætteløg, så det er vigtigt, at bekæmpelsen er hurtigt færdig, og der til sidst kun er behov for små doseringer mod nyfremspiret ukrudt.
Med de erfaringer, vi nu har med Vacc-Tek anlæg, kan det anbefales at tørre alle løg ved 32-35 °C. Opvarmningen skal ske i mindst en uge, så løgene er gennemvarme med 35 °C i 5 dage, hvorefter der skal tørres færdig med 20 °C. Der er jo også mulighed for at flytte løgene og sætte andre løg ind for at udnytte energibesparelsen. Det bedste for holdbarheden er dog, at løgene bliver stående på samme lager.

Økologi

Afhærdning af planter

Der er bestilt planter hjem i næste uge. Det kan blive nødvendigt at udsætte leveringen.
Løgplanter kan jo ikke sættes på køl i mørke som andre planter. Så det skal være vejr til, at planterne kan komme ud på hærdepladsen.
Husk altid at lave modtagekontrol af alle planter: Er løgene friske eller svage, fremmede arter, optælling af antal planter i potterne, og om der er den rette mærkning af sorter.
De må ikke stå stablet i mørke og på køl mere end absolut max 2 døgn.
Alle løgplanter skal afhærdes mindst en uge.
På hærdepladsen skal de dækkes ved udsigt til temperaturer ned i nærheden af frysepunktet. Helst med paller under, så dugen holdes oppe over løgene. I praksis tit om natten.
Husk at dugen skal tages af om dagen, når der er + temperaturer, og især hvis der er sol. Dugen skal jo også af for, at planterne afhærder.
Ved temperaturer ned til -2 °C skal dugen være hævet over, så den ikke rører ved løgene.
Ved temperaturer under -3 °C skal løgene køres ind.
For ovenstående er det den faktiske temperatur i jordhøjde ved planterne og ikke vejrudsigten i 2 m´s højde.
Sørg altid for at planterne er vandet. Der skal mere frost til at ødelægge dem, når potterne er vandet.

Gulerødder

Det er endnu koldt og vådt. Der er i skrivende stund kun sået ganske få hektar gulerødder under fiber. Selv om jorden er frossen og frøene bare ligger på køl, vil frøene være klar til at spire, så snart solen kommer. Frøene kan godt tåle frosten i jorden og normalt kan delvist spirede gulerodsfrø godt tåle lidt frost på vej op af jorden og tåler også let frost efter fremspiring.

Gulerødder dækket med et tykt lag halm ligger godt beskyttet vinteren over. Den hårde frost i februar har dog været hård ved gulerødder med tyndt lag halm, eller hvor halmen er ujævnt fordelt. Det er specielt kombinationen af frost og hård vind, der er farlig. Halmen holder fint gulerødderne frostfrie, selv om det fryser ÷15°C. Men hvis det blæser, kan jorden under halmen fryse, selv om der kun er ÷3°C. Halmen skal være spredt jævnt over marken – også i sporene. Hvis sporene er fyldt op med halm, vil vinden ofte glide hen over mark og ikke fryse ind i siden af bedene.
Gulerødder kan tåle overraskende meget frost i marken. Vi ser nogle gange, at jorden fryser 5-10 cm ned omkring gulerødderne, og at der stadig er fine rødder, når de høstes. Gulerødder kan tåle frost, hvis de nedkøles langsomt og tør langsomt op i jorden under halmen, hvor der er rigeligt med fugt.
Gulerødder, der er frosne, tåler derimod ikke at blive høstet og tøet op efter høst på vaskeriet.

Hurtig optøning giver rådne gulerødder. Samme problem ser man først på vinteren, hvor et par dage med let nattefrost i november inden halmdækning hurtigt kan ødelægge en mark gulerødder, fordi temperaturen svinger meget mellem tø og frost, og fordi skuldrene i jordoverfladen ligger eksponeret for fryse-tørring.

GartneriRådgivningen har i de sidste 14 dage af februar lavet en lille test af plast og fiberdug som alternativ til halmdækning. Resultaterne viste, at der i den kolde tid ikke er nævneværdig forskel på temperaturen i jordoverfladen, uanset om gulerødder dækkes med fiberdug eller plastik eller plastik og fiberdug eller fiberdug og plastik (se tabel). Temperaturmålingerne viste også, at plast og fiberdug bidrager til store temperaturudsving i løbet af døgnet, hvor gulerødderne fryser om natten og tør om dagen. Det er næppe sundt for kvaliteten. Under halmen er temperaturen meget stabil uden målbare udsving hen over døgnet. Kun ved hård vind uden sne, falder temperaturen under halmen.

Gns. temperatur og temperatursum under dækmaterialer i perioden 13/2 til 28/2

	Bar-jord	Plast	Fiberdug med plast over	Fiberdug	Plast med fiberdug over	Halm
Gns.	0,4	1,2	1,7	1,4	1,6	2,6
Sum	142	430	598	512	572	922



Plukærter

Først når jordtemperaturen nærmer sig 4-5 °C, er det aktuelt at så ærter.

Ukrudtsbekæmpelse

Dækkede plukærter bør behandles med en kombination af jordmidler lige efter såning. I de tidlige hold vil der ofte være tilpas jordfugtighed, og dermed gode virkningsbetingelser for jordmidlerne. Under gunstige betingelser vil behovet for opfølgende behandling efter fremspiring være reduceret og kan i heldige tilfælde helt undlades.

Stomp har antageligvis været anvendt af mange gennem flere år, men strengt taget må hverken den eller afløseren Stomp CS anvendes lige efter såning, men først når ærterne er 3 cm høje. Activus 40 WG, der har samme aktivstof (pendimethalin), må anvendes før fremspiring af ærter, men 10 ugers sprøjtefrist vil være lige på grænsen i de tidligste sorter. Siden indførslen af afgifter, er der ikke sendt nyt Activus på markedet, men det skulle dog fortsat være muligt at få fat på. Pendimethalin (Activus, Stomp CS) er især god, hvor der er mange agerstedmoder, valmuer og fuglegræs, men anses generelt for et rimeligt bredtvirkende middel.
Fenix anses dog for at være mindst lige så bredtvirkende. Udover Fenix er Command CS og Novitron DAM TEC andre muligheder før fremspiring. Sidstnævnte er en blanding af aktivstofferne i Fenix og Command, og kan være et alternativ til en tankblanding. Fenix er god til en række almindeligt forekommende ukrudtsarter, men er dog forholdsvis svag overfor blandt andet brandbæger og natskygge. Command CS er mere smal i sit virkningsspekter, men supplerer Fenix godt med god virkning overfor bl.a. natskygge, burresnerre og pileurter.
Det anbefales at anvende 1,5 - 2,0 l Fenix pr. ha. Ventes store problemer, f.eks. med kamille, kan doseringen øges til 2,5 l pr. ha. Doseringen af Command CS fastsættes på baggrund af hvilke ukrudtsarter, der forventes på arealet samt af Fenix doseringen. Således bør doseringen af Command CS ikke være højere end 0,1 l pr. ha ved høj Fenix dosering, mens der omvendt kan bruges op til 0,2 l pr. ha ved en lavere Fenix dosering. Alternativt til denne tankblanding kan man prøve Novitron DAM TEC, der indeholder samme aktivstoffer svarende til 2,0 l Fenix pr. ha + 0,2 l Command CS pr. ha, hvis man bruger normaldoseringen på 2,4 kg pr. ha. I de fleste tilfælde vil en lidt lavere dosering dog være tilstrækkeligt. Ifølge Middeldatabasen er Novitron en lidt billigere løsning end selv at blande.

Arrangementer

18.-20. marts	Foodexpo 2018, Herning
31. maj	Ukrudtsmarkvandring med løgavlerforeningen på Sjælland og besøg på Flakkebjerg. Peter Hartvig deltager.
19. - 21. juni	Sommertur med løgavlerforeningen til Østrig, Slovakiet og Ungarn. 3 lande på 3 dage!

REDAKTØRER



Ole Scharff
Tlf: 87 40 66 34 / Mobil: 40 73 19 58
ohs@seges.dk



Lars Møller
Tlf: 40 84 30 11
lrm@seges.dk



Karina Frandsen
Tlf: 87 40 66 12 / Mobil: 21 64 80 85
kfr@seges.dk



Emma Christiani Skov
Tlf: 87 40 66 01 / 30 66 61 78
esko@seges.dk



Pernille Kynde
Barselsorlov



Richard de Visser
Tlf: 87 40 66 10 / Mobil: 30 53 87 16
rdv@seges.dk



Peder Krogsgård
Tlf: 40 37 46 51
pkl@seges.dk

GartneriRådgivningen tager forbehold for tastefejl og lignende. Nyhedsbrevet må ikke videresendes. GartneriRådgivningen har copyright på billederne