GrønsagsNYT

Nr. 9 // 29. juni 2018

INDHOLD

Aktuelt 1
Nyt om kemi 1
Tilskudsmuligheder 1
Nyt om enkelte grønsagskulturer: 2
Salat 2
Kål & kinakål 2
Løg 5
Gulerod 7
Pastinak/persillerod 7
Rødbeder 8
Sødkartofler 8
Ærter 9
Sukkermajs 9
Ferie 10

Aktuelt

Vi oplever stadig tørt vejr og nu igen med varme og solrige dage. Oveni har der været blæsten, som har gjort det endnu sværere at følge med, hvor der vandes, så selv marker, der kan vandes, kan tørken komme til at koste udbytte.

Det er også en usædvanligt år for ageruglerne med tidlig flyvning og hurtig udvikling af æg og larver på grund af den høje jordtemperatur. Flyvningen har lokalt været stigende i denne uge men totalt lidt aftagende, og på mange lokaliteter har der været behov for behandling i form af vanding eller sprøjtning.

Vi oplever som i 2016 også flyvning af kålmøl i år og de ses selv i marker med rødbeder og gulerødder, hvor de ingen betydning har. Samtidig er der igen stor variation i omfanget af angreb mellem lokaliteter.

Nyt om kemi

Vertimec i porrer

Der er igen i år givet dispensation til anvendelse af Vertimec EC (aktivstof abamectin) mod trips i porre i perioden 1. juli 2018 til den 28. oktober 2018. Der gælder følgende betingelser:

- Max 0,5 l Vertimec EC, som må udbringes max 3 gange med minimum 7 dages interval på arealer med stor forekomst af trips, og hvor de tilladte behandlinger med Karate 2,5 WG har været udført
- Behandlingen må gennemføres i perioden fra den 1. juli til den 28. oktober 2018
- Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst
- Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
- Selve udsprøjtningen må alene udføres fra en traktor med lukket førerkabine med kulfilter

Brugsanvisningen kan ses her.

Tilskudsmuligheder

Der bliver mulighed for at søge om Miljøteknologi fra den 3. august til den 2. oktober 2018.
Læs mere om ordningen her.

Spørg altid om muligheder for tilskud, inden du går i gang med et projekt.

Kontakt : Mona H. Christensen, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N. Tlf.: 8740 5478.
E-mail: mhc@seges.dk

Nyt om enkelte grønsagskulturer:

Salat

Gammaugler

Der er stadig sværmning af gammaugler, og der meldes om lokalt store forekomster af larver i salat, spidskål m.fl. Der er ikke umiddelbart tegn på et stop i sværmningen, og den fortsatte sommer vil formentlig føre til en yderligere opformering af arten, måske med tilskud af nye voksne fra øst og syd.

Den målerlignende larve sidder oftest kun en eller to pr. plante, men kan meget nemt ødelægge kvaliteten af produktet ved at gnave og svine med ekskrementer. Den har også en uvane med at søge indad i hovedet, så det kan være vanskeligt at opdage skaden i fbm. skæringen.

Bekæmpes bedst i de tidligste larvestadier med Steward i konventionel salat og B. t. middler i økologisk.

Salatbladlus

Vi ser så småt de første angreb af salatbladlusen. Salatbladlusen tilbringer vinteren bl.a. på arter af Ribes (f.eks. solbær) og forlader den igen i løbet af sommeren og søger mod salatmarkerne. Den søger gerne indad i salathovederne og kan oftest kun afsløres ved gennemskæring af et antal hoveder. De fleste konventionelle salater er fra frø behandlet med et systemisk insekticid, så de vil være beskyttet de første uger efter udplantning. Som regel klinger effekten af inden høst, så der vil være risiko for angreb mod slutningen af kulturen.

Bladtæger

Nu ses der også bladtæger i salaten, både voksne og nymfer. Det er som oftest de vingeløse nymfer, der gør størst skade i bladgrønt. Deres gnav i bladene giver grimme ar i bladpladen. Angrebene er som regel størst i markkanten. Der er ingen godkendte bekæmpelsesmidler mod bladtæger i salat, men der vil være en sideeffekt ved bekæmpelse af andre insekter med f.eks. pyrethroider (Cyperb, Fastac)

Salatskimmel

Det er meget begrænset, hvad der fundet af bremia, salatskimmel, i denne sæson. Omskift til mere ustadigt vejr kan evt. sætte gang i angreb. Normalt ser vi først deciderede angreb, når nætterne bliver længere igen efter Skt. Hans og der bliver mere nattedug. Hvis der ikke anvendes fuldt resistente sorter, kan der forebygges med Aliette WG 80.

Kål & kinakål

Som i 2016, ved den sidste store invasion af kålmøl, er der meget stor forskel på omfanget af kålmøl plagen i år. I nogle kålmarker er der omfattende angreb med mange larver pr. plante, mens andre kun oplever enkelte larver i områderne med mest læ. Fik man ikke has på den første generation af larver, er man nu i en situation med en blandet fordeling af individer på voksne, æg,

larver og pupper. Der er stadig bedst effekt mod kålmøllene med brug af Steward mod de små larver. Larver af kålmøl og kålsommerfugle kan bekæmpes i rødkål, hvidkål, savoykål, blomkål, broccoli og rosenkål med 85 g Steward pr. ha; der er 1 dags sprøjtefrist (dog 28 dage i rosenkål) og et loft på 3 behandlinger pr. sæson. Må kun bruges uden for biernes flyvetid.

Hvis der er et stort angreb i gang i marken, kan der også behandles med det systemiske Movento SC 100, evt. i blanding med Steward eller et godkendt pyrethroid, hvis der er andre skadevoldere på spil også. Der findes en godkendelse til mindre anvendelse af Movento SC 100 netop mod kålmøl. Movento SC 100 er også godkendt i bladkål.

I økologi er der også ganske god effekt af B. t. midlerne Dipel DF og Turex på de små larver, forudsat larverne er små og midlet udbringes sidst på dagen (f.eks. efter kl. 18), så det kan sidde i længst mulig tid inden næste dags sol. UV strålingen nedbryder nemlig hurtigt midlet på bladoverfladen. Der er ingen sprøjtefrist, så midlet er også en mulighed for konventionelle avlere. Blot skal man huske, at larverne skal nå at indtage midlet over 1-2 dage, før der opnås en effekt.

Vi har erfaret, at der begynder at blive knaphed på nogle af ovennævnte insektmidler, bl.a. Steward og Dipel DF, så det anbefales at tage en snak med leverandørerne med det samme, hvis der er ved at være tomt på kemilageret.

Stor og Lille Kålsommerfugl

Der ses i disse dage rigtig mange hvide sommerfugle over markerne. Om det er Stor eller Lille Kålsommerfugl, vides ikke, men begge arters larver giver gener for kålavleren. Bekæmpelsen er som med kålmøllene rettet mod de små larver; dvs. Steward i konventionelle kål og B.t. midler i økologisk.

Kålbladlus

Der er nu mange angreb af kålbladlusen i både blomster-, blad- og hovedkål. Under gunstige forhold (fugtigt og lunt vejr) vil de hurtigt kunne sprede sig fra enkeltplanter til mange planter pr. mark. Et angreb opdages typisk på de misfarvninger og krusninger, der opstår i bladene, hvor bladlusene sidder.

Den gode nyhed er, at de sidste ugers kraftige angreb af bladlus i landbrugsafgrøderne har medført en større opformering af "good guys" som mariehøns og svirrefluer, hvis larver er effektive rovdyr mod bladlusene.

Kålbladlus kan normalt bekæmpes med et godkendt pyrethroid, men er angrebet meget omfattende, eller der ikke er andre skadevoldere, er der følgende muligheder:

Pirimor G - godkendt i blomkål, broccoli, grønkål, hvidkål, kinakål, rosenkål, rødkål og savoykål med 0,3 kg pr. ha og max. 1 behandling. Behandlingsfrist 3 dage.

Movento SC 100 – godkendt i bladkål, blomkål, blomsterkål, broccoli, grønkål, hovedkål, hvidkål, kinakål, rosenkål, rødkål, savoykål og spidskål. Maksimalt 2 behandlinger med et interval på 14 dage. Behandlingsfrist 3 dage.

Biscaya OD 240 – godkendt som en mindre anvendelse mod kålbladlus i kinakål, glaskål, grønkål, palmekål, pak choy og rucola. Maksimalt 1 behandling, 14 dages behandlingsfrist.

Ifølge de tilgængelige oplysninger på Middeldatabasen er både Pirimor G og Movento SC 100 skånsomme overfor nyttedyr som mariehøns og snyltehvepse. Det samme gælder ikke pyrethroiderne.

Den lille Kålflue

Vi har endnu ikke konstateret æglægning af anden generations kålfluer, men det må være et spørgsmål om timer eller dage, så vær klar til at dække med insektnet. Hvis planterne er bestilt med en behandling med spinosad, er det vigtigt, at denne behandling er udført så tæt på afskibningen af planterne som muligt for at holde en effekt i marken de første uger efter udplantning. Kontakt gerne planteleverandøren for at få aftalt dette.

Følg udviklingen i flyvningen her.

Trips

Udsigten til en ny varme- eller hedebølge er også udsigt til sværmning af trips. Der vil formentlig blive frigivet en del korn- og kåltrips, når høsten af korn og skårlægning af raps rigtig tager fart. Disse trips vil være en stor trussel mod kålene, så hold øje med de små, aflange insekter ("tordenfluer"), når vejret er lummert og stille – tripsenes yndlingsvejr!

Følgende midler er godkendt til brug mod trips i kål (ikke alle typer kål – se etiket):

0,2 kg pr. ha Karate 2,5 WG, max 3 behandlinger i broccoli, blomkål, rosenkål, savoy-, rød- og hvidkål. Behandlingsfrist 3 dage. Max 3 behandlinger.

0,2 l pr. ha Cyperb 100 i hvidkål, rosenkål, rødkål og savoykål, max 1 behandling. Behandlingsfrist 7 dage

0,225 l pr. ha Fastac 50 i hovedkål, broccoli og blomkål. Behandlingsfrist 7 dage. Max 2 behandlinger

Det er ikke vist, men vi har en anelse om, at netdækning har en vis effekt overfor tripsene, selvom de er mindre end maskestørrelsen. Nettene kan virke ved at forvirre tripsene og måske hindre dem i at nå kålene.

Kålbrok

I de sidste par uger er der konstateret ret omfattende angreb af kålbrok i både konventionel og økologisk produktion. Måske lidt overraskende set i lyset af den tørre sommer, da sygdommen breder sig med jordvandet. De høje temperaturer kombineret med intensiv vanding giver dog kålbrok rigtig gode betingelser. Vi har også en formodning om, at smittetrykket er ekstra højt i år i mange marker pga. den fugtige sommer i 2017, der har givet grobund for en opformering af kålbrok. Sygdommen holdes ved lige af korsblomstrede efterafgrøder, spildraps og korsblomstret ukrudt. Et højt reaktionstal, gerne over 7, en god jordstruktur og et godt sædskifte er normalt nok til at forebygge udbrud af kålbrok.

Løg

Vanding

Alle sætte- og planteløg skal have 25-30 mm om ugen indtil 1-2 uger før frilægning, og såløgene skal nu have 20-25 mm om ugen. Der bør ikke gives mere end 15-20 mm ad gangen. Mindst på den letteste jord.



Det går stærkt og der er allerede frilagt sætteløg d. 22. juni 2018

Gødning i konventionelle såløg

Skal afsluttes nu med både det sidste patentkali og kvælstof. Der kan dog stadig gives 75-100 kg kalksalpeter pr. ha, hvis der mangler lidt kvælstof, for at holde liv i løgene. Nitratprøverne har generelt vist højt indhold, så der er ikke så stort behov, med mindre at der pludselig kommer meget regn, eller der vandes kraftigt på let jord.

Svampebekæmpelse konventionelle løg

Der er fundet løgskimmel i sætteløgene flere steder i landet, men stadig ikke fundet noget angreb i såløgene.

De største såløg har 10 blade, så der skal forebygges med 2,0 kg Dithane NT + 0,3-0,4 l Shirlan pr. ha. Så længe det er tørt, skal der ikke forebygges så intensivt, og der kan gå 10-12 dage mellem behandlingerne. Hvis der kommer skimmelvejr, og der bliver varslet om skimmel fund, skal der behandles hver uge skiftevis mellem 0,5 Shirlan + 2 kg Acrobat WG, hvis I har den gamle Acrobat, ellers skal der bruges 0,5 Shirlan + 1,6 Acrobat Plus + 0,5 Dithane NT pr. ha.

Eller 2,5 l Cabrio Duo + 0,5 Shirlan + 1,0 Dithane NT pr. ha med meget korte intervaller (3-4 dage).

Sporerne kommer om natten, hvis der er over 92 % luftfugtighed eller våde blade i mindst 4 timer. Hvis det regner, sker der ingen smitte. Infektionen sker om morgenen indtil kl. 9 eller senere, hvis der er 3 sammenhængende timer med fugtige blade, stadig under forudsætning af at det ikke regner. Optimal smittetemperatur er 10-12 °C. Hvis middeldagtemperaturen kommer over 24 °C, sker der ikke sporulering den efterfølgende nat.

Switch 62,5 WG kan bruges mod gråskimmel og bladgråskimmel. Det er en dyr behandling og bruges kun, hvis vi er inde i en periode med varmt og fugtigt vejr, altså rigtigt gråskimmelvejr.

Der kan også bruges Signum, men vi skal helst have, så der kan behandles med 2x1 l Signum pr. ha inden frilægning.

Som forslag til forebyggende, kan behandles efter følgende plan i de gule:

- 5-6 uger før forventet frilægning; 2 kg Dithane NT + 0,3 Shirlan
- 4-5 uger før forventet frilægning: 2,5 l Cabrio Duo + 0,3 l Shirlan + 1,0 Dithane NT
- 4 uger før forventet frilægning: 1,6 kg Acrobat Plus + 0,3 Shirlan + 0,5 Dithane NT
- 3 uger før forventet frilægning: 2,5 l Cabrio Duo + 0,3 l Shirlan + 1,0 Dithane NT
- 2 uger før forventet frilægning: 1 kg Signum WG + 0,3 l Shirlan
- 1 uge før forventet frilægning: 1 kg Signum WG + 0,3 l Shirlan

Husk at ved angreb eller varsling om angreb skal der behandles meget mere intensivt.

I **røde løg** kan mængden af Shirlan med fordel øges.
Til forebyggende behandlinger bruges der 2,0 kg Dithane NT + 0,4 l Shirlan pr. ha.

Hvis der bliver fundet skimmel, skiftes mellem
0,5 Shirlan + 2 kg Acrobat WG, hvis I har den gamle Acrobat, ellers skal der bruges 0,5 Shirlan + 1,6 Acrobat Plus + 0,5 Dithane NT.
Eller 2,5 l Cabrio Duo + 0,5 Shirlan + 1,0 Dithane NT pr. ha med meget korte intervaller (3-4 dage).

Som forslag til forebyggende, kan behandles efter følgende plan i de røde:

- 5-6 uger før forventet frilægning; 2 kg Dithane NT + 0,4 Shirlan
- 4-5 uger før forventet frilægning: 2,5 l Cabrio Duo + 0,4 l Shirlan + 1,0 Dithane NT
- 4 uger før forventet frilægning: 1,6 kg Acrobat Plus + 0,4 Shirlan + 0,5 Dithane NT
  Ved varmt og fugtigt vejr kan lægges en ekstra sprøjtning ind med: 1,0 kg Switch 62,5 WG + 0,5 l Shirlan
- 3 uger før forventet frilægning: 2,5 l Cabrio Duo + 0,4 l Shirlan + 1,0 Dithane NT
- 2 uger før forventet frilægning: 1 kg Signum WG + 0,4 l Shirlan
- 1 uge før forventet frilægning: 1 kg Signum WG + 0,4 l Shirlan

Husk, at ved angreb eller varsling om angreb skal der behandles meget mere intensivt.

Trips

Hvis der er trips, kan der medtages 0,2 kg Karate eller 0,75 l Movento pr. ha.
Alle doseringer er pr. ha.

Sammen med svampesprøjtningerne skiftes der mellem at iblande enten 3 kg bittersalt (2 % magnesiumsulfat opløsning), 1,5 kg mangansulfat eller 1,5 kg zinksulfat pr. ha. Der må ikke sprøjtes i solskinsvejr pga. risiko for svidning. Der kan også bruges et bredspektret mikronæringsmiddel, som medtages med 1-1,5 l, hver gang der svampesprøjtes.
Til de sidste behandlinger kan bruges 4-5 kg urea pr. ha.
Virkning og dækning forbedres ved tilsætning af spredeklæbemiddel. Ved tilsætning af mikronæring kan det evt. undlades.

Økologi

Den sidste gylle- eller Binadantilførsel skal, afhængig af såløgenes størrelse, gives først i juli.

Gråskimmel

Der kan forebygges mod gråskimmel i planteløgene med Serenade ASO.
Der skal behandles med 5,0 l + 0,15 Aminosol pr. ha 5 gange med 10 dages mellemrum fra løgene har 8 blade.

Ukrudtsbekæmpelse i økologiske løg

Skal være overstået, men der kan dog stadig være behov for at trække stort ukrudt af.

Gulerod

Vanding & tørke

Husk skurvvanding. Det er meget tørt.

Små gulerodsplanter bruger ikke meget vand og kan tåle tørke i en længere periode uden at tage varig skade. Ofte genoptager gulerødderne væksten, så snart der kommer vand. Først når gulerodsplanterne bliver så store, at de lukker sammen i rækkerne, vil bladmassen og fordampningstabet være så stort, at gulerødderne sover i tørken, hvis de ikke vandes. Sovende gulerødder, hvor bladene ligger fladt på jorden, vil ofte tage skade. Først fordi de mister blade og skal sætte nye blade for at genoptage væksten, og dernæst fordi gulerodsbladene let inficeres med bladplet, når de var været en tur på jorden.

Gulerødder, som har ligget ned i tørken, skal senere sprøjtes mod bladplet.

Over en periode på godt 30 år blev der i Norge gennemført en serie forsøg i forskellige grønsager, hvor man lavede kunstig tørke på tre forskellige tidspunkter i vækstforløbet. I forsøgene med gulerødder blev de udsat for tørke i 3 uger enten:

1) tidligt i vækstperioden (kort tid efter fremspiring mens planterne er helt små)
2) midt i vækstperioden (på det tidspunkt hvor gulerødderne begynder at lukke sammen i rækkerne) eller
3) sidst i vækstperioden (når rodtilvæksten er størst op med høst)

Konklusionen for gulerødderne blev, modsat mange andre grønsager, at tørke i starten gav godt 10% højere udbytte (formentlig fordi gulerødderne bliver længere, når de søger ned efter vand) men lavere sukkerprocent (dårligere smag) samt revner (ringere kvalitet). Tørke midt i sæsonen og sidste på sæsonen gav lavere udbytte (÷ 15-20 %). Tørke sidst på sæsonen gav højere sukkerindhold og dermed bedre smagsoplevelse.

Der er vores oplevelse, at det tørre vejr i maj-juni har medført, at gulerødderne er markant længere i år end normalt. Længden påvirkes også af plantetallet i marken og efter et forår med vanskelige fremspiringsbetingelser og lavere plantetal, skal gulerødderne være længere.

Pastinak/persillerod

Hold godt øje med angreb af knoporm og følg varslingen. Specielt persillerod er meget modtagelig. Knoporm er mindre tilbøjelige til at lægge æg i pastinak.

Pastinakkerne har nu nået en størrelse, hvor de lukker sammen i rækkerne. Det er nu tid til at holde øje med angreb af bladplet.

Produkter mod svampesygdomme i pastinak

Produkt	Sygdomme	Max dosering	Antal[1)]	Sprøjtefrist
Amistar[1]	Bladplet	0,8 l/ha	max 1 beh	14 dage
Armicarb 85 Sp [2]	Meldug	3 kg/ha	max 8 beh	1 dag
Dithane NT	gulerodsbladplet	2 kg/ha		30 dage
Ortiva Top	Bladplet, knoldbægersvamp, meldug	1 l/ha	max 1 beh	14 dage

Produkt	Sygdomme	Max dosering	Antal[1)]	Sprøjtefrist
Signum WG	Bladplet, cercospora, meldug	1 l/ha	max 2 beh	14 dage
Switch 62,5 WG	Rodfiltsvamp, knoldbægersvamp	0,8 kg/ha	max 2 beh	7 dage

[1)]: max 2 behandlinger med strobilurin-holdige produkter.

[2)]: godkendt til anvendelse i både konv. og økologi.

Rødbeder

Bedefluer

Bedefluerne lægger æg igen. Hold øje med æglægningen. Æggene er lette at finde på undersiden af de ældste blade. Bedefluer bekæmpes let i rødbeder med Karate 2,5 WG.

Vi ser i stigende omfang Ramularia-bladplet i rødbeder. Angreb opstår ofte i store pletter, hvor planterne visner helt ned. Der findes umiddelbart ingen godkendte midler til bekæmpelse af bladplet i rødbeder. Efter at Amistar er revurderet, står rødbeder ikke længere på etiketten. Armicarb 85 SP er minor-use-godkendt mod meldug og virker formentlig ikke mod bladplet. Switch 62,5 WG er minor-use-godkendt mod rodfiltsvamp og knoldbægersvamp. Sideeffekt mod ramularia-bladplet er ukendt og med en dosering på 0,8 kg/ha bliver prisen relativt høj for Switch.

Vanding

Rødbeder skal vandes intensivt både for at undgå skurvede rødder, men også fordi rødbeder har vanskeligt ved at starte op igen efter udtørring. Når de vandes intensivt, skal man være særlig opmærksom på, at rødbederne ikke løber tør for kvælstof. Hvis rødderne tager skade af tørke, har de vanskeligere ved at holde trit med kvælstofoptagelsen.

Sødkartofler

Sødkartofler kommer oprindeligt fra tropiske områder af Sydamerika og elsker varme og trives bedst ved 24 °C og rigeligt med vand. Der er således god vækst i sødkartofler, når det er så varmt som det er i år.



26. juni 2018. Et kig ind under fiberdugen med to rækker sødkartofler på et bed af 2 meter.



4. juli 2017. Til sammenligning med sidste år hvor det var relativt koldt i juni. Her er fiberdugen lige taget af sødkartoflerne.

Ærter

Bladlus

Der er nu bladlus i mange ærtemarker. Skadetærsklen i markærter er ved 15-20% angrebne planter i blomstring, mens der kan tolereres 50% ved afblomstring. Ved bekæmpelse af bladlus kan følgende midler anvendes:

Pirimor G (0,25 kg pr. ha, 3 dages behandlingsfrist og kun 1 behandling pr. sæson)

Karate 2,5 WG (0,3 kg pr. ha, 7 dages behandlingsfrist og maks. 3 behandlinger pr. sæson)

Mavrik Vita (0,15-0,2 l pr. ha, 7 dages behandlingsfrist og maks. 2 behandlinger pr. sæson)

Cyperb 100 (0,25 l pr. ha, 14 dages behandlingsfrist og maks. 1 behandling pr. sæson)

Cythrin 500 (50 ml pr. ha, 14 dages behandlingsfrist og maks. 1 behandling pr. sæson)

Fastac 50 (0,225 l pr. ha, 7 dages behandlingsfrist og maks. 2 behandlinger pr. sæson)

Vær opmærksom på evt. mærkning om bifare.

Svampesygdomme

Gråskimmel angriber især bælgene i varmt og fugtigt vejr, og angreb starter ofte i blomsten, når den ikke rigtig falder af.

Ærteskimmel ses som en skimmelbelægning bag på bladene, mens oversiden er gullig. Bælgene kan også angribes. Ærteskimmel fremmes af kølige og fugtige forhold.

Amistar (reg.nr 1-172) med den nye etikette angives kun at have en lav til moderat effekt mod ærtesyge og ærteskimmel med 0,6 l pr. ha og 14 dages behandlingsfrist. Ifølge den gamle etikette er der derimod mulighed for at anvende op mod 1,0 l pr. ha og derfor sandsynligvis en bedre effekt. Middel med den gamle etikette må anvendes så længe lager haves.

Signum WG er godkendt mod både gråskimmel og ærteskimmel med 1,0 kg pr. ha og 14 dages behandlingsfrist.

Switch 62,5 WG er godkendt mod gråskimmel med 1,0 kg pr. ha og 14 dages behandlingsfrist.

Sukkermajs

Bladlus

De første bladlus er for længst kommet ind i sukkermajsmarkerne, og det varme vejr kan forårsage en kraftig opformering. Honningduggen fra bladlusen er ødelæggende for kvaliteten, da der ofte udvikler sig svamp i overfladen på angrebne kolber.

Følgende midler er godkendt mod bladlus i sukkermajs:

Plenum 50 WG er godkendt med en mindre anvendelse mod bladlus i sukkermajs med 1 behandling med 0,15 kg pr. ha og 14 dages behandlingsfrist

Cyperb 100 er godkendt med 1 behandling med 0,25 l pr. ha og 14 dages behandlingsfrist

Pirimor G, LFS Pirimicarb er godkendt med en mindre anvendelse mod bladlus i sukkermajs med 1 behandling med 280 g pr. ha og 7 dages behandlingsfrist.

Ferie

Peder Krogsgård holder ferie uge 27, 29 og 30

Karina Frandsen holder ferie i uge 30-32

Lars Møller holder ferie i uge 30 og 31

Richard de Visser holder ferie i uge 28-31

Emma Christiani Skov holder ferie i uge 26-28

Ole H. Scharff holder ferie i uge 30-32

Dan H. Christensen holder ferie i uge 27, 34 og 35

REDAKTØRER



Ole Scharff
Tlf: 87 40 66 34 / Mobil: 40 73 19 58
ohs@seges.dk



Lars Møller
Tlf: 40 84 30 11
lrm@seges.dk



Karina Frandsen
Tlf: 87 40 66 12 / Mobil: 21 64 80 85
kfr@seges.dk



Emma Christiani Skov
Tlf: 87 40 66 01 / 30 66 61 78
esko@seges.dk



Pernille Kynde
Barselsorlov



Richard de Visser
Tlf: 87 40 66 10 / Mobil: 30 53 87 16
rdv@seges.dk



Peder Krogsgård
Tlf: 40 37 46 51
pkl@seges.dk

GartneriRådgivningen tager forbehold for tastefejl og lignende. Nyhedsbrevet må ikke videresendes. GartneriRådgivningen har copyright på billederne