GrønsagsNYT

Nr. 9 // 3. juli 2017

Aktuelt

Selv om det ikke er meget sommerlige temperaturer, vi oplever for tiden, sker der alligevel en vis udvikling i insektbestanden, bl.a. af bladlus og kålmøl. Vi ser de første vinduesgnav af kålmøllarver i diverse kålkulturer nu og faktisk også spredte pupper fra et tidligt angreb. Der er mange bladlus i f.eks. ukrudtsplanter pt og der sker glædeligvis en opformering af både mariehøns, guldøjer og svirrefluer, der kan afhjælpe evt. angreb i grønsagerne.

INDHOLD:

Tilskudsmuligheder 1
Nyt om kemi 2
Nyt om enkelte grønsagskulturer: 2
Salat 2
Kål 3
Løg 4
Gulerod 7
Pastinak og persillerod 8
Rødbede 8
Jordskokker 9
Sukkermajs 9
Ferie 10

Tilskudsmuligheder

Ansøgningsrunde om tilskud til prydplante og frugt- og grøntprojekter

Bestyrelserne for

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter og

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

har besluttet afholdelse af ansøgningsrunde om tilskud til projektgennemførelse i 2018.

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest den 2. oktober 2017 kl. 12.00.

Ansøgningsskemaer med vejledning

kan hentes på www.produktionsafgiftsfond.dk og www.promilleafgiftsfond.dk.

På hjemmesiderne findes information om vilkår for tilskud herunder fondenes strategi og tildelingskriterier.

For yderligere information kontakt Ole Bønnelycke på olbo@danskgartneri.dk eller telefon 36 16 62 00.

Miljøteknologi ordningen åbner den 1. august 2018

Spørg altid om muligheder for tilskud, inden du går i gang med et projekt. Kontakt : Mona H. Christensen, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N. Tlf.: 8740 5478. E-mail: mhc@seges.dk

Nyt om kemi

Vertimec i porrer

Der er igen i år givet dispensation til anvendelse af Vertimec EC (aktivstof abamectin) mod trips i porre i perioden 1. juli 2017 til den 28. oktober 2017. For at bruge Vertimec EC lovligt, skal følgende betingelser være opfyldt:

- Max 0,5 l Vertimec EC, som må udbringes max 3 gange på arealer med stor forekomst af trips, og hvor de tilladte behandlinger med Karate 2,5 WG har været udført
- Behandlingen må gennemføres i perioden fra den 1. juli til den 28. oktober 2017
- Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst
- Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet
- Selve udsprøjtningen må alene udføres fra en traktor med lukket førerkabine med kulfilter

Brugsanvisningen kan ses her.

Nyt om enkelte grønsagskulturer:

Salat

Gammaugler

Der fanges stadig en del gammaugler både vest og øst i landet og nu finder vi også de første larver. Larven af gammauglen er grønlig med en lysere stribe ned langs siden. Den ligner en "målerlarve", idet den har et reduceret antal gangvorter i fht. de fleste andre sommerfuglelarver Larverne bekæmpes bedst i de tidlige stadier med f.eks. Steward eller i økologi Dipel/Turex.

Snegle

Trods en længere periode med tørt vejr har vi løbende fundet både agersnegle og dræbersnegle i kulturer som salat og spidskål og med regnfaldet her i weekenden kan vi frygte for en opblomstring. Snegle bekæmpes bedst forebyggende, inden de angriber planterne. I modsat fald er de svære at lokke ud igen. Sort jord på foragre og i en bræmme mellem hegn og afgrøde forhindrer normalt den værste indvandring af snegle udefra.

Husk at supplere allerede udlagte sneglekorn regelmæssigt (ca. hver 3. uge), da de har en begrænset levetid.

Bladlus

Der er set enkelte vingede bladlus i salaten, men de er nærmest umulige at artsbestemme. En del er formentlig de første salatbladlus, der i denne tid søger væk fra vinterværten (Ribes arter) til sommerværten (bl.a. salat). Hold derfor øje med disse vingede bladlus og bekæmp dem, inden de når at opformere sig i salaten. De fleste konventionelle salater er tiltrukket fra insektcoatede frø el. lign., så de er beskyttet mod angreb de første 4-5 uger fra udplantning. Det er derfor vigtigt at holde øje med kulturen, når denne virkning hører op.

Knoldbægersvamp

I år har der været forholdsvis mange angreb af knoldbægersvamp i salatmarkerne og det ser ikke ud til at være helt ovre endnu. Det er som regel værst i kulturer, der har været dækket med fiberdug en overgang, men ses i år også i de senere hold, da det det både har været køligt og til dels fugtigt på det sidste. Hollandske erfaringer tilsiger, at risikoen for knoldbægersvamp øges, hvis man udfører en for dyb ukrudtsrensning. Det er ikke nødvendigt at gå dybere end f.eks. 1,5 cm.

Ud over at være en sædskiftesygdom, så man i princippet kan undgå de værste angreb ved et fornuftigt valg af mark, er følgende midler godkendt mod knoldbægersvamp i salat: Signum WG, Ortiva Top, Cabrio Duo.

Contans er godkendt som forebyggende middel i både økologisk og konventionel produktion, men kræver op til et par måneder i jorden for at have tilstrækkelig effekt på hvilelegemer af knoldbægersvamp.

Kål

Kålmøl

Der er efterhånden nogle kålmøl på vingerne, men dog slet ikke i stil med sidste års invasion. De første vinduesgnav kan nu findes, specielt langs hegn og markender, hvor der er lidt mere læ. Erfaringerne fra sidste år er, at Steward virker rigtig godt mod de små larver og at det er vigtigt at komme ud med midlet en smule på forkant, så det fastlægges i bladenes voks. Har man en stor flyvning, kan de voksne kålmøl også rammes ved at iblande et godkendt pyrethroid.

Larver af kålmøl og kålsommerfugle kan bekæmpes i rødkål, hvidkål, savoykål, blomkål, broccoli og rosenkål med 85 g Steward pr. ha; der er 1 dags sprøjtefrist (dog 28 dage i rosenkål) og et loft på 3 behandlinger pr. sæson. Må kun bruges uden for biernes flyvetid.

Det er også muligt at anvende Dipel DF eller Turex WG/WP på de helt små larver, men det kræver en periode med stille og fugtigt vejr for at være effektivt. Der er ingen behandlingsfrist på disse B.t. midler, der også er godkendt i økologisk produktion.

Uanset valg af middel opnås klart bedre effekt, når der anvendes et sprede-klæbemiddel.

Den lille Kålflue

Vi nærmer os stærkt æglægning af 2. generations kålfluer. Det varierer rigtig meget efter lokalitet i år, som man selv kan konstatere ved at afprøve nedenstående model. Kystnære, sydlige lokaliteter med sandet jord og godt læ er længst fremme. På de luneste steder forventer vi æglægning allerede fra sidst i denne uge (uge 27).

Planter, der under tiltrækningen er behandlet med spinosad, eller stammer fra coatet frø, kan normalt modstå angreb af kålfluer i op til 3 uger efter udplantning. Dækning med insektnet er den sikreste metode (fiberdug er generelt uegnet nu pga. varmen) til at holde kålfluerne stangen. Flyvningen og dermed æglægningen vil typisk strække sig over 3-4 uger.

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Skadedyr/Skadedyrsarter/Sider/PL_Kaalflue_varsling.aspx

Kålbladlus

Trods det kølige sommervejr støder vi nu ind i kolonier af kålbladslus i enkelte marker. Det er

vigtigt at holde specielt lagerkål fri for denne skadegører, da angrebne planter vil rammes sekundært af bladsvampe pga. bladlusenes udskillelse af honningdug. Kålbladlus kan normalt bekæmpes med et godkendt pyrethroid, men er angrebet meget omfattende, eller der ikke er andre skadevoldere, er der følgende muligheder:

Pirimor G - godkendt i blomkål, broccoli, grønkål, hvidkål, kinakål, rosenkål, rødkål og savoykål med 0,3 kg pr. ha og max. 1 behandling. Behandlingsfrist 3 dage.

Movento SC 100 – godkendt i bladkål, blomkål, blomsterkål, broccoli, grønkål, hovedkål, hvidkål, kinakål, rosenkål, rødkål, savoykål og spidskål. Maksimalt 2 behandlinger med et interval på 14 dage. Behandlingsfrist 3 dage.

Biscaya OD 240 – godkendt som en mindre anvendelse mod kålbladlus i kinakål, glaskål, grønkål, palmekål, pak choy og rucola. Maksimalt 1 behandling, 14 dages behandlingsfrist.

Løg

Generelt

Såløgene er ved at have godt fat. De største har 8-9 blade og de mindste har kun 6-7 blade. Så vi håber på en god vækstsæson i juli og august, for at de mindste også kan nå at give et godt udbytte.

Ukrudtsbekæmpelsen har været nem med Xinca. Den er dog også hårdere ved løgene og der skal passes på med at komme for tæt på med Select. Det gælder både før og efter og især, hvis løgene er stresset af sandflugt. Der ud som om, at store løg skades mere end små løg.

Vanding

Sætteløgene bruger nu 25-30 mm om ugen og såløgene skal have 20-25 mm om ugen for ikke at komme i underskud.

Ukrudtsbekæmpelse i konventionelle såløg efter fremspiring

Ukrudtsbekæmpelsen er ved at være afsluttet de fleste steder. Hvis der stadig er lidt liv i ukrudtet, afsluttes der med 0,15-0,2 l Xinca/Maya + 0,3-0,5 l Fenix pr. ha. Hvis der sammenlagt er brugt 1,2-1,5 l Fenix efter fremspiring, vil det de fleste steder kunne hindre ny fremspiring. Der skal dog holdes øje med, at der ikke kommer nyt. Hvis der er Sort Natskygge, kan der med fordel bruges 1-1,25 l Boxer pr. ha. Vi har set kraftig effekt på løgene, hvis der er brugt 1,5 l Boxer.

Er der kamille, brandbæger eller tidsler, kan der anvendes en behandling med 0,035 kg Matrigon 72 SG pr. ha. Denne dosering vil kun virke på små kamiller og brandbæger, mens effekten på tidsler kun vil være en kortvarig hæmning. Det er desuden vigtigt, at temperaturen helst er 20 °C og i hvert fald over 15 °C, ellers virker det ikke.

Hvis der er kvik i såløgene, som ikke er bekæmpet med de 2 gange 0,35 l Select 240 EC + 0,35 l Renol pr. ha. med 8-10 dages mellemrum.

Hvis der er kvik, skal der anvendes 2,5-3 l Focus Ultra + 0,5 l Dash pr. ha.

Mindre anvendelse

Husk at udskrive godkendelserne til mindre anvendelse for følgende produkter:

Boxer

Maya

Xinca

Fenix

Matrigon 72 SG

Buctril

Biscaya OD 240

Movento SC 100

Skimmelvarsling

Vi vil også i år gerne have besked, hvis I finder løgskimmel. Ring eller sms på 40 37 46 51. Jeg vil herefter udsende en sms med det samme, så alle løgavlere kan blive opmærksom på det.

Svampebekæmpelse konventionelle løg

Fundet af løgskimmel i sætteløgene viser, at der er behov for intensiv bekæmpelse og forebyggelse i de sætteløg, der ikke skal bruges til bundter eller frilægges inden 2 uger.

De største såløg har 8-9 blade, så der skal også her forebygges med 2,0 kg Dithane NT + 0,3-0,4 l Shirlan pr. ha.

Hvis der bliver fundet skimmel, skiftes mellem

0,5 Shirlan + 2 kg Acrobat WG hvis I har den gamle Acrobat ellers skal der bruges 0,5 Shirlan + 1,6 Acrobat Plus + 0,5 Dithane NT pr. ha.

Eller 2,5 l Cabrio Duo + 0,5 Shirlan + 1,0 Dithane NT pr. ha med meget korte intervaller (3-4 dage).

Switch 62,5 WG kan bruges mod gråskimmel og bladgråskimmel, hvis vi er inde i en periode med varmt og fugtigt vejr altså rigtig gråskimmelvejr.

Der kan også bruges Signum, men vi skal helst have, så der kan behandles med 2x1 l Signum pr. ha inden frilægning

Som forslag til forebyggende, kan behandles efter følgende plan i de gule:

- 5-6 uger før forventet frilægning; 2 kg Dithane NT + 0,3 Shirlan
- 4-5 uger før forventet frilægning: 2,5 l Cabrio Duo + 0,3 l Shirlan + 1,0 Dithane NT
- 4 uger før forventet frilægning: 1,6 kg Acrobat Plus + 0,3 Shirlan + 0,5 Dithane NT
- 3 uger før forventet frilægning: 2,5 l Cabrio Duo + 0,3 l Shirlan + 1,0 Dithane NT
- 2 uger før forventet frilægning: 1 kg Signum WG + 0,3 l Shirlan
- 1 uge før forventet frilægning: 1 kg Signum WG + 0,3 l Shirlan

Husk, at ved angreb eller varsling om angreb skal der behandles meget mere intensivt.

I **røde løg** kan mængden af Shirlan med fordel øges.

Til forebyggende behandlinger bruges der 2,0 kg Dithane NT + 0,4 l Shirlan pr. ha.

Hvis der bliver fundet skimmel, skiftes mellem

0,5 Shirlan + 2 kg Acrobat WG hvis I har den gamle Acrobat ellers skal der bruges 0,5 Shirlan + 1,6 Acrobat Plus + 0,5 Dithane NT.

Eller 2,5 l Cabrio Duo + 0,5 Shirlan + 1,0 Dithane NT

pr. ha med meget korte intervaller (3-4 dage).

Som forslag til forebyggende, kan behandles efter følgende plan i de røde:

- 5-6 uger før forventet frilægning; 2 kg Dithane NT + 0,4 Shirlan
- 4-5 uger før forventet frilægning: 2,5 l Cabrio Duo + 0,4 l Shirlan + 1,0 Dithane NT
- 4 uger før forventet frilægning: 1,6 kg Acrobat Plus + 0,4 Shirlan + 0,5 Dithane NT

Ved varmt og fugtigt vejr kan lægges en ekstra sprøjtning ind med: 1,0 kg Switch 62,5 WG + 0,5 l Shirlan

- 3 uger før forventet frilægning: 2,5 l Cabrio Duo + 0,4 l Shirlan + 1,0 Dithane NT
- 2 uger før forventet frilægning: 1 kg Signum WG + 0,4 l Shirlan
- 1 uge før forventet frilægning: 1 kg Signum WG + 0,4 l Shirlan

Husk, at ved angreb eller varsling om angreb skal der behandles meget mere intensivt.

Hvis der er trips, kan der medtages 0,2 kg Karate eller 0,75 l Movento pr ha.

Alle doseringer er pr. ha.

I svampesprøjtningerne skiftes der mellem at iblande enten 3 kg bittersalt (2 % magnesiumsulfat opløsning), 1,5 kg mangansulfat eller 1,5 kg zinksulfat pr. ha. Der må ikke sprøjtes i solskinsvejr pga. risiko for svidning. Der kan også bruges et bredspektret mikronæringsmiddel som medtages med 1-1,5 l, hver gang der svampesprøjtes.

Til de sidste behandlinger kan bruges 4-5 kg urea pr. ha.

Virkning og dækning forbedres ved tilsætning af spredeklæbemiddel. Ved tilsætning af mikronæring kan det evt. undlades.

Sprøjtefrister:

Acrobat Plus: 28 dage og max 4 behandlinger med 2 kg

Acrobat New: 28 dage og max 4 behandlinger med 1,65 kg Husk at den er på dispensation og ikke må anvendes og opbevares efter 13. oktober 2017

Dithane NT: 28 dage og max 4 behandlinger med 2,5 kg

Cabrio Duo: 7 dage og max 3 behandlinger med 2,5 l

Shirlan: 7 dage og max 5 behandlinger med 0,5 l

Signum WG: 7 dage og max 2 behandlinger med 1,0 kg

Ortiva Top: 14 dage og max en behandling med 0,6 l

Switch 62,5 WG: 14 dage og max 2 behandlinger med 1 kg

Karate 2,5 WG: 28 dage og max 2 behandlinger

Movento SC 100: 7 dage og max 2 behandlinger

Vedr. sprøjtefrister, afstandskrav og restriktioner vedr. antal behandlede ha, henvises via midlernes hyperlink til middeldatabasen og til Planteværn i spiseløg 2017.

Det er brugerens ansvar, at alle regler omkring anvendelse bliver overholdt. Følg derfor linkene på de enkelte midler til middeldatabasen.

Gødning i konventionelle såløg

Det sidste kvælstof og Patentkali skal gives nu, hvis det ikke er gjort.

Økologi

Den sidste gylle- eller Binadantilførsel skal gives nu i såløgene. Der skal tages en nitrattest for at vurdere, hvor meget der mangler.

For at der kan udbringes mikronæringsstoffer i økologiske afgrøder, skal avleren have en konsulenterklæring, der understøttes af en blad- eller jordanalyse. Hvis der er konstateret synlig mangel, er en konsulenterklæring nok. Det er en god ide at tage et billede som dokumentation i denne situation. Ud over mangan kan der være mangel af Zink, Bor, Kobber og Magnesium.

Ukrudtsbekæmpelse i økologiske løg

Ukrudtsbekæmpelsen i plante- og sætteløg er overstået, men der er stadig behov i såløgene, der er længe til høst endnu.

Gulerod

Ukrudtsbekæmpelse

Al ukrudtsbekæmpelse i gulerødder bør nu være afsluttet. Tilbage kan være lidt græsukrudt eller sort natskygge. Enårige græsser bekæmpes med 1-2 l/ha Focus Ultra + 0,5 l/ha Dash. Focus Ultra kan være svag overfor enårig rapgræs. Her vælges i stedet Select 240 EC. Den lave dosering af Focus Ultra i gulerødder er også lige i underkanten til en effektiv bekæmpelse af kvik. Mod kvik og enårig rapgræs anvendes 2 x 0,35 l/ha Select 240 EC tilsat Renol i forholdet 1:1.

Sorts natskygge bekæmpes med Boxer. Boxer kan skade små gulerødder, men har gulerødderne først 2-3 løvblade tåler de normalt fint Boxer. Man bør dog være varsom med at blande Boxer og Fenix, der kan give svindningsskader. Måske fordi additiv til Boxer gøre Fenix mere aggressiv. Der må max anvendes 2 l/ha pr behandling og max 4 l/ha i alt. Flere behandlinger med lav dosering og ofte mere effektiv end én behandling med fuld dosering.

Ukrudtsbekæmpelsen afsluttes lige inden rækkelukning med hypning af gulerødderne. Hypning har samtidig til formål at sikre gulerødderne mod grønne-nakker. Ofte kan det betale sig at hyppe to gange. Første gang når gulerødderne har 15-20 cm top og anden gang lige inden rækkelukning.

Bladlus

Der er i den forgangne uge observeret en del bladlus i gulerødder. Både i veludviklede marker, hvor toppen lukker sammen i rækkerne og på planter, som ikke er ret meget mere end 5 cm højde. Bladlus plejer ikke at udvikle sig til et problem i gulerødder. Oftest forsvinder de helt af sig selv igen i løbet af et par uger. Man bør dog holde et vågent øje med dem og evt. sprøjte, hvis populationen udvikler sig i en uheldig retning.

Delt gødskning

Delt gødskning er normal praksis i gulerødder, bl.a. fordi der går meget lang tid fra udbringning i det tidlige forår, til gulerødderne midt på sommeren begynder at optage kvælstof i større mængde. I den mellemliggende periode vil der være risiko for tab, hvis der kommer ekstremt meget nedbør eller som følge af vanding. Anden gødskning tilføres efter planteetablering, når gulerødderne er ca. 10 cm høje. Det sker typisk i sidste halvdel af juni. Det giver også en god afstand til det tidspunkt i august, hvor man på basis af N-min prøver tager stilling til, om der er behov for eftergødskning.

Gulerødder, der løber tør for kvælstof, inden de er klar til høst eller halmdækning, vil ofte være mere modtagelige for bladplet i efteråret. Modsat vil gulerødder, som er overforsynet med kvælstof, ofte være mere modtagelige for knoldbægersvamp og råd, når de opbevares vinteren over. Eftergødskning planlægges efter udtagning af jordprøver i 70 cm's dybde til N-min-analyse. Jordprøverne udtages sidst i juli og eftergødskning sker først i august.

Pastinak og persillerod

Ukrudtsbekæmpelse

Ukrudtsbekæmpelse i pastinak afsluttes med hypning. Pastinakkerne er gode til at strække sig, så der kan lægges jord ind omkring selv små planter med en størrelse på blot 10 cm. Derfor giver det god mening at time hypningen efter ukrudtets størrelse. Hypning udføres, så man dækker nyfremspiret ukrudt inde i rækkerne. I økologiske pastinakker hyppes straks efter sidste lugning, så de ukrudtsplanter, håndlugerne knækker ved jordoverfladen, ikke får chancen for at skyde igen.

Skurv

Persillerod kan få skurv af samme type som gulerødder. Hvis de får skurv, udvikler persillerødder ofte dybe revner og bliver skæve/deforme. Derfor skal persillerod skurvvandes for at holde jorden fugtig, i perioden fra 3-4 løvblade og 3-4 uger frem.

Rødbede

Bedefluen

Første generations bedefluer har gennemført deres udvikling fra æg til nye, voksne fluer. Deres miner i rødbedebladene ses meget tydeligt i disse dage. Anden generation bedefluer lægger ofte æg først i juli. Hold øje med æggene og sprøjt evt, hvis der er mange planter med æg. Det er de små rødbedeplanter der er mest følsomme for angreb. Store rødbeder kan bedre tåle, at bedefluerne gnaver i bladene. Æggene findes let ved at undersøge bagsiden af de ældste blade. Her ses æg som små hvide stave, der ligger side om side.

Skurv

Rødbeder kan udvikle dyb skurv med kratere og bør skurvvandes i tørre perioder. Risikoen for udvikling af skurv er størst på let jord og ved højt Rt. Der er normalt ikke behov for skurvvanding på svær jord. Skurvvanding gennemføres i perioden fra rødbedernes rodtilvækst begynder og 3-4 uger frem. Der skal vandes med små mængder vand ad gangen for at undgå tab af næringsstoffer. Rødbederne har et svagt og højtliggende rodnet og løber hurtigt tør for kvælstof. Af den årsag er det også en god ide at dele kvælstofgødningen op i flere tildelinger, så de eftergødskes en til to gange, frem til rødbedetoppen lukker helt sammen i rækkerne.

Hold øje med udvikling af bladplet i rødbederne i varmt og fugtigt vejr.

Jordskokker

Jordskokkerne er høje og ukrudtsbekæmpelse samt eftergødskning bør være afsluttet nu. I perioder med fugt og høj temperatur kan der være risiko for infektion af knoldbægersvamp. Her findes ingen bekæmpelsesmuligheder. Angreb forebygges gennem sundt sædskifte og valg af mindre modtagelige sorter.

Sukkermajs

Opfølgende ukrudtsbekæmpelse

Én (1,5 l pr. ha) eller to sprøjtninger (2 x 0,75 l pr. ha) med Callisto vil ofte være tilstrækkeligt til at bekæmpe frøukrudtet. Callisto er stærk til mange almindeligt forekommende frøukrudtsarter. Dog er midlet ikke særlig godt til græsser og valmue. Hanespore bekæmpes nogenlunde med Callisto, men planterne skal være små. Der kan suppleres med Harmony SX eller Fighter 480, men ingen af midlerne dækker desværre Callistos svagheder særligt godt. Harmony SX (op til 11,25 gram pr. hektar + sprede/klæbemiddel) kan dog også bruges alene, men er smallere i virkningsspekteret end Callisto, men også noget billigere. Harmony SX er især god til fuglegræs, hanekro, raps og pileurter, men svag overfor sort natskygge, burresnerre og storkenæb. Callisto er forholdsvis uafhængig af temperaturen, mens der ved sprøjtning med Harmony minimum bør være 15 °C. Anvendelse af både Callisto og Harmony SX i sukkermajs er på off-label vilkår, så husk at udskrive brugsanvisningen.

Off-label Callisto, sukkermajs

Off-label Harmony, sukkermajs

Bladlus

Bladlus er en alvorlig og generende plage i sukkermajs. Der findes nu en godkendelse af Pirimor G og LFS Pirimicarb til mindre anvendelse mod bladlus i sukkermajs. Midlerne virker bedst under lune og stille forhold, hvor der vil opstå en for bladlusene skadelig dampvirkning. Godkendelsen giver lov til 1 behandling med 280 g aktivstof pr. ha (svarer til 0,56 kg pr. ha). Behandlingsfrist 7 dage.

Mindre anvendelse af Pirimor G og LFS Pirimicarb mod bladlus i sukkermajs

Ferie

Peder Krogsgård holder ferie uge 27, 29 og 30
Pernille Kynde holder ferie uge 27, 28 og 30
Karina Frandsen holder ferie i uge 30-32
Lars Møller holder ferie i uge 28-29
Richard de Visser holder ferie i uge 28-31
Emma Christiani Skov holder ferie i uge 26-27
Ole H. Scharff holder ferie i uge 30-32

REDAKTØRER



Ole Scharff
Tlf: 87 40 66 34/40 73 19 58
ohs@seges.dk



Richard de Visser
Tlf: 87 40 66 10/30 53 87 16
rdv@seges.dk



Karina Frandsen
Tlf: 87 40 66 12/21 64 80 85
kfr@seges.dk



Lars Møller
Tlf:40 84 30 11
lrm@seges.dk



Pernille Kynde
Tlf: 30 51 62 14
pbk@seges.dk



Peder Krogsgård
Tlf: 40 37 46 51
pkl@seges.dk



Emma Christiani Skov
Tlf: 87 40 66 01/30 66 61 78
esko@seges.dk

GartneriRådgivningen tager forbehold for tastefejl og lignende. Nyhedsbrevet må ikke videresendes. GartneriRådgivningen har copyright på billederne