GrønsagsNYT

Nr. 5 // 3. maj 2016

Aktuelt

Hvis man kan tro på meteorologerne, så kommer foråret for fuld musik i denne uge. Det er også hårdt tiltrængt, da mange er bagud med så- og planteopgaver og en del planter er hæmmet i vækst pga. kulde og våde marker. Det betyder også, at der skal laves en strategi for afdækning af fiberdug dækkede planter. Vi kan også forvente, at insekterne vil begynde at røre på sig – mere om det under de enkelte kulturer

INDHOLD

Varsling 1
Frister vedr. Fællesskema 1
Tilskudsmuligheder 1
Søg om tilskud til udvikling af dansk økologi 2
Nyt om enkelte grønsagskulturer: 2
Salat 2
Kinakål og kål 2
Knoldselleri 3
Løg 5
Generelt 5
Økologi 6
Gulerødder 7
Rødbeder 7
Jordskokker 7
Ærter 8
Sukkermajs 8
Arrangementer 2016 9

Varsling

Agerugler

På baggrund af den forventede varmeperiode i uge 18/19 rykkes tidspunktet for opsætning af fælder til agerugler frem til d. 16. maj.

Jordtemperatur

Ifølge prognosen begynder jordtemperaturen for alvor at rykke nu:

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Vejret/Sider/PL_Jordtemperatur.aspx

Frister vedr. Fællesskema

Forsinket frist og ændringsfrist

Det er fortsat muligt at rette oplysninger til grundbetaling, ø-støtte, støtte til ny-etablerede, samt ansøgning om udbetaling miljø-og økologitilskud i Fællesskemaet til og med den 17. maj – der kan ændres afgrøder, arealstørrelser, tilføjes og fjernes marker (man skal dog have rådighed over marken den 21. april) og rettes i kortet. Har ansøgningen ikke været indsendt senest den 21. april, kan den indsendes forsinket, dog fradrages 1 % for hver arbejdsdag, den er forsinket frem til den 17. maj, hvorefter hele støtten bortfalder. Det er ikke muligt at ansøge om nye tilsagn under miljø- og økologiordninger efter den 21. april. Der kommer dog en ekstra runde for eksisterende økologer med frist den 1. september. Betalingsrettighedsoverdragelser kan indsendes senest den 17. maj, hvis erhverver har indsendt Fællesskema.

Tilskudsmuligheder

Spørg altid om muligheder for tilskud, inden du går i gang med et projekt. Kontakt : Mona H. Christensen, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N. Tlf.: 8740 5478. E-mail: mhc@seges.dk

Miljøteknologi 2016

Ordningen åbner den 1. juli (forventet). Se mere her: http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/miljoeteknologi-2016-kvaeg-svin-og-gartnerier/

Søg om tilskud til udvikling af dansk økologi

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) indkalder ansøgninger til programmet Organic RDD, der understøtter udviklingen af det danske økologiske fødevareerhverv.

Der er i alt 20 mio. kr. i puljen til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter. Projekterne må være op til fire år, og der gives op til 10 mio. kr. i tilskud til et projekt.

Fokus for indkaldelsen er ressourceeffektivitet i primærsektoren, og målet er, at projekterne vil bidrage til at finde konkrete løsninger på, hvordan produktiviteten kan øges, samtidig med at ressourcerne udnyttes bedst muligt. Med dette fokus skal programmet være med til at udvikle økonomisk robuste økologiske bedrifter med mindst mulig miljøbelastning.

Ansøgningsfristen er 15. juni 2016 kl. 12:00

Læs mere her: http://naturerhverv.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/soeg-om-tilskud-til-udvikling-af-dansk-oekologi/

Nyt om enkelte grønsagskulturer:

Salat

Afdækning

Der har været fuld valuta for dækning indtil videre, men vær opmærksom på at måle temperaturen under fiberdugen løbende. Salat tåler ikke at komme over 25 °C i længere tid (timevis); ved højere temperatur er der stor risiko for løse hoveder. Det vil formentlig være et godt tidspunkt at tage fiberdugen af mod slutningen af uge 18, hvor både nat- og dagtemperaturer forventes at stige til sommerlige højder. Afdækning sker bedst i overskyet og fugtigt vejr med svag vind, så planterne kan få en blid overgang fra det beskyttede miljø under dugen.

Insekter m.m

Med afdækningen af holdene stiger også risikoen for angreb af f.eks. trips og bladlus. Vi har dog endnu ikke konstateret nogen skadedyr i udækket salat.

Det samme gælder bremia salatskimmel, der ellers godt kan starte op i salat under dug. Efter afdækning er der med den nuværende vejrtype ikke nogen stor risiko for angreb af salalskimmel.

Sneglebekæmpelse

Den lange periode med våd jord har formentlig ført til en kickstart for agersneglene, så det er nu, hvor afdækningen finder sted, at man skal ud med forebyggende behandlinger med et ferrifosfat produkt (Ferramol m.fl.) og i øvrigt foretage jævnlige harvninger af markkanter og forland.

Kinakål og kål

Da en del kålarealer må forventes at være uden fiberdug fra og med denne uge, bør der holdes øje med glimmerbøsser, der lokalt kan vælte ind fra nærliggende rapsmarker. Pga. den langsomme start på blomstringen i vinterrapsen vil en del sultne glimmerbøsser kunne forventes at angribe kålmarker i stedet for.

Afdækning

Der gælder de samme regler som for salat – se ovenstående!

I fht. kålfluerne vil det i flere tilfælde være nødvendigt at gå direkte fra dækning med fiberdug til insektnet. Se næste afsnit!

Kålfluer - varsling for æglægning

Ifølge prognosen vil der være risiko for flyvning og æglægning fra næste uges start (uge 19). Det gælder især på lokaliteter med varmt mikroklima.

Husk at følge med i den overordnede varsling for kålfluen på følgende link:
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Skadedyr/Skadedyrsarter/Sider/PL_Kaalflue_varsling.aspx

Ikke behandlede planter (med aktivstofferne fipronil og spinosad) bør holdes dækkede med enten fiberdug eller insektnet, alt efter temperaturforholdene. Planter, der er mindst 3 uger gamle i marken tåler et lettere angreb på nogle få larver pr. plante uden at gå til.

Ukrudtsbekæmpelse i kål

Både **Stomp/Stomp CS/Activus 40 WG (pendimethalin)** og **Command CS** er off-label godkendt i både hoved- og blomsterkål. I de kål, der plantes fremadrettet, dækkes ikke med fiberdug og der er gode muligheder for at anvende en tankblanding af de to midler, hvis der er et stort ukrudtstryk på arealet. For at opnå den bredeste virkning anbefales det generelt at blande pendimethalin og Command CS.

Der er ikke officielle forsøg i plantet kål med en tankblanding af midlerne, men de foreløbige erfaringer fra 2014 og 15 viser, at 1 l Stomp eller Activus WG 40 (0,9 l Stomp CS) i blanding med 0,1-0,15 l Command CS er effektivt uden at skade kålen. Blomsterkålene er generelt mest følsomme over for Command CS. Ukrudtseffekten af disse jordmidler er altid klart bedst på fugtig jord.

Brugsanvisning ved mindre anvendelse af pendimethalin i kål (Stomp/Stomp CS/Activus 40 WG) ses her:
http://www.gartneriraadgivningen.dk/upl/website/stomp-cs-stomp-activus-40-wg-kaal/GP14StompCSStompActivus40ukrudtkaal.pdf

Brugsanvisning ved mindre anvendelse af Command CS i kål kan ses her:
http://www.gartneriraadgivningen.dk/upl/website/command-cs-kaal1/GP13CommandCSkaal.pdf

Pendimethalin midlerne må kun anvendes 1 gang pr. sæson, Command CS kun 1 gang hvert 3. år på samme areal. For både pendimethalin midlerne og Command CS må der senest behandles 3 dage efter udplantning..

Matrigon 72 SG er også godkendt som ukrudtsmiddel i hovedkål, blomkål og rosenkål. Matrigon 72 SG skal anvendes på småt ukrudt (op til 2-4 løvblade) og har bedst effekt over for ukrudt af kurvblomstfamilien (stolt-henrik, kamille, gul okseøje m.fl.). Vær opmærksom på, at midlet ikke må anvendes senere end maj måned og kun er godkendt som rækkebehandling/båndsprøjtning i 12,5 cm bånd med 50 cm rækkeafstand. Tilsætning af olie anbefales. Dosering: 0,14 kg pr. ha + 0,5 l Olie.

Undlad at blande med Stomp og Command CS.

Knoldselleri

Der er allerede plantet en del knoldselleri og der kommer for alvor gang i plantningen fra denne uge.

Stokløbning

I knoldselleri kan stokløbning være et stort problem i de tidlige hold, da risikoen for stokløbning øges ved lave temperaturer.

Indflydelse af temperaturen på stokløbning er størst i perioden fra såning til udplantning. For tidlig

udplantning eller lav gennemsnitstemperatur i de første uger efter etableringen på friland er trods alt af mindre betydning end den skade der sker ved for lav temperatur under selve tiltrækningen. Vær opmærksom på, at ophold på hærdepladsen inden udplantning også kan bidrage til induktionen af stokløbning.

Vi har erfaring for, at fortsat dækning med 1 eller 2 lag fiberdug kan "reparere" på kolde nætter og dermed i en vis grad afhjælpe stokløbning. Ved dagtemperaturer over 20 °C skal der dog endegyldigt afdækkes for at forebygge varmeskader.

Ukrudtsstrategi

Følgende strategi giver det bedste resultat og er samtidig skånsomt overfor kulturen:

Boxer + Fenix	2 l pr. ha 1 l pr. ha	Prosulfocarb+ Aclonifen	Udbringes på fugtig jord relativt hurtigt efter plantning. ***Boxer Max. 2 l pr. ha pr. behandling. Max. 4 l pr. ha pr. sæson*** ***Anvendes på afgrødens 2-4 bladstadie (BBCH 12-14) 12 ugers sprøjtefrist + Fenix max 1,5 l pr. ha i en behandling. Sprøjtefrist 70 dage.***

Boxer + Fenix	1 l pr. ha 0,75 l pr. ha	Prosulfocarb + Aclonifen	Udbringes 8-14 dage efter Boxer/Fenix er lagt ud første gang og når nyt ukrudt er spiret frem. ***Boxer Max. 2 l pr. ha pr. behandling. Max. 4 l pr. ha pr. sæson*** ***Anvendes på afgrødens 2-4 bladstadie (BBCH 12-14) 12 ugers sprøjtefrist + Fenix max 1,5 l pr. ha i en behandling. Sprøjtefrist 70 dage.*** ***Der må maks. anvendes 2,5 l Fenix pr. ha pr. sæson. 0,5-0,75 l pr. ha i max 2 behandlinger***

Som et alternativ til ovenstående blanding af Boxer og Fenix er Betanal, Herbasan og SweDane Betasana 2000 (phenmedipham midler) nu godkendt med 2 l pr. ha pr. behandling og max. 4 l pr. ha pr. sæson. Behandlingsfrist 2 mdr. før høst.

Der bør kun sprøjtes på veletablerede planter. Behandlingen bør kun finde sted i perioder med temperaturer over 10-12 °C uden risiko for nattefrost.

Vi har dog endnu ikke ret store erfaringer med anvendelsen, så anvendelse må ske i form af mindre forsøg og under gunstige vækstbetingelser for kulturen.

Herunder godkendelserne til mindre anvendelse i knoldselleri:

http://www.gartneriraadgivningen.dk/upl/website/prosulfocarb-midler-jordskokker-knoldselleri1/GP14Prosulfocarbmidlerjordskokkerknoldselleri.pdf

http://www.gartneriraadgivningen.dk/upl/website/fenix-pastinak-div1/GP15Fenixpastinakpersillerodknoldsellerisaaloegfroepriklerbedeplanteskolekulturer.pdf

http://www.gartneriraadgivningen.dk/upl/website/betanal-gulerod-persillerod-pastinak-knoldselleri/GP14Betanalgulerodpersillerodpastinakknoldselleri.pdf

Løg


Generelt

Der er stadig 10-15 % løg, der ikke er sået og der bliver overordentlig stor spredning på udviklingen i løgene i 2016. Vores kolleger i Holland er ikke bedre stillet. I begyndelsen af sidste uge manglede de stadig at så 1/3 af løgene i det nordlige Holland.

Kommer vi en uge ind i maj, begynder det at koste udbytte og bliver løgene først sået i midten af maj, skal der en særdeles god sæson til for at det lykkes.

Ukrudtsbekæmpelse

Første ukrudtssprøjtning i sætteløgene skal følges op. Efter planen anvendes 0,25-0,35 l Totril pr. ha (eller 0,2 l Xinca) Sidste år så vi skader på sætteløg ved anvendelse af Xinca; det var dog på senere stadier. Hvis der skal anvendes Xinca i sætteløg, er det derfor vigtigt, at ukrudtsbekæmpelsen afsluttes tidligt. Når det bliver varmere og løgene er i god vækst, kan behandles med 0,20-0,25 l Totril (eller 0,15-0,2 l Xinca) + 0,3-0,5 l Fenix pr. ha.



Totril/Xinca Kritisk periode. Totril/Xinca Totril/Xinca + Fenix.

I----------II----------II----------II----------I

I de største såløg er det er endnu for tidligt at sprøjte med Totril eller Fenix. De skal have første rigtige blad og være i god vækst. Men i de sidst sådede kan der sprøjtes med 0,2 l Totril pr. ha, inden der er spiret mere end 15-20 % frem. Hvis der er kamille, vælges 0,15 l Zinca i stedet. Især, hvis der ikke er sprøjtet med Reglone eller Roundup, eller hvis der er meget ukrudt. I de sidst sådede er det vigtigt med Reglonesprøjtningen. Det er mere skånsomt for løgene end en Totril eller Zinca sprøjtning og det er vigtigt at holde løgene i gang efter den sene såning.

Der må ikke behandles lige efter eller ved udsigt til nattefrost.

Er der meget græsukrudt, kan der laves en tidlig behandling med 0,5 l Aramo eller 0,35 l Select + 0,35 l Renol pr. ha.

Der skal kun behandles med Aramo eller Select nu, hvis der er et stort problem med græs. Det kan sætte løgene meget tilbage.

Ved stort græs, kvik og større enårige græsser, skal der til Aramo tilsættes 0,5 l Dash pr. ha. Dog ikke så længe, at såløgene er små eller svage.

Strategi for ukrudtsbekæmpelse. Se Løgnyt 2: http://danishonion.dk/pics/185.pdf

Behandlingsfrister:

Fenix: Må i sætteløg ved dosis 1,5 – 2,0 l pr. ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder. I doseringer op til maksimalt 1,0 l pr. ha skal der holdes en afstand på 2 m til §3-områder. Der må max anvendes 2,5 l pr. ha i sætteløg og 1 l i såløg.

Behandlingsfrist: Stomp CS og Stomp i løg: 8 uger før høst og må ikke anvendes nær-mere end 30 m fra vandmiljø. Boxer: 60 dage før høst og må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø.

Behandlingsfrister: Aramo: 28 dage. Select: 60 dage. Fenix: i såløg 90 dage. Boxer: max 4 l pr. ha og 60 dage. Totril: Stadie 19 (9 blade), max 4 behandlinger og totalt 1,75 l pr. ha. Matrigon: 35 dage.

Afstand til vandmiljø: Aramo og Matrigon: 2 m. Boxer og Totril: 10 m. Select 20 m. Fenix i såløg og Stomp: 30 m.

Økologi

Planteløg

På grund af vejret er der stadig løg, der ikke er plantet. Som en absolut nødløsning kan det være nødvendigt at klippe toppen af løgene med en hækklipper. Der må kun tages lidt af det øverste blad. Men det giver risiko for svampeangreb, fordi vandet kan trække direkte ned i løgbladene. Efter plantning skal der tages nitratanalyse for at følge behovet for gylletilførsel.

Gødning

Sætteløgene skal have gødning nu. På sandjord skal gødningen deles ad 3 gange, men på bedre jord kan der nøjes med to gange.

Hvis sætteløgene har fået 200 kg 12-23-0 som startgødning skal der gives 300 kg 14-3-15 nu og ved normale kalital gives 150 kg patentkali.

I alt skal sætteløg tilføres 130 kg N (20 kg mindre, hvis de skal være tidlige) 60 kg P og 150 kg K

Dette gælder ved normale P og K tal. Kvælstoftilførslen kan med fordel styres efter N analyser i jorden.

Mangan og mikronæring

Der er ikke konstateret ret meget manganmangel i sætteløgene og i såløgene er det endnu ikke aktuelt. Gulfarvningen skyldes kulde. Hvis der er manganmangel, skal der bruges 2 kg mangansulfat + spredeklæbemiddel pr. ha. Der kan også bruges mangan, der indeholder lidt kvælstof f.eks. 1-2 l NitraMan, eller der kan anvendes 1-1,5 l manganchelat pr. ha. Der kan tages en lille dosering af mikronæringsblanding med, allerede når der sprøjtes første gang med mangansulfat.

I økologiske løg må kun bruges mangansulfat og der skal foreligge en konsulenterklæring.



Trods regn og kulde er den første erfagruppe startet op. Her er en del af samsøgruppen på vej i marken.

Ingen manganmidler må blandes med ukrudtsmidler og de må ikke udsprøjtes ved frost 2 dage før og 2 dage efter; der må ikke sprøjtes med ukrudtsmidler, før der er gået 3-4 dage efter en mangansprøjtning. Der kan godt sprøjtes med mangan dagen efter ukrudtssprøjtning.

I de konventionelle løg anbefaler vi, at der behandles løbende med mikronæringsblandinger. Det skal tages med, når der sprøjtes med mangan og senere, når der svampebekæmpes.

Mens løgene er små, skal der ikke bruges så stor mængde; 0,5 – 1 l pr. ha er nok.

Flere firmaer sælger disse blandinger. Andre firmaer har lavet blandinger, der er tilpasset løg. Det skal være blandinger, der indeholder Zink (Zn), Magnesium (Mg), Kobber (Cu), Bor (B) og Jern (Fe). Husk spredeklæbemiddel.

Gulerødder

Fugtigt vejr har skubbet meget af såningen ind i maj måned, så der bliver pres på med at få sået både efterårs- og vintergulerødder i maj, efterhånden som markerne bliver klar til at køre på. Sortsvalg og plantetal kan kompensere meget for de marker, som ikke bliver sået rettidigt. Det antal vækstdage, som frøfirmaerne typisk angiver for sorten, kan bruges som rettesnor for, hvornår de skal sås for at blive klar til det planlagte høsttidspunkt. Ved at sænke eller øge frø-mængden kan tidspunktet for, hvornår gulerødderne bliver klar til høst henholdsvis fremskyndes eller udskydes. Som tommelfingerregel skal man regne med, at 10 planter ned eller 10 planter op vil skubbe tidspunktet hhv. 14 dage frem eller 14 dage senere. Samtidig skal man være sig bevidst, at jo højere plantetallet er, des højere er det potentielle udbytte, under forudsætning af, at gulerødderne opnår tilstrækkeligt med vækstdage. Hvis gulerødderne bliver sået for sent i forhold til det planlagte høsttidspunkt, skal plantetallet ned.

Gulerodsfluen, opsætning af limplader

Koldt og vådt forår har skubbet første generation af gulerodsfluer hen sidst i maj og ind i juni. Vejret skal blive meget varmt i maj for at ændre prognosen. Limplader til første generations æglægning sættes op 16. maj og pt. ventes æglægningen at toppe første uge i juni.



Gulerødderne er visse steder i god vækst

Rødbeder

Markant vejrskifte fra koldt til varmt vejr kan give anledning til såning af tidlige rødbeder. Det er endnu så tidligt, at rødbederne bør dækkes med fiberdug. De kolde morgener med rimfrost kan være hårde ved fremspirende rødbeder. Rødbederne dør ikke af rimfrosten, men bladene bliver blå-lilla og planternes vækst går helt i stå.

Jordskokker

De først lagte jordskokker er meget tæt på fremspiring. De konventionelt dyrkede jordskokker bør sprøjtes med Roundup inden fremspiring. Boxer kan også anvendes i jordskokker. Boxer er minor-use godkendt med max. 4 liter pr. ha pr. sæson og i perioden fra lægning til afgrødens 1. blad stadie.

Herunder brugsanvisningen til mindre anvendelse i jordskokker:

http://www.gartneriraadgivningen.dk/upl/website/prosulfocarb-midler-jordskokker-knoldselleri1/GP14Prosulfocarbmidlerjordskokkerknoldselleri.pdf

Hvis der er behov for efterfølgende ukrudtsbekæmpelse, skal det gøres mekanisk, f.eks. ved at hyppe jordskokkerne, lige inden de bliver for store til at køre i.

I de økologisk producerede jordskokker strigles ugentligt fra lægning og frem til begyndende fremspiring. Der strigles, uanset om der er ukrudt eller ej. Når først der er grønt af ukrudt, er det vanskeligt at strigle væk. Striglen bekæmper bedst ukrudt på tråd stadi, lige før det spirer frem. Striglen kan også være med til at tænde nyt ukrudt, som bekæmpelse ved næste strigling, så de øverste 2-3 cm jord tømmes for letspirende ukrudt.

På jordskokkernes fremspiringstidspunkt er spirerne meget sarte over for mekaniske skader eller solskoldning, hvis striglen frilægger de aspargeslignende hvide spirer. Når spirene har sat de første grønne blade, er jordskokkerne igen meget robuste over for striglen og der køres igen ugentligt, indtil jordskokkerne er så store, at man ikke kan køre der længere.

Jordskokker dyrkes mange steder på kamme lige som kartofler. Her anvendes f.eks. en øko-hypper eller en rullestjernerenser til renholdelse. Uanset, om der er tale om økologiske eller konventionelle jordskokker, er det en udfordring at holde dem rene hele sæsonen. Jordskokkerne når meget hurtigt op i en højde, hvor man ikke længere kan køre med renseren. Samtidig er stænglerne opretstående og de yder ikke megen konkurrence over for sent fremspirende ukrudt.

Ærter

Ukrudtsbekæmpelse før fremspiring

Plukærter kan nu sås, uden at der er behov for at drive dem under dug. Ukrudtsbekæmpelsen er normalt noget nemmere uden dug, både fordi der ikke behøves at tages hensyn til ærternes vokslag som følge af dækning, samt selvfølgelig fordi man slipper for besværet med at tage dugen af og på. Inspektion af ukrudtets udviklingstrin er lettere, og dermed er der også mulighed for en bedre timing af sprøjtningen i en travl tid.

På meget beskidte arealer kan det være en fordel at sprøjte med et jordmiddel før ærternes fremspiring, men ellers opnås ofte den bedste effekt ved at vente med sprøjte, til ukrudtet lige er spiret frem. Det optimale er at udbringe jordmidlet på fugtig jord, mens ukrudtet er helt småt og nyfremspiret. Ofte vil ærterne også være i begyndende fremspiring på dette tidspunkt, men normalt giver det ikke skader at sprøjte med Stomp eller Fenix på dette tidspunkt. Derimod bør Command CS og Novitron DAM TEC ikke bruges i ærternes fremspiringsfase.

Læs mere om valg af midler, dosering og andet vedrørende ukrudtsbekæmpelse i ærter før fremspiring i Grønsags Nyt nr. 1.

Efter fremspiring af ærter skal de sprøjtes igen, så snart der er nyfremspiret ukrudt. I de dækkede ærter anbefales det at tage dugen af nogle dage inden sprøjtning. Sprøjtning gennem fiberdug anbefales ikke. Dækkede ærter har et tyndere vokslag og derfor anbefales det at afhærde ærterne inden sprøjtning ved at tage dugen af et par dage i forvejen. Ved udsigt til nattefrost bør dugen blive på, og der bør i øvrigt heller ikke sprøjtes, før perioden med nattefrost er ovre. Dugen lægges på 1-2 dage efter sprøjtning.

Der anvendes normalt 2 sprøjtninger med Stomp + Fighter 480 (0,5 + 0,4 l pr. ha første gang; 0,5 + 0,5 anden gang). Efter fremspiring kan behandlingsfristen blive en begrænsende faktor i middelvalget. Stomp CS har den korteste sprøjtefrist (6 uger), men forsøgsmæssige erfaringer tyder dog på, at frigivelsen af aktivstoffet for den nye CS formulering af Stomp er for langsom til så lave doseringer og derfor bør det nok overvejes at skifte Stomp CS ud med Fenix (0,5 l pr. ha), hvis det kan lade sig gøre (Fenix sprøjtefrist 7 uger). Den gamle Stomp formulering er også en mulighed, men behandlingsfristen er 10 uger. Bentazon produkter (Fighter 480 mfl.) har en sprøjtefrist på 7 uger.

Vær opmærksom på, at brugen af Stomp eller Stomp CS er betinget af, at der ikke har været anvendt pendimethalin før fremspiring (Activus). Tilsvarende må der ved brug af Fenix efter fremspiring ikke have været anvendt Fenix før fremspiring.

Behandlingsfrister: Activus 40 WG: 10 uger. Stomp: 10 uger. Stomp CS: 6 uger. Fenix: 70 dage. Fighter 480: 7 uger

Sukkermajs

De tidligste sukkermajs er sået under plast i de forløbne uger. Dækning med plastik er forudsætning for en ordentlig fremspiring, for jordtemperaturen er stadig kun lige i underkanten af minimumstemperaturen på 10 grader. Såning i en 8-10 cm fordybning i jorden, og efterfølgende dækning med tæt, klar plastik giver ideelle spiringsbetingelser for majsen, og ofte opnås også den bedste virkning af jordmidlerne

under disse forhold. Der vælges enten Stomp eller Stomp CS, der er de eneste godkendte jordmidler til majs. Doseringen er 1,2 l pr. ha for den gamle Stomp og 1,0 l pr. ha for Stomp CS. Der er 3 måneders behandlingsfrist for begge midler. Sprøjtning bør så vidt muligt udføres på fugtig jordoverflade, ellers bliver virkningen for dårlig. I en tør periode bør der være kortest mulig tid mellem såning, sprøjtning og dækning med plastik. Dobbeltdækning med fiberdug og hulplast er også en mulighed, men hæver ikke jordtemperaturen lige så meget.

Dobbeltdækkede sukkermajs kan afdækkes og sprøjtes med Reglone lige før fremspiring. Dug og plastik lægges på igen efter sprøjtning. Efter fremspiring af majsen kan Callisto og Harmony SX anvendes, men endnu er det for tidligt at afdække majsen.

Arrangementer 2016

11. maj

Løg Erfa Fyn/Jylland. Vi mødes hos Axel Månsson, Grarupvej 15, 7330 Brande. Vi starter med en sandwich, ser så-, sætte- og planteløg og kører derefter til Leif Søndergård, Førstballevej 45, 7321 Gadbjerg, der har sætte- og såløg.

Tilmelding senest dagen før på pkl@seges.dk eller 40374651.

Til den elektroniske tilmelding GR19/1-16

12. maj kl. 10:40

Erfamøde Samsø. Mødested: i marken hos Henrik Bertelsen. Onsbjerg Mark 13, 8305 Samsø. Der køres op ad vej ved Grillen. Derefter køres til Ejnar og Rasmus Bager og til Jens Kjeldahl. Tilmelding senest dagen før på pkl@seges.dk eller 40374651. Husk også at tilmelde jer elektronisk inden mødet.

Til den elektroniske tilmelding hedder mødet: GR17/1-16

13. maj kl. 10.00

Erfa Sjælland. Mødested Hardy Hansen, Møllevej 36, 4262 Sandved. Her ser vi såløg og kører derefter til Claus Hunsballe, Orebyvej 80, 4230 Skælskør hvor der er både sætte- og såløg. Vi får en sandwich.

Jeg vil gerne have tilmelding senest dagen før, på pkl@seges.dk eller 40374651. Husk også at tilmelde jer elektronisk inden mødet.

Til den elektroniske tilmelding hedder mødet GR19/2-16

17. maj kl. 13.00

Mini-maskindemo hos Skyttes på Fyn med Treffler striglen og Christiaens tværstriglen i plantede grønsagskulturer. Arrangementet foregår på Radbyvej 25, 5792 Årslev, og kræver ingen tilmelding. Ved dårligt vejr kan arrangementet være aflyst (ring evt. Siebe 27 83 71 78).

26. maj

Ukrudtsmarkvandring Samsø

Syngenta er sponsor for frokosten og Danish Agro er sponsor for en del af bussen.

Program:

9.00 Opsamling på Hou Havn, De "jysk-fynske" løg avlere kører med bussen ombord. Deltager sørger selv for transport til Hou. Havnegade Odder.

10.15 afh. med person bil i Ballen Ny Færgehavn af Sjællandske løgavlere.)

10.45 Brattingsborg gods. (Sjællandske løg avlere støder til.) Præsentation af Brattingborg Gods og såløgsmark Jens Kjeldahl (afg. 12.00)

12.20 Sildeballe Løg Rasmus og Ejnar Bager afg. 12.45

13.35 Mårup Havn frokost (afg. Kl. 13.30)

13.35 Mårup Løg /ukrudts forsøg Peter Hartvig (afg.13.50)

14.00 Nordby Brdr. Kjeldahl pak/Lager mv.

15.05 Afgang Nordby

14.45 Færge mod Jylland kl. 15.45

(Sjællandske løg avlere bringes til Ballen Ny Færgehavn med personbil).

Tilmelding til Peder Krogsgård på 40374651 eller pkl@seges.dk senest d. 18. maj.

26.-29. juni **Tysklandstur**, Avlerforeningen af Danske Spiseløg

Søndag 26. juni

12.00 Opsamling Slagelse Bilka

13.00 Opsamling Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV.

13.15 Opsamling Scandic Kolding

Mandag 27. juni

8.30 Besøg hos: Frederik Nienau, OT Wennekath, 121401 Thomasburg

10.30 Grimme Uelzen Betriebsstätte Grimme Uelzen

Selskabet står for ASA-lift maskiner i Tyskland og Grimme roemaskiner til Uelzen området.

13.00 Heide Zwiebel - AG:Flachskamp 25, Klein Süstedt 29525 Uelzen.

I det moderne forarbejdningsanlæg, kan op til 1.000 tons løg behandles hver uge.

Hotel og spisning ASA-lift.

Tirsdag 28. juni

8.30 Afgang: Hermann-Josef Jansen Zwiebelschälbetrieb u. Landw. Haverslohe 31, 41379 Brüggen. Dyrker 80 ha løg. Vinterløg og sætteløg. Løgene bruges i vid udstrækning til skrælning og industri.

Gutsverwaltung Niershoff Gemüsebau, Ziegelheider Straße 71, 47906 Kempen. Dyrker såløg (sorterne Dormo, Summit, Hyfive, Sunskin …) Har stor erfaring I dyrkning og vi ser marker og maskiner

Ølsmagning på vejen til Kasselområdet

Onsdag 29. juni

8.30 Afgang: Kaliumminen, Merkers-Kieselbach (Erlebnis Bergwerk Merkers)

Scandic Kolding, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV, Slagelse Bilka

Ved sponsorernes (SeedCom der er hovedsponsor og ASA-Lift) meget velvillige hjælp, er der lykkedes at lave turen til kr. 1.500 pr deltager. Tilmelding så hurtigt som muligt til Peder Krogsgård på 40374651 eller pkl@seges.dk

REDAKTØRER



Ole Scharff
Tlf: 87 40 66 34 / Mobil: 40 73 19 58
ohs@seges.dk



Lars Møller
Tlf:40 84 30 11
lrm@seges.dk



Karina Frandsen
Tlf: 87 40 66 12 / Mobil: 21 64 80 85
kfr@seges.dk



Pernille Kynde
Tlf: 30 51 62 14
pbk@seges.dk



Richard de Visser
Tlf: 87 40 66 10 / Mobil: 30 53 87 16
rdv@seges.dk



Peder Krogsgård
Tlf: 40 37 46 51
pkl@seges.dk

GartneriRådgivningen tager forbehold for tastefejl og lignende. Nyhedsbrevet må ikke videresendes. GartneriRådgivningen har copyright på billederne