

GrønsagsNYT

Nr. 6 // 17. maj 2016

Aktuelt

Efter en varm uge 19 har vi igen fået normalt dansk forsommer-vejr med blæst og byger. Der meldes om enkelte haglskader rundt omkring, så vi opfordrer alle forsikrede til at melde evt. skader til selskabet hurtigst muligt.

Overgangen til det mere blæsende vejr stresser mange planter og der kan bl.a. opstå bormangel i følsomme kulturer som salat, kål og selleri.

Den kortvarige varme satte gang i visse insekter og vi har bl.a. fundet de første æg af Den lille Kålflue i uge 19. Ellers er der dog ret stille på insektfronten indtil videre.

Jordtemperatur

Selvom luften igen er kølig, er jordtemperaturen oppe på et fornuftigt niveau:

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Vejret/Sider/PL_Jordtemperatur.aspx

INDHOLD

Aktuelt	1
Lovstof og regler	1
Tilskudsmuligheder	1
Nyt om kemi	1
Nyt om enkelte grønsagskulturer:	2
Salat	2
Kinakål og kål	3
Knoldselleri	3
Løg	4
Gulerødder	6
Rødbeder	7
Pastinak og persillerod	7
Jordskokker	7
Ærter	7
Suktermajs	7
Arrangementer 2016	8

Lovstof og regler

Krav om skiltning bortfalder i visse tilfælde

Tidligere var der sanktion i støtten ved manglende skiltning, hvis producenten modtog økologi- eller plejegræsttilskud. Kravet om skiltning er faldet bort for tilskud under 375.000 kr. Der er fortsat krav om visning af EU logo på erhvervsmæssige hjemmesider, hvis man modtager økologi- eller plejegræsttilskud eller for den sags skyld andre projektilskud.

Tilskudsmuligheder

Miljøteknologi 2016

Ordningen er nu kommet i høring. Det forventes at ordningen åbner den 1. juli med ansøgningsfrist den 1. september. Se mere her: <http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/miljoeteknologi-2016-kvaeg-svin-og-gartnerier/>

Spørg altid om muligheder for tilskud, inden du går i gang med et projekt. Kontakt : Mona H. Christensen, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N. Tlf.: 8740 5478. E-mail: mhc@seges.dk

Nyt om kemi

Select og Dithane

Nordisk Alkali oplyser, at Select er ude ved forhandlerne nu. Sørg for at få det hjem, så det er på jeres lager, når det skal bruges. De vil desuden arbejde på at tage et nyt parti Dithane NT hjem.

Bekæmpelse af rodukrudd i korn

Bekæmp rodukrudd, når hovedparten af de nye skud er fremme og i god vækst.

Den bedste effekt mod tidsler, padderokker og andet rodukrudd får du ved at sprøjte, når de nye skud af rodukrudd er godt fremme, så der ikke er mange små nye skud på vej. Sprøjt hellere lidt for sent end for tidligt. Tidsler er følsomme, når de har fået 4-7 blade, dvs. når tidslerne er 15-25 cm.

MCPA-midler (f.eks. [M-750](#), [Metaxon](#), [Swedane MCPA 750](#), [U 46 N](#)) har god effekt mod agertidsel, agerpadderok, svinemælk og gråbynke. Tilsætning af ammoniumsulfat øger effekten mod agerpadderok. Tilsætning af ammoniumsulfat forbedrer sandsynligvis også effekten mod agertidsel ved lav luftfugtighed. Vær opmærksom på at få behandlet med MCPA inden kornets stadium 39, dvs. indtil fanebladet er fuldt udviklet. Dels er dette sprøjtefristen, og desuden er der risiko for skade på kernesætningen ved senere anvendelse. En god temperatur vil sikre optimale virkningsforhold for MCPA. Der bør være omkring 14 dages afstand mellem ukrudtssprøjtning med 'minimiddel' og MCPA, så tidslerne er kommet i god vækst.

Den maksimale dosis for MCPA-midler er 1 l pr. ha.

[Mustang forte](#) har god effekt mod agertidsel, gråbynke og agersvinemælk. Mustang forte angives at have god effekt mod agerpadderok. Mod spildkartofler anvendes 0,6-0,75 liter pr. ha. **Vær opmærksom på restriktionerne for følgende afgrøde og anvendelse af halm.** Midlet må ikke anvendes efter stadium 32. [Pixxaro](#) er i 5 firmaforsøg afprøvet til bekæmpelse af spildkartofler. 0,5 l Pixxaro pr. ha har haft lidt bedre effekt end 0,8 l Starane 180 målt på biomasse af toppen. Pixxaro har i modsætning til Mustang forte ingen restriktioner for efterfølgende afgrøde.

Løsningsforslag

I tabellen [Løsningsforslag mod rodukrudd i korn](#) er givet forslag til middelvalg og dosis mod en række ukrudtsarter, som optræder som rodukrudd.

Sprøjteteknik

Ved bekæmpelse i korn er det nødvendigt med en sprøjteteknik, der kan sende sprøjtevæsken ned i afgrøden. Dette gøres med grov forstøvning og lav kørehastighed. Anvend mindst 200 l vand pr. ha. Lavdriftsdyser, refleksdyser, kompaktluftinjektionsdyser og luftinjektionsdyser 025 eller 03 er velegnede. Sprøjtning med luftsprøjter og luftassisterede sprøjter giver ved korrekt indstilling en god afsætning på rodukrudd ved lavere vandmængde.



Når tidslerne er 15-25 cm, begynder saftstrømmen at gå nedad, så herbiciderne bliver transporteret ned i udløberne.

Nyt om enkelte grønsagskulturer:

Salat

Afdækning

Afdækning bør generelt være foretaget nu for at sikre faste salathoveder. Der vil stadig være en tilvækst gevinst ved at dække med fiberdug, så det kan være aktuelt at drive på ugehold, der er kommet bagud.

Insekter

Med afdækningen af holdene stiger også risikoen for angreb af f.eks. trips og bladlus. Vi har dog stadig ikke konstateret nogen væsentlig indvandring af skadedyr i udækket salat.

Kinakål og kål

Afdækning

Der gælder de samme regler som for salat – se ovenstående!

Kålfluer - varslings for æglægning

De første æg er set i diverse kålmarker.

Husk at følge med i den overordnede varslings for kålfluen på følgende link:

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Skadedyr/Skadedyrsarter/Sider/PL_Kaalflue_varslings.aspx

Ikke behandlede planter (med aktivstofferne fipronil og spinosad) bør holdes dækkede med enten fiberdug eller insektnet, alt efter temperaturforholdene. Planter, der er mindst 3 uger gamle i marken tåler et lettere angreb på nogle få larver pr. plante uden at gå til.

Ukrudtsbekæmpelse i kål

Både **Stomp/Stomp CS/Activus 40 WG (pendimethalin)** og **Command CS** er off-label godkendt i både hoved- og blomsterkål. I de kål, der plantes fremadrettet, dækkes ikke med fiberdug og der er gode muligheder for at anvende en tankblanding af de to midler, hvis der er et stort ukrudtstryk på arealet. For at opnå den bredeste virkning anbefales det generelt at blande pendimethalin og Command CS.

Der er ikke officielle forsøg i plantet kål med en tankblanding af midlerne, men de foreløbige erfaringer fra 2014 og 15 viser, at 1 l Stomp eller Activus WG 40 (0,9 l Stomp CS) i blanding med 0,1-0,15 l Command CS er effektivt uden at skade kålen. Blomsterkålene er generelt mest følsomme over for Command CS. Ukrudtseffekten af disse jordmidler er altid klart bedst på fugtig jord.

Brugsanvisning ved mindre anvendelse af pendimethalin i kål (Stomp/Stomp CS/Activus 40 WG) ses her:

<http://www.gartneriraadgivningen.dk/upl/website/stomp-cs-stomp-activus-40-wg-kaal1/GP14StompCSSStompActivus40ukrudtkaal.pdf>

Brugsanvisning ved mindre anvendelse af Command CS i kål kan ses her:

<http://www.gartneriraadgivningen.dk/upl/website/command-cs-kaal1/GP13CommandCSkaal.pdf>

Pendimethalin midlerne må kun anvendes 1 gang pr. sæson, Command CS kun 1 gang hvert 3. år på samme areal. For både pendimethalin midlerne og Command CS må der senest behandles 3 dage efter udplantering.

Matricon 72 SG er også godkendt som ukrudtsmiddel i hovedkål, blomkål og rosenkål. Matricon 72 SG skal anvendes på småt ukrudt (op til 2-4 løvblade) og har bedst effekt over for ukrudt af kurvblomstfamilien (stolt-henrik, kamille, gul okseøj m.fl.). **Vær opmærksom på, at midlet ikke må anvendes senere end maj måned og kun er godkendt som rækkebehandling/båndsprøjtning** i 12,5 cm bånd med 50 cm rækkeafstand. Tilsætning af olie anbefales. Dosering: 0,14 kg pr. ha + 0,5 l [Olie](#). Undlad at blande med Stomp og Command CS.

.....

Knoldselleri

Ukrudtsstrategi

Følgende strategi giver det bedste resultat og er samtidig skånsomt overfor kulturen:

Boxer + Fenix	2 l pr. ha 1 l pr. ha	Prosulfocarb+ Aclonifen	Udbringes på fugtig jord relativt hurtigt efter plantning. Boxer Max. 2 l pr. ha pr. behandling. Max. 4 l pr. ha pr. sæson Anvendes på afgrødens 2-4 bladstadi (BBCH 12-14) 12 ugers sprøjtefrist + Fenix max 1,5 l pr. ha i en behandling. Sprøjtefrist 70 dage.
---------------	--------------------------	-------------------------	---

Boxer + Fenix	1 l pr. ha 0,75 l pr. ha	Prosulfocarb + Aclonifen	Udbringes 8-14 dage efter Boxer/Fenix er lagt ud første gang og når nyt ukrudt er spiret frem. Boxer Max. 2 l pr. ha pr. behandling. Max. 4 l pr. ha pr. sæson Anvendes på afgrødens 2-4 bladstadi (BBCH 12-14) 12 ugers sprøjtefrist + Fenix max 1,5 l pr. ha i en behandling. Sprøjtefrist 70 dage. Der må maks. anvendes 2,5 l Fenix pr. ha pr. sæson. 0,5-0,75 l pr. ha i max 2 behandlinger
---------------	-----------------------------	--------------------------	--

Som et alternativ til ovenstående blanding af Boxer og Fenix er Betanal, Herbasan og SweDane Betasana 2000 (phenmedipham midler) nu godkendt med 2 l pr. ha pr. behandling og max. 4 l pr. ha pr. sæson. Behandlingsfrist 2 mdr. før høst.

Der bør kun sprøjtes på veletablerede planter. Behandlingen bør kun finde sted i perioder med temperaturer over 10-12 °C uden risiko for nattefrost.

Vi har dog endnu ikke ret store erfaringer med anvendelsen, så anvendelse må ske i form af mindre forsøg og under gunstige vækstbetingelser for kulturen.

Herunder godkendelserne til mindre anvendelse i knoldselleri:

<http://www.gartneriraadgivningen.dk/upl/website/prosulfocarb-midler-jordskokker-knoldselleri1/GP14Prosulfocarbmidlerjordskokkerknoldselleri.pdf>

<http://www.gartneriraadgivningen.dk/upl/website/fenix-pastinak-div1/GP15Fenixpastinakpersillerodknoldsellerisaaloegefroepriklerbedeplanteskolekulturer.pdf>

<http://www.gartneriraadgivningen.dk/upl/website/betanal-gulerod-persillerod-pastinak-knoldselleri/GP14Betanalgulerodpersillerodpastinakknoldselleri.pdf>

Løg

Generelt

Så er de sidste løg blevet sået, og de sidste planteløg er også ved at blive plantet. Sent, men vi håber på en god sæson.

Vores hollandske kolleger har også haft problemer med at blive færdige, og i Polderen er der kraftig skorpedannelse som driller.

Det er der også her i Danmark. Der er blevet vandet i mange såløgssarealer i sidste uge. Det har været nødvendigt både for at opbløde skorpen og løgene har haft svært ved at få vand nok i det meget tørre og blæsende vejr med temperaturer på op til 25 grader. Løg og andre planter har ikke kunnet finde ud af det hurtige skift fra koldt og vådt til tørt og varmt. Desuden har det været et problem, at jorden er våd og kold længere nede. Det betyder, at gødningen og især fosforen ikke er tilgængelig for planterne.

Der er nu kommet 10-15 mm regn mange steder, men hvor det ikke har regnet, skal der stadig holdes øje med, om det er nødvendigt at vande.


De gamle løg sælges lidt langsomt, men en del avlere melder udsolgt og de fleste af de resterende er på køl.

Løgene retter sig med det samme, når der kommer regn > > >




Ukrudtsbekæmpelse

Som følge af det mærkelige vejr og svage løg, er næsten ingen såløg sprøjtet med Totril eller Xinca efter fremspiring. Det vil i de største løg blive i løbet af denne uge, når vejret tillader det.



Totril/Xinca Kritisk periode. Totril/Xinca Totril/Xinca + Fenix.



Husk ikke at behandle i den kritiske periode.

Sætteløgene skal sprøjtes færdig mod ukrudt nu. Der skal afsluttes med højere doseringer. Til de afsluttende sprøjtninger kan anvendes 0,25-0,3 l Totril + 0,4-0,5 l Fenix pr. ha. Der skal selvfølgelig holdes øje med, om ukrudtet er helt dødt og om der spirer nyt frem.

Effekt af 1,6 l Stomp og 0,25 l Fenix pr. ha lige efter såning har haft en rigtig god effekt, her på spildraps. Der er ikke brugt Roundup eller Reglone. Det gør det nemmere at bekæmpe efter fremspiring og det er ikke nødvendigt at sprøjte lige, mens løgene, som på billedet, er i den mest følsomme periode > > >



Den første græssprøjtning skal følges op og der skal anvendes samme middel som ved første behandling.

Strategi for ukrudtsbekæmpelse. Se Løgnyt 2: <http://danishonion.dk/pics/185.pdf>

Off label og mindre anvendelse

Husk at udskrive godkendelserne til følgende produkter:

[Boxer](#)

[Xinca](#)

[Fenix](#)

[Matrigon](#)

Gulerødder

Vanding mod skurv

Det er nu tid til skurvvanding i de først såede gulerødder på sandjord. På svær jord er der formentlig stadig fugt nok i jorden til at vente med skurvvandingen. Under forudsætning af, at der er ved at være tørt i de øverste 5-10 cm jord, skal skurvvanding påbegyndes i gulerødder, når rødderne begynder at skifte farve fra hvid til svagt orange. Fra det tidspunkt og frem skal gulerødderne dækkes af med skurvvanding i en ca. 3 ugers periode.

Manganmangel

Tørt vejr, varme og kraftig vækst giver også anledning til manganmangel i de små gulerødder. Det er specielt de helt små gulerødder med 1-3 løvblade, der er modtagelige for manganmangel og som bør dækkes af med en sprøjtning med mangan. Når først gulerødderne når en størrelse af 10 cm's tophøjde, vil rodnettet ofte være så stort, at vi sjældent ser manganmangel i gulerødderne. I økologiske gulerødder på let jord, hvor gulerødderne skal konkurrere med ukrudt om mikronæringsstofferne, bør man holde ekstra øje med manganmangel og evt. sprøjte med mangansulfat. Husk, at der skal foreligge en konsulenterklæring, inden der sprøjtes og at mangansulfat ikke må tilsættes additiv.

Fiberdug, afdækning

Der bliver ofte spurgt til rette tidspunkt for at fjerne fiberdugen i de tidlige gulerødder. Hvis fiberdugen trækkes af gulerødderne for at sprøjte, gødske eller rense, bør man overveje, om dugen skal på igen. Hvis dugen tages af og ikke kommer på igen samme dag, får gulerødderne et chok både, når dugen trækkes af og igen, når dugen lægges på. I den situation er det bedst at tage dugen helt af. Men, hvis operationen kan gennemføres samme dag, så gulerødderne ikke når "at opdage", at de har været uden dug, bør dugen lægges på igen, da det fortsat kan blive køligt sidst i maj. Fiberdugen bør tages helt af ca. 1. juni. Risikoen for svidningsskader ved afdækning er størst, hvis dugen tages af på en solrig dag med blæst. Dugen trækkes helst af på en kølig dag eller om aftenen.

Den største effekt af fiberdug i gulerødder opnås fra såning og frem til og med planteetablering.

Gulerodsfluen

Meget tyder på, at gulerodsfluerne i år lægger æg i juni måned. Hvis fiberdugen tages af inden 1. juni, kan det være en god ide at sætte gule limplader op for at følge æglægningen og evt. sprøjte mod gulerodsfluer. Det gælder specielt marker, som ligger tæt på arealer, hvor der sidste år var gulerødder. Det gælder også marker, hvor der inden for kort afstand etableres sene gulerødder, som vil være modtagelige for 2. generations gulerodsfluer.

Rødbeder

Så er det snart tid til at så rødbeder, der skal høstes til lager i efteråret. Sandjord fravælges, da rødbeder tåler udtørring dårligt. Vælg kun marker med god vandkapacitet og mulighed for vanding.

Sådybden bør være 2,5 cm, rækkeafstanden 50-60 cm og en plantetæthed på ca. 6-800.000 planter pr. hektar. Plantetætheden afhænger af, hvor store rødbeder, man ønsker og det ønskede høsttidspunkt. Større plantetæthed giver mindre rødbeder eller senere høst. Ukrudt bekæmpes efter fremspring med metamitron (Goltix, Goliath) og phenmedipham (Betanal, Herbasan). Begge midler hæmmer fotosyntesen og virker bedst som bladmiddel ved høj temperatur og når solen skinner.

Pastinak og persillerod

Der er begrænset mulighed for ukrudtsbekæmpelse i pastinak og persillerod. Derfor er det vigtigt at sprøjte med Roundup lige inden fremspiring, eller i økologisk produktion at brænde lige inden fremspiring. De nysåede marker skal tilses næsten dagligt for ikke at komme for sent. Nu, hvor det er blevet varmt med nattemperaturer over 10 °C kan primed pastinak/persillerod spire på godt en uges tid.

Herefter skal man som udgangspunkt regne med, at pastinak og persillerod skal renses og evt. håndluges efter fremspiring. Fenix er minor-use godkendt med maksimalt 2,5 l pr. ha i alt pr. år, heraf max 1,5 l pr. ha efter fremspiring. Boxer er også minor-use godkendt med 2 l pr. ha og maksimalt 4 l i alt. Boxer er effektiv mod sort natskygge, fuglegræs og burrenerre. Men pas på – både Fenix og Boxer kan være hårde ved pastinak og persillerod.

.....

Jordkokker

Jordkokkerne er spiret frem. Ukrudt bekæmpes ved at rense/strigle mellem rækkerne og gerne med en hastighed, så der hyppes lidt jord ind omkring planterne for at tildække nyfremspiret ukrudt.

I konventionelle jordkokker anvendes typisk Roundup til nedvisning og Boxer som jordmiddel inden jordkokkernes fremspiring. Her bør man vente og se, hvor meget ukrudt, der kommer efter fremspiring, inden der evt. renses. Boxer anvendt efter jordkokkernes fremspiring kan være hård ved jordkokkerne.

Ærter

Bladlus

De tidligst såede ærter er så småt ved at blomstre under dugen. Der bør kontrolleres for bladlus, men med det forholdsvis kølige vejr er der næppe de store problemer på nuværende tidspunkt. Erfaringsvis kan bladlus dog opformere sig voldsomt under dugen, og derfor bør man være opmærksom på problemet. Skadetærsklen i markærter er ved 15-20% angrebne planter i blomstring, mens der kan tolereres 50% ved afblomstring. Ved bekæmpelse af bladlus bør dugen tages af inden sprøjtning. Der kan anvendes Pirimor G (0,25 kg pr. ha, 3 dages behandlingsfrist og kun én behandling pr. sæson), Karate 2,5 WG (0,3 kg pr. ha, 7 dages behandlingsfrist og maks. 3 behandlinger pr. sæson), eller Mavrik 2F (0,15-0,2 l pr. ha, 7 dages behandlingsfrist og maks. 2 behandlinger pr. sæson).

Suktermajs

Suktermajs kan sås nu uden dækning, men med udsigt til fortsat køligt vejr er forholdene ikke ideelle og derfor kan det fortsat være aktuelt at dække med plastik eller fiberdug indtil majsens fremspiring. Disse majs bør sprøjtes med et jordmiddel lige efter såning og inden dækning (se GrønsagsNyt nr. 5).

Hvis de tidligst såede majs har nået en højde på 15-20 cm, bør de snart afdækkes. De plastdækkede bør så vidt muligt akklimatiseres ved at lave huller i plastikken nogle dage før, den tages helt af. Ukrudtsbekæmpelse kan igangsættes et par dage efter afdækning. Én (1,5 l pr. ha) eller to sprøjtninger (2 x 0,75 l pr. ha) med Callisto vil ofte være tilstrækkeligt. Callisto er stærk til mange almindeligt forekommende frøukrudsarter. Dog er midlet ikke særlig godt til græsser og valmue. Hanespore

bekæmpes nogenlunde med Callisto, men planterne skal være små. Der kan suppleres med Harmony SX eller Fighter 480, men ingen af midlerne dækker desværre Callistos svagheder særligt godt. Harmony SX (op til 11,25 gram pr. hektar + sprede/klæbemiddel) kan dog også bruges alene, men er smallere i virkningsspekteret end Callisto, men også noget billigere. Harmony SX er især god til fuglegræs, hanekro, raps og pileurter, men svag overfor sort natskygge, burrenerre og storkenæb. Callisto er forholdsvis uafhængig af temperaturen, mens der ved sprøjtning med Harmony minimum bør være 15 °C. Anvendelse af både Callisto og Harmony SX i sukkermajs er på off-label vilkår, så husk at udskrive brugsanvisningen.

.....

Arrangementer 2016

26. maj

Ukrudtsmarkvandring Samsø

Syngenta er sponsor for frokosten og Danish Agro er sponsor for en del af bussen.

Program:

- 9.00 Opsamling på Hou Havn, De "jysk-fynske" løg avlere kører med bussen ombord. Deltager sørger selv for transport til Hou. Havnegade Odder.
- 10.15 afh. med person bil i Ballen Ny Færgehavn af Sjællandske løgavlere.)
- 10.45 Brattingborg gods. (Sjællandske løg avlere støder til.) Præsentation af Brattingborg Gods og såløgsmark Jens Kjeldahl (afg. 12.00)
- 12.20 Sildeballe Løg Rasmus og Ejnar Bager afg. 12.45
- 13.35 Mårup Havn frokost (afg. Kl. 13.30)
- 13.35 Mårup Løg /ukrudts forsøg Peter Hartvig (afg.13.50)
- 14.00 Nordby Brdr. Kjeldahl pak/Lager mv.
- 15.05 Afgang Nordby
- 14.45 Færge mod Jylland kl. 15.45

(Sjællandske løg avlere bringes til Ballen Ny Færgehavn med personbil).

Tilmelding til Peder Krogsgård på 4037 4651 eller pk@seges.dk senest d. 18. maj.

26.-29. juni

Tysklandstur, Avlerforeningen af Danske Spiseløg

Søndag 26. juni

- 12:00 Opsamling Slagelse Bilka
- 13:00 Opsamling Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV.
- 13:15 Opsamling Scandic Kolding

Mandag 27. juni

- 8:00 Afgang
- 8:30 Besøg hos: Frederik Nienau, OT Wennekath, 121401 Thomasburg
- 10:30 Grimme Uelzen Betriebsstätte Grimme Uelzen
- Selskabet står for ASA-lift maskiner i Tyskland og Grimme roemaskiner til Uelzen området.
- 13:00 Heide Zwiebel - AG:Flachskamp 25, Klein Süstedt 29525 Uelzen.
- I det moderne forarbejdningsanlæg, kan op til 1.000 tons løg behandles hver uge.
- Hotel og spisning ASA-lift.

Tirsdag 28. juni

- 8:30 Afgang
- Hermann-Josef Jansen Zwiebelschälbetrieb u. Landw. Haverslohe

31, 41379 Brügggen. Dyrker 80 ha løg. Vinterløg og sætteløg. Løgene bruges i vid udstrækning til skræling og industri.

Frokost

Gutsverwaltung Niershoff Gemüsebau, Ziegelheider Straße 71, 47906 Kempen. Dyrker såløg (sorterne Dormo, Summit, Hyfive, Sunskin ...) Har stor erfaring i dyrkning og vi ser marker og maskiner

Ølsmagning på vejen til Kasselområdet

Onsdag 29. juni

8:30 Afgang

Kaliumminen, Merkers-Kieselbach (Erlebnis Bergwerk Merkers)

Frokost

Scandic Kolding

Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV

Slagelse Bilka

Ved sponsorernes (SeedCom der er hovedsponsor og ASA-Lift) meget velvillige hjælp, er der lykkedes at lave turen til kr. 1.500 pr deltager. **Tilmelding så hurtigt som muligt til Peder Krogsgård på 4037 4651 eller pk@seges.dk**

5. august

Erfa Fyn/Jylland

Elektronisk tilmelding GR19/1-16

11. august

Erfa Sjælland

Elektronisk tilmelding GR19/2-16


Se nyheder på:



Ole Scharff

Tlf: 87 40 66 34 / Mobil: 40 73 19 58

ohs@seges.dk



Lars Møller

Tlf: 40 84 30 11

lrn@seges.dk



Karina Frandsen

Tlf: 87 40 66 12 / Mobil: 21 64 80 85

kfr@seges.dk



Pernille Kynde

Tlf: 30 51 62 14

pbk@seges.dk



Richard de Visser

Tlf: 87 40 66 10 / Mobil: 30 53 87 16

rdv@seges.dk



Peder Krogsgård

Tlf: 40 37 46 51

pk@seges.dk