



Blomstring kan ses overalt i naturen, og også buskene og sødkirsebær er begyndt. Surkirsebær træerne venter formodentlig mindst en uge endnu, afhængig af vejret.

Indhold:

Buskfrugt	1
Surkirsebær	3
Sødkirsebær	5

Gødskning

Gødning bør være bragt ud i alle kulturer.

Bestøvning

Bier og Humlebier skal gerne være på plads dagene op til blomstring. Især for bier gælder at sættes de for tidligt ud, kan de nemt have fundet andre arealer at trække i, og derfor undlader den kultur, de er tiltænkt. Dette er dog nok primært et problem i buskene.

Ukrudt

Er der eksisterende ukrudt i plantagen, er det oplagt at udføre en bekæmpelse med Glyphosat, lige før blomstring. I buskfrugt må Glyphosat ikke anvendes efter blomstring.

Bladgødskning

Her før blomstring, og i de kulturer hvor bladmassen er til det, kan der sprøjtes med Urea, og evt. lidt Zink og Mangan. Sprøjtningerne kan være til gavn for såvel bladmasse, vækst som blomstringen.

ERFA grupper

Der er oprettet en buskfrugt ERFA gruppe både øst og vest for Storebælt. Der startes på Fyn den 4. maj, og på Sjælland den 5. maj. Ligeledes er der en gruppe for Sødkirsebæravlere.

Skriv til [Gitte Hallengreen](#), eller ring tlf.: 2171 7749, hvis du ønsker at deltage, der er altid plads til flere.

Buskfrugt

De tidligste solbærsorter, ribs og stikkelsbær er begyndt at blomstre. Det er således tid at holde øje med, hvornår der skal blomstringssprøjtes.

Svampesprøjtninger

I blomst skal Signum bruges mindst en gang i solbær og ribs. Forsøg at ramme 30 % blomstring, nogle steder bliver det her i weekenden. Bliver det fugtigt anbefales en sprøjtning nr. 2.

Til første sprøjtning anvendes Signum med 1 kg pr. ha. Til anden sprøjtning kan anvendes Teldor, Switch eller Signum. Vær opmærksom på, at hvis Signum benyttes to gange i blomst, så må det ikke benyttes senere.

To sprøjtninger er især aktuel i Ben Alder. Her kan man sprøjte allerede på 20 % blomst, hvis man ved at man vil køre to gange.

I Stikkelsbær ved vi ikke, om man får respons på at blomstringssprøjte. Signum må ikke anvende, og Teldor er oplagt at benytte i stedet.

Ben Tron er langt fremme og flere steder findes der åbne blomster. Her en tilfældig valgt gren. >>>>



Skadedyr

I år har vi ikke mulighed for at følge knopgalmidernes vandring ud af knopperne. Men Knopgalmider forventes at være i gang med deres vandring. Svovl her lige før blomst er oplagt. Benyt 3-5 kg. Husk det ikke må sprøjtes på våde blade. Ben Connan får skader på bladene af svovl, men er der knopgalmider kan det nogle gange være en god ide at sprøjte med ca. 2 kg, og så leve med de svidninger der evt. kommer. Undlad om muligt at sprøjte med svovl i åben blomst. Er der stort smittetryk kan man vælge at leve med de skader, der måske opstår på nogle af blomsterne.

Galmyg er svære at bekæmpe. Var der et stort angreb sidste år, kan man forsøge at sprøjte med et pyretroid her lige før første blomst åbner. Husk at passe på bierne.

Bladhvæpse kan være fremme i stikkelsbær allerede omkring blomstring, hvor de lægger æg. I solbær og ribs er det typisk efter blomstring. Det skyldes at det ikke er samme bladhvæpseart. Man skal finde æggene på bagsiden af bladene i bunden af busken, og først når de er klækket bekæmpes der. Biscaya er rigtig god til det, men må kun benyttes en gang. Så timing er vigtig.



Bladhvæpse: Her ses hullede blade i bunden af busken. Det er de første æg klækket i stikkelsbær. De voksne forventes at flyve nu, så inde for en uge eller to kan den første generation forventes at være i gang i stikkelsbær. >>>>

Bladlus ses typisk lige efter blomstring, men de kan være der allerede nu, blot i så lille antal at de ikke ses.

Frostmålerlarver har været et tiltagende problem. Hold øje med blomsterknopper der er udgnavede, samt blade der bliver hullede. Ofte er det for sent at bekæmpe, når man på afblomstring ser de visne knopper, men finder man larver (meget små) allerede nu, kan man nå at redde nogle af blomsterknopperne, idet de vandrer fra en knop til en anden.



Frostmålerlave og skader på bladene. Ses formodentlig om 1-2 uger. Noteres for evt. bekæmpelse i 2016. >>>>


Surkirsebær

Blomstringen nærmer sig. Det er svært at sige, hvornår den går i gang, men det er vigtigt at være klar. >>>>

Monilia

Monilia er den sygdom, som er aktuell at bekæmpe på denne årstid. Der er ikke så meget fokus på bladplet lige nu, idet midlerne anvendt til Monilia også er gode til bladplet.

Strategien afhænger meget af smittetrykket i plantagen. Er der store problemer med Monilia, så skal der bekæmpes første gang på Ballon, lige inden første blomst åbner. Er der ikke set egentlig angreb i tidligere år, typisk i sorter som Stevnsbær, sættes på en enkelt sprøjtning på 30 % blomstring. I meget fugtig og langstrakt blomstring kan det blive nødvendigt med to sprøjtninger i Stevnsbær, Fanal og Sumadinka, og op til 3 i Kelleris. Første sprøjtning udføres med 0,75 kg Signum pr. ha.



Som det ses i figuren, er infektion meget afhængig af vejret. Varmt fugtigt vejr giver større angreb, end koldt fugtigt vejr. Og er perioden med fugt under 4 timer, er der ikke så stor risiko for infektion. Vi er meget i tvivl om hvorvidt det er Monilia, som i visse plantager er det primære problem. Der er mistanke om, at der i disse plantager er problemer med en anden skadevolder, evt. bakteriekræft, men vi har ingen godkendte midler til denne sygdom.

Skadedyr

Hold øje med larver i blomstringen. Af og til ses larveangreb som kan være ødelæggende. Der kan være tale om både frostmålerlarver og møllarver. Begge gnaver inde i blomsterne. Enkelte kan accepteres, men ikke for mange. Der er risiko for at de opformerer sig til de kommende år. Pyrethroid kan benyttes, men pas på bierne.

Barkbiller / Borebiller

Barkbiller eller borebiller, som de også kaldes, bliver mere og mere almindelige i de danske plantager. De angriber primært træer som er svækket, af f.eks. frost, tørke, våd jord, problemer ved podestedet, o.s.v.. Det nævnes også at svækkede/døende grene kan være indgangsvinkel. Kun hvor der er ekstremt mange, er der rapporteret angreb på sunde træer. Flyvning kan forventes fra midt april til midt juni. Som rettesnor flyver de ikke før temperaturen er 18-19 grader. Ved at opsætte alkoholfælder, kan man se hvornår de voksne flyver, og dermed udføre bekæmpelse på optimalt tidspunkt. Fælderne skal op nu.

Alkohol i bægeret tiltrækker billerne, limpladen er beregnet til at fange dem. >>>>



Kirsebærfluen

Kirsebærfluen var et stort problem sidste år, og kan forventes at blive det igen i år. Så husk at bestille **gule limplader**. [Limplader bestilles på gartnershop.dk](http://gartnershop.dk).

Fluerne vil søge limpladerne, og man kan på den måde følge, om de er til stede. De vil ikke være fremme allerede nu, men det er vigtigt at få bestilt limpladerne hjem, således at de er klar til at hænge op.

Normalt anbefales op til 4 limplader pr. ha. i sødkirsebær.

Så mange kan ikke tjekkes i surkirsebær, så man må prioritere de områder, der var ramt sidste år, og lune lokaliteter.

Der vil blive arrangeret nogle "markvandring", hvor man samtidig kan få hjælp til at kikke sine limplader igennem. Datoer offentliggøres i næste nyhedsbrev.

Sødkirsebær

Som det ses på billedet af lapins, er blomstringen så småt i gang. >>>>

Monilia

Monilia er den sygdom, som er aktuel at bekæmpe på denne årstid. Der er ikke så meget fokus på bladplet lige nu, idet midlerne anvendt til Monilia også er gode til bladplet.

Strategien afhænger meget af smittetrykket i plantagen. Er der store problemer med Monilia, så skal der bekæmpes første gang på Ballon, lige inden første blomst åbner. Er der ikke set egentlig angreb i tidligere år, sættes på en enkelt sprøjtning på 20-30 % blomstring. I meget fugtig og langstrakt blomstring kan det blive nødvendigt med to sprøjtninger. Første sprøjtning udføres med 0,75 kg Signum pr. ha. Til anden sprøjtning kan anvendes Teldor eller Swithc.



Se figur under surkirsebær, som viser hvornår der er størst risiko for infektion.

Vi er meget i tvivl om, hvorvidt det er Monilia, som i visse plantager er det primære problem. Der er mistanke om, at der i visse plantager er problemer med en anden skadevolder, evt. bakteriekræft, men vi har ingen godkendte midler til denne sygdom.

Skadedyr

Hvis man har sat overdækning op, allerede før blomstring skal man være opmærksom på Bladlus. Disse bekæmpes bedst med Pirimor, idet den er skånsom for nyttedyr og bier.

40 % tilskud til Miljøteknologi

Miljøteknologi ordningen er åben. Ansøgningsfristen er den 19. maj 2015.

Det er bl.a. muligt at søge tilskud til:

- Ukrudtsbrænding med nedsat energiforbrug
- Styring af gødning
- Sprøjteteknologi: Tunnelsprøjte med recirkulering af sprøjtevæske
- Lugerobotter til rækkeafgrøder
- Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i flerårige vedagtige rækkeafgrøder
- Klimastation og software til varsling af sygdomme og skadedyr
- Dyrkning i tunneler
- Regntag over frugt og bær til forebyggelse af svampesygdomme

Kontakt: Mona H. Christensen. Tel.: 8740 5478. E-mail: mhc@vfl.dk

Gitte Hallengreen Jørgensen
Mobil 21 71 77 49
ghj@vfl.dk

Hanne Lindhard Pedersen
Tlf. 87 40 66 06
Mobil 23 82 63 47
hlp@vfl.dk

Lene Baarts
Mobil 40 45 99 98
lba@vfl.dk