




Avlermøde Danfrugt
13 maj


Gitte Hallengreen Jørgensen

Udvikling	Skadevolder	Middel	kg/ltr pr. ha
Knopbrydning/ballon	Målerlarver	Karate 2,5 WG	0,4
Blomstring	Grå monilia	Signum WG	0,75
		Switch 62,5 WG	1,0
		Teldor WG 50	1,5
Ablomstring- frugtudvikling	Kirsebærbladpletsyge	Dithane NT	2,0
		Delan WG	1,0
		Signum WG	0,75
		Kumulus S	5,0-7,0
	Tørresyge	Delan WG	1,0
		Signum WG	0,75
	Bladlus	Movento SC 100	0,375-1,125
		Mospilan SG	0,25
		Pirimor G	0,2
	Snudebiller	Karate 2,5 WG	0,4
	Kirsebærfluen		
		Mospilan SG	0,32
Bærbeskyttelse	Gråskimmel, moniliaråd	Teldor WG 50	1,5
		Signum WG	0,75
		Switch 62,5 WG	1,0
Efter høst	Kirsebærbladpletsyge	Dithane NT	2,0
		Delan WG	1,0

Syllit








Sprøjteteknik



Kirsebærsnudebilleren

Der lægges æg på det nyligt dannede bær
Larven gnaver sig ind i bærret.
Ved bærmodning kommer larven frem.
Efterlader hul – risiko for infektion med
monilia og gråskimmel



kirsebærfluen

Limplader op 1 juni.

Aflæses to gange pr uge i varme perioder

Mospilan. 0,32 kg pr ha

1. Opsætning og aflæsning af gule limplader inden farveskift

1. 4 stk/ha hvor der tidligere er sket fund
2. Skadestærskel = 0

2. Aerosolbekæmpelse af voksne fluer

1. Husk $T^{\circ} \geq 16^{\circ}\text{C}$ (og solskin)
2. Skal gøres inden der lægges æg, altså op til 10 dage efter fangst.

3. Aflæsning af gule limplader for at tjekke fortsat flyvning

4. Bekæmpelse af nyklækkede larver; Mospilan 0,32 kg/ha **14-19 dage efter fangst**

5. Aflæsning af gule limplader for at tjekke fortsat flyvning



Borebille



Udvikling	Skadevolder	Middel	kg/l pr. ha
Ablomstring medio maj	Meldug, skivesvamp, filtrust	Candit	0,2
	Bladhvepselarver	Biscaya OD 240/ LFS Thiacloprid	0,3
	Knopgalmider, meldug	Kumulus S	3-5
Frugtudvikling	Bladlus	Primor G	0,3
	Bladlus, bladhvepse og sugende stikkende insekter	Biscaya OD 420 LFS Thiacloprid	0,3
	Meldug, skivesvamp, filtrust	Candit	0,2
		Signum WG	1,0-1,5
	Meldug	Kumulus S	3-5
	Skivesvamp, filtrust	Dithane NT	2,0
	Filtrust m.fl.	Folicur EC 250	0,8
	Snegle	Ferramol	7,5-15
		Sluxx HP	7,0
		SmartBayt Professional	50
	Gråskimmel	Switch 62,5 WG	1,0

Afblomstring og Frost



Sygdomme

Obs på meldug nu væksten går stærkt.

Har muligvis ikke været varmt nok til infektion har fundet sted



Knopgalmider

Svovl på afblomstring



Frostmålerlarver



Bladgalmyg

Bekæmpes ?



Bladhvæpse



Viklere (Tortricidae)



Ribsbredvingemøl



Ukrudt

MCPA en gang før 1 august

Reglone + sprede klæbemiddel



Floramite til spindemider

0,45 l. pr ha ca 1900 kr.

Må kun anvendes i solbær, ribs, hindbær og brombær i væksthuse og på friland til bekæmpelse af spindemider

Til anvendelse på friland: Bær beskyttelseshandsker ved opblanding og udsprøjtning.

Til anvendelse i væksthuse: Bær beskyttelseshandsker ved opblanding. Ved håndtering og plukning af solbær, ribs, hindbær og brombær i væksthuse, skal der anvendes kemisk bestandige handsker.

Ikke senere end 7 dage før høst

Max 2 behandlinger pr. sæson - minimum 7 dage mellem behandlinger

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Syllit - pris på 2595 kr pr kg



Anvendelse:

Afgrøde3	Skadevolder	Maksimal dosering	Behandlingstidspunkt	Bemærkninger
Æble Pære	<i>Venturia inaequalis</i> : æbleskurv <i>Venturia piri</i> : pæreskurv	Enkeltdosis: 1,25 l/ha Samlet dosis: 2,5 l/ha/år	BBCH 01 - til ca. BBCH 77-78	Maksimalt 2 behandlinger per vækstår. Indtil 60 dage før høst.
Kirsebær (sur og sød)	<i>Blumeriella jaapii</i> : kirsebærpladplet	Enkeltdosis: 1,25 l/ha Samlet dosis: 2,5 l/ha/år	BBCH 60 - BBCH 79	Maksimalt 2 behandlinger per vækstår. Indtil 14 dage før høst.

Syllit 544 SC er regnfast efter 2 timer og kan anvendes ved lave temperaturer (dog ikke i umiddelbar nærhed af frost). Kan anvendes på våde blade (dug og lignende).

Endnu mere nyt og overraskende

Topsin

**1,2 kg pr ha mod gul monilia 14 dages
sprøjtefrist**

Kirsebær og blommer.

139 pr kg i afgift - pris ??