

Bladråd ved Primula

Mildt og fugtigt vejr i kombination med lav lysindstråling øger risikoen for råd på nedre blade. Den høje luftfugtighed giver både rådsvampe og bakterier gode vækstbetingelser, og når bladene samtidig er svage på grund af lysmangel og mangel på fordampning og næringsstoffer, fører det til angreb.

Man kan afhjælpe problemet ved at skabe afstand og luftcirkulation mellem planterne. Vær endvidere opmærksom på om planterne får tilstrækkeligt med næring. Hen over vinteren vandes der i perioder meget sjældent, og dette betyder, at planterne ikke får tilført megen gødning. For at undgå næringsmangel skal Lv i gødningsvandet hæves i perioder med gråt, lunt og fugtigt vejr. Målinger af jordens ledningsværdi vil give et billede af næringsniveauet i jorden.

Pelargonium zonale

Især Pelargonium zonale er modtagelig for angreb af gråskimmel, når de pottes under lysfattige forhold. Angrebet opstår som regel på stænglen lige ved jordoverfladen eller på blade tæt på jordoverfladen. Fra bladet vil gråskimmel sprede sig til stængel og give stængelråd.

Behandling med nyttesvampen Trichoderma (for eksempel Triatum) har vist sig at kunne reducere udfald på grund af stængelråd.

Visne skud og bladpletter ved Mandevilla (Dipladenia)

Døde skudspidser og blade med brune bladpletter er ikke udsædvanligt i Mandevilla, hvis man har det forkerte klima. Koldt og fugtigt klima, en våd og kold jord og lav lysindstråling giver råd pletter på bladene samt rådne/døde skudspidser. Undgå lav temperatur og våd jord. Temperaturen skal helst ikke under 15°C.

Monitorering for trips

Monitorering er en central del af en IPM-strategi og et meget vigtigt redskab, når det drejer sig om at holde den amerikanske blomstertrips under kontrol. Uden monitorering ved man ikke hvor mange trips, der er i væksthuset, eller hvordan populationen udvikler sig. Uden monitorering har man ingen kontrol over udviklingen af populationen.

Monitorering er nødvendig for at:

- opdage angreb tidligt
- følge populationen af trips gennem sæsonen
- se om bekæmpelsen virker/har virket.

INDHOLD

Bladråd ved Primula	1
Pelargonium zonale	1
Visne skud og bladpletter ved Mandevilla (Dipladenia).....	1
Monitorering for trips	1
HUSK aftale med synsvirksomhed	2
Candit godkendt.....	3
Sprøjteopdateringskursus 2017.....	3



Gråskimmel i Pelargonium



Hvornår starter monitoreringen?

Allerede når småplanterne ankommer til gartneriet, eller den nye kultur startes op, skal man starte med systematisk at holde øje med tripsene.

Første kontrol skal altid være en visuel kontrol, hvor planternes sundhed kontrolleres. I forbindelse med denne kigges der også efter tegn på tripsangreb. Så snart planterne er sat ud på bordene sættes der fangplader op.

Fangplader

Registrering af trips på fangplader er en central metode til monitorering af trips. Her bruger man enten gule eller blå fangplader, og monitoreringen gennemføres regelmæssigt.



Gul og blå fangplade til registrering af skadedyr/trips placeret lige over planterne.

Foto: Anne Krogh Larsen, GartneriRådgivningen.

Fangpladerne skal placeres maximalt 10 cm over planterne. Tripsene flyver ikke specielt højt, men bæres af sted med luftstrømmen, så for at de søger op mod fangpladerne skal disse være placeret lige over planterne. Under kanten af fangpladen skal være lige over planterne. Der opsættes ca. 4 fangplader pr. 1.000 m².

For at kunne følge tripspopulationens udvikling skal fangsten på fangpladerne tælles og noteres ned en gang om ugen eller hver 14. dag. Når vejret er varmt, bør fangpladerne tjekkes to gange om ugen.

Den regelmæssige registrering af antal voksne på fangpladerne vil give et billede af, hvordan populationen udvikler sig, og hvilken bekæmpelsesstrategi der er nødvendig. Hyppige inspektioner vil gøre det muligt at opdage angreb tidligere og dermed sætte ind med behandling eller ekstra udsætning af nyttedyr.

HUSK skriftlig aftale med synsvirksomhed

Hvis din sprøjte ikke er blevet synet **inden 26. november 2016**, skal du have en skriftlig aftale med en synsvirksomhed vedrørende syn af sprøjte **inden midten af maj 2017**.

Candit godkendt

Candit er blevet revurderet, og har fået ny etikette. Bemærk at der er en del ændringer i anvendelsen. Det gælder både antal behandlinger, dosering og sprøjtefrister - især omkring spiselige afgrøder.

HUSK – læs altid etiketten grundigt.



SPRØJTEOPDATERINGSKURSUS 2017

Alle der har et sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis, skal have et opfølgningskursus hvert fjerde år – er det din tur nu?

Onsdag d. 11. januar afholder GartneriRådgivningen A/S sprøjteopdateringskursus i Odense, fra kl. 8.30 til kl. 16.00

Læs mere om program, dato og tilmelding på linket nedenfor:

<http://www.gartneriraadgivning.dk/sproejteopdateringskursus>

OBS – OBS - OBS!
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER
TIRSDAG D. 3. JANUAR



Glædelig jul og Godt Nytår



Anne Krogh Larsen

Tlf: 87 40 54 76 / Mobil: 21 63 12 61

akl@seges.dk



Inge Ulsted Sørensen

Tlf: 87 40 53 89 / Mobil: 30 50 77 69

ius@seges.dk