

PlanteværnsNYT

EKSTRA nr. 2 // August 2017

Bemisia i julestjerner – forebyggelse og bekæmpelse 2017

Der er fundet Bemisia (bomuldsme llus) i et parti julestjerner, og det giver ekstra god grund til at holde øje med og forebygge angreb af me llus i sæsonens julestjerner – især hvis man skal sælge til lande der er omfattet af den beskyttede zone for Bemisia.

Monitering

Bemisia sidder ofte skjult på de nederste blade og flyver ofte først op, når de bliver forstyrret, og derfor er kontrol af planterne nødvendig. Her er medarbejderne vigtige, og det er meget afgørende at medarbejderne er opmærksomme og giver besked, hvis de ser "hvide fluer". Det kan være en god hjælp med billedmateriale, især hvis det er ikke dansk talende medarbejdere, der fortrinsvis sætter på afstand og håndterer planterne.

Fangplader kan ligeledes være en hjælp, men da Bemisia er temmelig passive og ikke flyver meget, skal der oftest et stort smittetryk til, før man registrerer noget på fangpladerne.

Findes der me llus mærkes stedet op med en pind, så der kan sættes ind med ekstra bekæmpelse i området.

Integreret bekæmpelse

Småplanterne sprøjtes med Movento SC100 eller Vertimec, så smittetrykket bringes ned. Ved Movento SC 100 kan der sprøjtes 2 gange 14 dages mellemrum. Ved sprøjtning af Vertimec kan udsætning af snyltehvepse først starte efter 3 uger.



Foto: Scott Bauer, USDA Agricultural Research Service, Bugwood.org

Snyltehvepsen *Encarsia formosa* eller et mix af *Encarsia formosa* og *Eretmoceru s eremicus* sættes ud forebyggende en gang om ugen så længe temperaturen er over 16°-18° C.

Hvis brugen af snyltehvepse skal blive en succes forudsætter det, at småplanterne ikke er behandlet med midler som Confidor, Biscaya, Mospilan eller pyrethroider, som f.eks., Fastac og Karate.

Kemisk bekæmpelse

Der er udpræget resistens mod neonicotinoiderne hos Bemisia, og derfor giver sprøjtning med Confidor, Biscaya og Mospilan ikke altid den ønskede virkning. Samtidig bliver gruppen af neonicotinoiderne bandlyst af flere og flere detailkæder i Europa.

I stedet for anbefales, at der sprøjtes med Movento SC 100 efterfulgt af Vertimec og Neem Azal-T/S. For at opnå en effektiv bekæmpelse, er det vigtigt at sprøjte flere gange med 1-2 ugers interval, og at hele planten dækkes med sprøjtevæske.

HUSK - hvis ikke du har prøvet midlerne før, så anbefales en prøvesprøjtning.

Sprøjteopdateringskursus - Væksthus 2017

GartneriRådgivningen tilbyder et målrettet sprøjteopfølgningskursus for planteskolegartnere og væksthushusholdere:

Torsdag d. 2. november 2017 kl. 8.30 - 16.00

GartneriRådgivningen A/S, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV

[Se mere her](#)



Anne Krogh Larsen

Tlf: 87 40 54 76 / Mobil: 21 63 12 61

akl@seges.dk



Inge Ulsted Sørensen

Tlf: 87 40 53 89 / Mobil: 30 50 77 69

ius@seges.dk