

**Brugsanvisning til mindre anvendelse  
af Azatin EC (738-3) til insektbekæmpelse i  
tomat, aubergine, agurk, squash, melon,  
græskar, salat, spinat, endiviesalat, endivie,  
rucola, bedebblade og krydderurter  
dyrket i åbne væksthuse**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel  
51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

**Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

*Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## **Vejledning for Azatin EC (reg. nr. 738-3) til insektbekæmpelse i tomat, aubergine, agurk, squash, melon, græskar, salat, spinat, endiviesalat, endivie, rucola, bedebblade og krydderurter dyrket i åbne væksthuse**

### *Insektmiddel:*

- Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i tomat, aubergine, agurk, squash, melon, græskar, salat, spinat, endiviesalat, endivie, rucola, bedebblade og krydderurter dyrket i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, koncentration af sprøjtevæsken, antal behandlinger og interval skal overholdes
- Sprøjteførere skal anvende handsker og beskyttelsesdragt ved blanding, påfyldning og udbringning
- Ved håndtering af behandlede tomat, agurk, squash, melon, græskar, salat, spinat, endiviesalat, endivie, rucola, bedebblade og krydderurter skal der anvendes kemisk bestandige handsker.
- Må i tomat, agurk, squash, melon og græskar ikke anvendes senere end 3 dage før høst.
- Må i salat, spinat, endiviesalat, endivie, rucola, bedebblade og krydderurter ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
- Ved anvendelse i tomat, agurk, aubergine, squash, melon, græskar, salat, spinat, endiviesalat, endivie, rucola, bedebblade og krydderurter dyrket i eller på jorden: For at beskytte grundvandet må der højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august – 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder azadirachtin på samme areal.
- Ved dyrkning af tomater, auberginer, agurker, squash, meloner og græskar max 1 behandlet kultur pr. areal pr. vækstår. Der må kun behandles i vækststadier BBCH 40-89.
- Ved dyrkning af salat, spinat, endiviesalat, endivie, rucola, bedebblade og krydderurter dyrket i eller på jorden max 1 behandlet kultur pr. areal pr. vækstår.

### Advarsel:

”Se Azatin EC etiketten”

## Brugsanvisning

*Anvendelse:* Til bekæmpelse af insekter i åbne væksthuse

Afgrøde	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. kultur	Behandlings-tidspunkt (vækststadier)	Antal behandlede kulturer pr. væksthuseareal pr. vækstår	Sprøjtefrist
Tomat, aubergin, agurk, squash, melon, græskar Dyrket <b>i jorden</b> , uden recirkulering. Eller <b>i vækstmedie-blokke</b> , som står på jorden.	1,0 L/ha  <u>Svarende til:</u> 100 L af max 0,10 % opløsning pr. 1000 m <sup>2</sup> (= 1,0 L Azatin EC pr. ha)*	Max 2 (min. 7 dages interval)	BBCH 40-89	Max 1 kultur pr. vækstår pr. areal behandlet med aktivstoffet azadirachtin.	3 dage
Salat, spinat, endiviesalat, endivie, rucola, bedeblade, krydderurter. Dyrkes <b>i jorden</b> ; uden recirkulation	1,0 L/ha  <u>Svarende til:</u> 100 L af max 0,10 % opløsning pr. 1000 m <sup>2</sup> (= 1,0 L Azatin EC pr. ha)*	Max 1	> BBCH 40	Max 1 kultur pr. vækstår pr. areal behandlet med aktivstoffet azadirachtin.	7 dage
Salat, spinat, endiviesalat, endivie, rucola, bedeblade, krydderurter. Dyrket på <b>tætte borde</b> med recirkulation	1,0 - 1,5 L/ha  <u>Svarende til:</u> 100 L af max 0,15 % opløsning pr. 1000 m <sup>2</sup> (= 1,5 L Azatin EC pr. ha)**	Max 3 (min. 7 dages interval)	Ved behov.	Der sættes ikke en begrænsning såfremt bordene er tætte og der er recirkulation.	7 dage

\* 0,10 % opløsning (= 100 ml Azatin EC opløst i 100 l vand)

\*\* 0,15 % opløsning (= 150 ml Azatin EC opløst i 100 l vand)

*Sprøjteteknik/udstyr:* Bomsprøjte og kærresprøjte m. lanse. Omrøring skal være tilkoblet under udsprøjtning.

*Dato:* 21. december 2020