

# **Brugsanvisning til mindre anvendelse af Azatin EC (reg.nr. 738-3) til insektbekæmpelse i jordbær dyrket i render i åbne væksthuse**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel  
51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## Vejledning for Azatin EC (reg.nr. 738-3) til insektbekæmpelse i jordbær dyrket i render i åbne væksthuse

### Insektmiddel:

- Må kun anvendes til insektbekæmpelse i jordbær dyrket i render i åbne væksthuse
- Må i jordbær ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
- Sprøjteførere skal anvende handsker og beskyttelsesdragt ved blanding, påfyldning og udbringning.
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes
- Dyserne på den vertikale sprøjtebom skal være indstillet således, at sprøjtevæsken kun rammer planterne i renderen.
- Ved brug af rygsprøjte skal al sprøjtevæsken afsættes i afgrøden.
- For at beskytte grundvandet må der på samme areal højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august – 31. juli). Max 2 behandlinger i alt pr. areal pr. vækstår. Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder azadirachtin på samme areal.

### Advarsel:

”Se Azatin EC etiketten”

## Brugsanvisning

Anvendelse: Mod insekter i jordbær dyrket i render i åbne væksthuse

Afgrøde	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. kultur	Antal behandlede kulturer pr. væksthuseareal pr. vækstår	Sprøjtefrist
Jordbær dyrket i render i åbne væksthuse	1,0 L/ha <u>Svarende til:</u> Max. 100 L af max 0,10 % opløsning pr. 1000 m <sup>2</sup> (= 1,0 L Azatin EC pr. ha)*	2 (min. 7 dages interval)	1 (Alternativt kan 2 kulturer behandles 1 gang hver)	7 dage

*Sprøjeteknik/udstyr:* Sprøjte med vertikal sprøjtebom eller rygsprøjte til bl.a. pletbehandling. Dyserne på den vertikale sprøjtebom skal være indstillet således, at sprøjtevæsken kun rammer planterne i rækken. Ved brug af ryg-sprøjte skal al sprøjtevæsken afsættes i afgrøden.

Omrøring skal være tilkøbt under udsprøjtning.

Dato: 15. februar 2021