

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Betanal (18-528), SweDane Betasana 160 SE (1046-11) og Betasana 160 SE (1046-13) mod ukrudt i gulerod, persillerod, pastinak og knoldselleri på friland

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Hortiadvice A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Betanal (18-528), SweDane Betasana 160 SE (1046-11) og Betasana 160 SE (1046-13) mod ukrudt i gulerod, persillerod, pastinak og knoldselleri på friland

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes mod ukrudt i gulerod, persillerod, pastinak og knoldselleri på friland
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Må ikke anvendes senere end 2 måneder før høst
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Sprøjteførere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding og påfyldning.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende

Advarsel:

”Se midlernes etiketter”

Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde	Skadevolder	Max. dosering pr. behandling	Vandmængde	Antal behandlinger (interval)	Behandlingstidspunkt (vækststadier)	Sprøjtefrist/ PHI
Gulerod, persillerod, pastinak, knoldselleri	Ukrudt	2 L/ha	100-300 L/ha	Max. 2 (7 dage)	Efter fremspiring af afgrøden (BBCH 10-18) på ny fremspiret ukrudt.	2 måneder

Sprøjteudstyr:

Almindelig marksprøjte

Risiko for skade:

I en sprøjtestrategi med andre herbicider kan midlerne skade afgrøden. Der bør derfor holdes afstand til andre behandlinger. Stressede afgrøder er mere følsomme overfor phenmedipham. Anvendelse af penetreringsolie og/eller blanding med andre herbicider øger risikoen for skader. Midlerne anvendes efter fremspiring af afgrøden på ny fremspiret ukrudt. Det anbefales at afprøve midlerne på et mindre areal, så der kan fås erfaringer med phenmedipham, inden det anvendes i stor skala.

13. september 2017 Opdateret 29. april 2024