

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Biscaya OD 240 (18-501)

i knoldfennikel, asparges, gulerødder, pastinak, persillerod, bede, radise, jordskok, peberrod, skorzonerod, kinakål, glaskål, grønkål, palmekål, pak choy, knoldselleri, bladselleri, kepa-, skalotte-, hvid- og bundtløg, squash, drueagurk, porre, forårsløg, bønner m. bælg og rucola på friland

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. GartneriRådgivningen kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Biscaya OD 240 (18-501) i knoldfennikel, asparges, gulerødder, pastinak, persillerod, bede, radise, jordkok, peberrod, skorzonero, kinakål, glaskål, grønkål, palmekål, pak choy, knoldselleri, bladselleri, kepa-, skalotte-, hvid- og bundtløg, squash, drueagurk, porre, forårsløg, bønner m. bælg og rucola på friland

Insektmiddel:

- Må kun anvendes mod de i brugsanvisning angivne skadedyr i knoldfennikel, asparges, gulerødder, pastinak, persillerod, bede, radise, jordkok, peberrod, skorzonero, kinakål, glaskål, grønkål, palmekål, pak choy, knoldselleri, bladselleri, kepa-, skalotte-, hvid- og bundtløg, squash, drueagurk, porre, forårsløg, bønner m. bælg og rucola på friland
- Må i knoldfennikel, gulerødder, pastinak, persillerod, radise, jordkok, peberrod, skorzonero, kinakål, glaskål, grønkål, palmekål, pak choy, knoldselleri, bladselleri, forårsløg og rucola ikke anvendes senere end 7 dage før høst
- Må i beder, porre og bønner m. bælg ikke anvendes senere end 14 dage før høst
- Må i kepaløg, skalotteløg, hvidløg, bundtløg ikke anvendes senere end 21 dage før høst
- Må i squash og drueagurk ikke anvendes senere end 3 dage før høst.
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Advarsel:

”Se Biscaya OD 240 etiketten”.

Brugsanvisning

Dosering, skadevolder, antal behandlinger, sprøjtefrist, sprøjetidspunkt

Afgrøder	Skadevolder	Dosering	Max antal behandlinger	Sprøjtefrist (PHI)	Udvikling/stadie af afgrøden ved forventet anvendelse	Min. plantedække ved anvendelse
Knoldfennikel	Bladlus og trips*	0,3 L/ha	1	7 dage	BBCH 41-49	60%
Asparges	Bladlus og asparges bille	0,3 L/ha	1	Senest i oktober året før høst	August-oktober	75%
Gulerødder, pastinak, persillerod, radise, jordskok, peberrod og skorzonnerod	Bladlus	0,3 L/ha	1	7 dage	Guler., past., persil. og jordsk.: BBCH 41-42 Radis, peberrod, og skorzonnerod: BBCH 42-43	80% 60%
Bede (rød, gul og hvid)	Bladlus	0,3 L/ha	1	14 dage	Rødbede: BBCH 38	80%
Kinakål og glaskål	Kålbladlus, mellus og kålmøl**	0,3 L/ha	1	7 dage	BBCH 45-49	70%
Grønkål, palmekål og pak choy	Kålbladlus, mellus og kålmøl**	0,3 L/ha	1	14 dage	BBCH 35-49	75%
Knoldselleri	Bladlus	0,3 L/ha	1	7 dage	BBCH 42-43	60%
Bladselleri	Bladlus	0,3 L/ha	1	7 dage	BBCH 33-49	60%
Løg (kepa-, skalotte- og hvidløg)	Bladlus og trips*	0,3 L/ha	1	21 dage	Fra 9 blad stadiet	65%
Bundtløg	Bladlus og trips*	0,3 L/ha	1	21 dage	Fra 7 blad stadiet	60%
Squash, drueagurk	Bladlus	0,3 L/ha	1	3 dage	BBCH 51-88	70%
Porre	Bladlus, porremøl** og trips*	0,3 L/ha	1	14 dage	BBCH 41-47	70%
Forårsløg	Bladlus og trips*	0,3 L/ha	1	7 dage	BBCH 41-47	60%
Bønner med bælg	Bladlus	0,3 L/ha	1	14 dage	BBCH 69-79	70%
Rucola	Bladlus	0,3 L/ha	1	7 dage	BBCH 33-49	70%

*Begrænset effekt på trips / æglægning (før æggene klækkes)

**Mod sommerfuglelarver (møl m.fl.) er det vigtigt at bekæmpelsen rettes mod æggene og de meget små larver. Bekæmpelse skal derfor foretages ved indflyvning.

19. juni 2017