

# Off-label godkendelse og vejledning i brug af Boxer i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær og aronia

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler §3 og §5, Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003.*

## Ansvar for off-label vejledning

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er nævnt på midlets etikette.

### *Off-label vejledning - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Grøn Plantebeskyttelse ApS udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Grøn Plantebeskyttelse ApS ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

Registreringsindehaveren/producenten kan ikke gøres ansvarlig for evt. skader eller svigtende effekt.

## Vejledning for Boxer i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær og aronia

### *Virkemåde:*

Boxer (prosulfocarb) optages både via bladene og gennem rødderne og virker overfor såvel ny fremspiret ukrudt som overfor spirende ukrudt.

### *Advarsel:*

Læs etiketten.

Off-label brugsanvisningens doseringsanvisninger og anbefalinger skal følges.

## Brugsanvisning for Boxer i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær og aronia

### *Anvendelsesområde:*

Boxer anvendes i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær og aronia til bekæmpelse af ukrudt.

### *Anvendelsestidspunkt og vilkår:*

Etableringsårene:

Boxer må anvendes en gang om foråret før knopbrydning og/eller 1-2 gange om efteråret. Alle behandlinger med afskærmet sprøjtning.

Høstårene:

Boxer må anvendes 1-2 gange om efteråret efter høst med afskærmet sprøjtning. Der er 8 måneders sprøjtefrist.

*Optimale virkningsforhold:*

Let fugtig jord.

*Dosering:*

Der anvendes en dosering på maks. 2,0 l Boxer pr. ha. pr. sprøjtning i 200-400 l vand. Der må maks. anvendes 4 l Boxer pr. ha pr. sæson (år).

-----

*Bemærkning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Flakkebjerg:*

Forskningscenter Flakkebjerg kan anbefale anvendelsen af Boxer efter ovenstående brugsanvisning.

Marts 2011