

## **Brugsanvisning til mindre anvendelse af Callisto (1-185) mod ukrudt i planteskolekulturer på friland**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

### **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

#### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## Vejledning for Callisto (1-185) mod ukrudt i planteskolekulturer på friland

### Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes mod ukrudt i planteskolekulturer på friland.
- Hvis midlet anvendes på frugt bærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg.
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger og sprøjtetidspunkt skal overholdes.
- Ved håndtering af behandlede planter skal der anvendes kemisk bestandige handsker de første 30 dage efter sprøjtning.
- Må på friland ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
- Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra § 3 områder for at beskytte vilde planter.

### Advarsel:

Læs Callisto etiketten

### Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Vandmængde	Antal behandlinger	Behandlings-tidspunkt
Planteskolekulturer	Ukrudt	Max 1,0 L/ha	150-300 L/ha	Max 1	Tidligt forår før knopbrydning

*Sprøjteteknik/udstyr:* Der anvendes alm. marksprøjte med bom.

Callisto skal anvendes tidligt forår før knopbrydning. Der foreligger kun få afprøvninger med Callisto i planteskolekulturer, og der bør derfor altid foretages en prøvesprøjtning på et mindre areal første gang midlet anvendes i en ny kultur eller sort. Vejrforholdene kan ligeledes have stor indflydelse på effekt og skade på kulturen.

Den bedst effekt opnås ved høj lysintensitet og gode vækstbetingelser. Callisto er regnfast efter 1-2 timer. Nye kulturer bør først etableres 4 måneder efter sprøjtning pga risiko for skader på dem.

*Dato:* 18. december 2019