

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Callisto (1-185) mod ukrudt i sukkermajs

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Callisto (1-185) mod ukrudt i suktermajs

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes mod ukrudt i suktermajs
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger og sprøjtetidspunkt skal overholdes
- Må i suktermajs ikke anvendes senere end vækststadiet BBCH 18
- Må på friland ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra § 3 områder for at beskytte vilde planter

Advarsel:

”Læs Callisto etiketten”

Brugsanvisning

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling*	Antal behandlinger	Behandlings-tidspunkt
Suktermajs	Ukrudt	<u>Enkeltbehandling:</u> 1 x 1,5 L/ha Eller <u>Splitbehandling:</u> 2 x 0,75 L/ha	1 Eller 2 (mindst 8 dages interval)	Vækststadiet BBCH 11-18 (fra 1 blad til 8 blade)

* Der må i alt maks. anvendes 1,5 L Callisto/ha pr. vækstår

Sprøjteteknik/udstyr: Der anvendes alm. marksprøjte med bom.

Splitbehandling med 2 x 0,75 l Callisto/ha giver den mest sikre virkning, og den bør altid foretrækkes, når forholdene betinger det.

1. behandling foretages, når ukrudtet har max. 1-2 løvblade.
2. behandling foretages efter fremspiring af nyt ukrudt, og dette har max. 1-2 løvblade; typisk 10-12 dage efter 1. behandling.

Enkeltbehandling med Callisto kan anvendes, hvis ugunstige vejrforhold har medført, at tidspunktet for splitbehandling er overskredet. Der anvendes 1 x 1,5 l/ha når ukrudtet har max. 3-4 løvblade.

Dato: 14. oktober 2019