

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Candit (19-92) mod svampesygdomme i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Hortic Advice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Candit (19-92) mod svampesygdomme i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i pletter i åbne væksthuse

Svampemiddel:

- Må kun anvendes mod meldug, rosenstråleplet og krysantemumrust i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i pletter i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, koncentration af sprøjtevæsken, antal behandlinger og interval skal overholdes
- Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
- Ved anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i pletter på jorden: For at beskytte grundvandet må der på samme areal højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august – 31. juli). Max 3 behandlede kulturer pr. areal pr. vækstår. Max 3 behandlede kulturer pr. areal pr. vækstår
- Ved anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i pletter på jorden uden recirkulering: Pletterne stå helt tæt (pottetæt kultur) eller kulturen skal dække arealet fuldstændigt (dækkende kultur)
- Ved udflytning af behandlede planter til containerplads uden recirkulering: For at beskytte grundvand må der max udflyttes 3 behandlede kulturer pr. areal pr. vækstår ved dyrkning af prydplanter og planteskolekulturer. Udflytning må tidligst foretages 1 dag efter sprøjtning

Advarsel: ”Se Candit etiketten”.

Brugsanvisning

Anvendelse: Mod meldug, rosenstråleplet og krysantemumrust i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i pletter i åbne væksthuse

Afgrøde	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. kultur	Antal behandlede kulturer pr. væksthuseareal pr. vækstår	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til containerplads med eller uden recirkulering.
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i pletter på tætte borde med recirkulation.	0,18 kg/ha pr. kultur. <u>Svarende til:</u> Max. 60 liter 0,03 % opløsning pr. 1000 m ² (= 0,18 kg Candit pr. ha)*	1 (kan fordeles på 1-3 split-behandlinger med min.7 dages interval)	Der sættes ikke en begrænsning såfremt bordene er tætte og der er recirkulation.	Uden recirkulering: 1 dag. Max 3 udflyttede kulturer pr. vækstår pr. areal behandlet med aktivstoffet kresoxim-methyl.
				Med recirkulering: 1 dag.
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i pletter på jorden . Pletterne skal stå så tæt som muligt.	0,18 kg/ha pr. kultur. <u>Svarende til:</u> Max. 60 liter 0,03 % opløsning pr. 1000 m ² (= 0,18 kg Candit pr. ha)*	1 (kan fordeles på 1-3 split-behandlinger med min.7 dages interval)	3	Uden recirkulering: 1 dag. Max 3 udflyttede kulturer pr. vækstår pr. areal behandlet med aktivstoffet kresoxim-methyl.
				Med recirkulering: 1 dag.

*0,03 % opløsning (= 30 g Candit i 100 L vand)

Sprøjteudstyr: Bomsprøjte og lanse/kærresprøjte

Sprøjtetidspunkt:

Der behandles ved behov iht. brugsanvisningen

Risiko for skade:

Ved anvendelse af Candit i nye kulturer og sorter, bør det afprøves på et mindre antal planter først. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.

21. december 2020