

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Conserve (64-51) i væksthuse mod skadedyr i kål til senere udplantning, krydderurter, peberfrugt, rucola og salat

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. GartneriRådgivningen kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Conserve (64-51) i væksthuse mod skadedyr i kål til senere udplantning, krydderurter, peberfrugt, rucoła og salat

Insektmiddel:

- Må kun anvendes i væksthuse i kål til senere udplantning, krydderurter, peberfrugt, rucoła og salat
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes
- Må i krydderurter, peberfrugt, rucoła og salat ikke anvendes senere end 3 dage før høst
- Der må ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak. Plante-materiale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning.

Advarsel:

"Læs Conserve etiketten".

Brugsanvisning for Conserve (64-51) i væksthuse mod skadedyr i kål til senere udplantning, krydderurter, peberfrugt, rucoła og salat

Dosering, skadegører, antal behandlinger, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist

Afgrøde	Skadegører	Dosering pr. behandling	Max antal behandlinger	Sprøjtetidspunkt	Sprøjtefrist (PHI)
Kål til udplantning	Kålfluer	50 ml/1000 planter	1	2-4 blade (BBCH 12-14)	Max 2-4 blade (BBCH 12-14)
Krydderurter	Trips, minérflue, sommerfuglelarver	0,8 L/ha	3 med 7 dages interval	Fra 3 bladstadiet (BBCH 13) til den normale bladmasse/hovedstørrelse er nået (BBCH 49)	3 dage
Rucoła	Trips, minérflue, sommerfuglelarver	0,8 L/ha	3 med 7 dages interval		3 dage
Salat	Trips, minérflue, sommerfuglelarver	0,8 L/ha	3 med 7 dages interval		3 dage
Peberfrugt	Trips, minérflue, sommerfuglelarver	0,8 L/ha	3 med 7 dages interval	Første sideskud synligt (BBCH 21) til første frugt har nået normal størrelse og form (BBCH 71)	3 dage

Mod minérfluer tilsættes 0,5 L/ha Renol

7. april 2017