

## **Brugsanvisning til mindre anvendelse af Conserve (64-51) mod trips og minérfluelarver i lukkede væksthuse i prydplanter til senere udsætning/udplantning på friland eller containerplads**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

### **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

# Vejledning til brug af Conserve (64-51) mod trips og minérfluelarver i lukkede væksthuse i prydplanter til senere udsætning/udplantning på friland eller containerplads

## Insektmiddel:

- Må kun anvendes mod trips og minérfluelarver i lukkede væksthuse i prydplanter til senere udsætning/udplantning på friland eller containerplads med recirkulation
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Ved håndtering af behandlede planter skal der anvendes kemisk bestandige handsker
- Ved udflytning af behandlede planter til friland eller containerplads med recirkulation: For at beskytte grundvand må der max. udflyttes 4 behandlede hold pr. areal pr. år ved dyrkning af prydplanter. Udflytning må tidligst foretages 1 dag efter sprøjtning

## Advarsel:

”Se Conserve etiketten”.

## Brugsanvisning

*Afgrøde:* Prydplanter (der ikke er i blomstring) dyrket i potter i lukkede væksthuse. Der sættes ikke en begrænsning for antal hold pr. væksthuseareal pr. år.

Skadevolder	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. hold	Behandlings-tidspunkt	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til containerplads <sup>1</sup> med recirkulation eller udflytning/udplantning til friland
Trips	1,5 L/ha  Svarende til: Max 200 L 0,075% opløsning pr. 1000 m <sup>2</sup> *	Max 2 (min. 7 dages interval)	Ved behov, dog ikke i blomstrende planter (ikke BBCH 60-69)	1 dag. Max. 4 udflyttede hold behandlet med spinosad pr. areal pr. år.
Minérfluelarver	2,0 L/ha  Svarende til: Max 200 L 0,10% opløsning pr. 1000 m <sup>2</sup> **			

\*0,075 % = 75 mL Conserve pr. 100 L vand

\*\*0,10 % = 100 mL Conserve pr. 100 L vand

*Sprøjteteknik/additiv:* Sprøjter med horisontal sprøjtebom samt sprøjter med lanse.

På etiketten anbefales det ved bekæmpelse af minérfluelarver at tilsætte 0,05 % Renol (= 50 ml pr. 100 L vand). VIGTIGT – læs etikettens afsnit om tålsomhed!

*Tålsomhed/risiko for skade:* Conserve er et skånsomt middel i en række kulturer, hvor det har været afprøvet. Når midlet skal anvendes i en ny kultur eller under nye vækstbetingelser, bør der altid foretages en prøvebehandling først. VIGTIGT – læs etikettens afsnit om tålsomhed.

*Økologi:* Conserve må anvendes i økologisk produktion.

Dato: 23. november 2022

<sup>1</sup> Befæstet udeareal