

Brugsanvisning til mindre anvendelse af DiPel DF (526-13) i jordbær, salat, spinat og krydderurter i åbne og lukkede væksthuse samt i jordbær på tabletop på friland eller i tunneller på friland

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for DiPel DF (526-13) i jordbær, salat, spinat og krydderurter i åbne og lukkede væksthuse samt i jordbær på tabletop på friland eller i tunneller på friland

Insektmiddel:

- Må kun anvendes mod sommerfuglelaver i jordbær, salat, spinat og krydderurter i åbne og lukkede væksthuse samt i jordbær på tabletop på friland eller i tunneller på friland
- Max 3 behandlinger pr. sæson, med 1 kg/ha per behandling
- Brugsanvisningens anvisninger skal overholdes

Advarsel:

”Se DiPel DF etiketten”.

Brugsanvisning for DiPel DF i jordbær, salat, spinat og krydderurter i åbne og lukkede væksthuse samt i jordbær på tabletop på friland eller i tunneller på friland

| Kultur | Skadegørere | Dosering pr. behandling | Antal behandlinger | Behandlings-tidspunkt |
|---|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Jordbær i åbne og lukkede væksthuse, samt på tabletop på friland eller i tunneller på friland | Larver af sommerfugle bl.a. jordbærvikler | Max 1 kg/ha | Max 3 | Ved begyndende angreb, BBCH 09-99 |
| Salat og spinat i åbne og lukkede væksthuse | Larver af sommerfugle bl.a. kålmøl, hvidsværmere og ugler | | | |
| Krydderurter i åbne og lukkede væksthuse | Larver af sommerfugle bl.a. kålmøl | | | |

Vandmængde: Der anvendes fra 400 og op til 2.000 L vand/ha. Sprøjteknik og vandmængde vælges for hver kultur, så der sikres en god dækning af alle relevante plantedele. Typisk anvendes 500-2.000 L vand i væksthuse.

Risiko for skade: Der er ikke rapporteret skade af produktet i de nævnte kulturer, men da dokumentationen ikke nødvendigvis er fyldestgørende, kan det ikke garanteres, at der ikke kan opstå skade.

6. april 2017 revideret 06. maj 2021, opdateret 23. August 2024