

Brugsanvisning for anvendelse af Conserve (reg.nr. 64-51) mod pletvingefrugtfluen i jordbær, hindbær, brombær, blåbær, kirsebær og blomme

Vilkår

Dispensationen til behandlingen gælder i perioden den 1. juni til den 28. september 2023.

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Conserve i ovennævnte afgrøder mod pletvingefrugtfluen (*Drosophila suzukii*). Conserve indeholder aktivstoffet spinosad.

Advarselstekst:

Nedenstående brugsanvisnings doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende og samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50% afdriftsreduktion anvendes ved sprøjtning i blommer og kirsebær

Brugere skal ved sprøjtning anvende handsker og beskyttelsesdragt ved blanding, påfyldning og udbringning i bær.

Brugere skal ved sprøjtning anvende handsker og beskyttelsesdragt ved blanding og påfyldning og sidde i lukket førerkabine med kulfilter og anvende handsker og beskyttelsesdragt ved udbringning i blommer og kirsebær.

Ved håndtering af Conserve behandlede bær efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj og kemisk bestandige handsker og der må maksimalt arbejdes med behandlede bær i 7,5 timer/dag pr. plukker.

Ved håndtering af Conserve behandlede kirsebær og blommer skal der anvendes arbejdstøj og kemisk bestandige handsker og der må maksimalt arbejdes med behandlede kirsebær og blommer i 3 timer om dagen pr. plukker.

Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 15 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

Må i hindbær, brombær og blåbær ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

Må i kirsebær og blomme ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder. Må i jordbær, hindbær, brombær og blåbær ikke anvendes nærmere end 30 meter fra blomstrende afgrøder og i kirsebær og blomme ikke nærmere end 50 meter fra blomstrende afgrøder.

Må i jordbær, hindbær, brombær og blåbær ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte insekter og leddyr.

Må i kirsebær og blomme ikke anvendes nærmere end 40 meter fra §3-områder for at beskytte insekter og leddyr.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Brugsanvisning

Kultur	Skadegører	Max dosering pr. behandling	Max antal behandlinger	Behandlingsinterval	Max antal plukketimer pr. dag pr. plukker	Sprøjtefrist
Jordbær	Pletvingefrugtfluen	0,45 L/ha	3	Min 7 dage	7,5	1 dag
Hindbær og brombær	Pletvingefrugtfluen	0,6 L/ha	2	Min 10 dage	7.5	3 dage
Blåbær	Pletvingefrugtfluen	0,6 L/ha	2	Min 7 dage	7.5	3 dage
Kirsebær og blomme	Pletvingefrugtfluen	0,95 L/ha	1		3,0	7 dage

Udsprøjtning

Conserve er et kontaktmiddel. Effekten sker når insekterne/larverne kommer i berøring med midlet eller via fødeoptagelse. Derfor er det vigtigt, at der anvendes en sprøjteteknik, hvor der opnås en god dækning af planterne.

Bemærkninger

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Farlig for bier

Øvrige vilkår fremgår af den gældende etiket for Conserve (64-51), læs denne grundigt før brug.

Conserve (64-51) må anvendes i økologisk produktion.

Brugsanvisningen er

GODKENDT

1. juni 2023

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

Fraugerska Land