

Brugsanvisning for anvendelse af Conserve (reg.nr. 64-51) mod pletvingefrugtfluen i vindruer, jordbær, hindbær, brombær, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia, hyben, hyld, kirsebær og blomme.

Vilkår

Dispensationen til behandlingen gælder i perioden den 4. juli til den 20. oktober 2019.

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Conserve i ovennævnte afgrøder mod pletvingefrugtfluen (*Drosophila suzukii*). Conserve indeholder aktivstoffet spinosad.

Advarselstekst:

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Ved håndtering af behandlede afgrøder skal der anvendes kemisk bestandige handsker.

Må ved udsprøjtning ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 15 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

Må i buskfrugt, stængelfrugt og vindruer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

Må i hyld, kirsebær og blomme ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder og ikke nærmere end 30 meter fra andre blomstrende afgrøder.

Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra §3-områder for at beskytte insekter og leddyr .

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Brugsanvisning

Kultur	Skadegører	Max dosering pr. behandling	Max antal behandlinger	Behandlingsinterval	Sprøjtefrist
Jordbær	Pletvingefrugtfluen	0,6 l/ha	3	Min 7 dage	1 dag
Kirsebær og blomme	Pletvingefrugtfluen	1,2 l/ha	2	Min 7 dage	7 dage
Hindbær og brombær	Pletvingefrugtfluen	0,8 l/ha	2	Min 10 dage	3 dage
Solbær, ribs, stikkelsbær blåbær, aronia, hyld og hyben	Pletvingefrugtfluen	0,8 l/ha	2	Min 7 dage	3 dage
Vindruer	Pletvingefrugtfluen	0,6 l/ha	3	Min 14 dage	14 dage

Udsprøjtning

Conserve er et kontaktmiddel. Effekten sker når insekterne kommer i berøring med midlet eller via fødeoptagelse. Derfor er det vigtigt, at der anvendes en sprøjteteknik, hvor der opnås en god dækning af planterne.

Bemærkninger

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410)

Farligt for bier

Øvrige vilkår fremgår af den gældende etiket, læs denne grundigt før brug.

Brugsanvisningen er
GODKENDT

Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Tolderlundvej 5
5000 Odense C

Fraeniska Ewald

4. juli 2019