

Brugsanvisning for anvendelse af Vertimec EC (reg.nr. 1-192) mod trips i porrer på arealer med stor forekomst af trips, hvor de tilladte behandlinger med Karate 2,5 WG har været udført.

Behandlingen må gennemføres i perioden fra den 5. juli til den 28. oktober 2019

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Vertimec EC mod trips i porrer på arealer med stor forekomst af trips, hvor de tilladte behandlinger med Karate 2,5 WG har været udført.

Vilkår

Der anvendes maksimalt 0,5 l Vertimec EC pr. ha, som må udbringes højst tre gange med minimum syv dages interval. Der må kun behandles på porrearealer med stor forekomst af trips, hvor de tilladte behandlinger med Karate 2,5 WG har været udført.

Behandlingen må gennemføres i perioden fra den 5. juli til den 28. oktober 2019

Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes nærmere end 10 meter fra blomstrende afgrøder.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte insekter og leddyr.

Udsprøjtning

Selve udsprøjtningen må alene foretages fra en traktor med lukket førerkabine med kulfilter. Vertimec EC er et kontaktmiddel med nogen translaminær virkning. Derfor er det vigtigt, at der anvendes en sprøjteteknik, hvor der opnås en god dækning af planterne. Ved konventionel sprøjteteknik anvendes op til 400 l pr. ha, mens der med luftassisteret sprøjte anvendes ca. 250 l pr. ha. Det anbefales, at der anvendes afdriftsreducerende dyser, fx ISO 05 lavdriftsdyse, som vil give 400 l vand ved 3 bar og 6 km/t.

Sprøjtning foretages enten tidlig morgen eller sen aften, idet midlet nedbrydes i sollys. På dette tidspunkt er planterne også saftspændte og dækket med dug, hvilket øger muligheden for indtrængning af sprøjtevæsken i bladskeuderne.

Bemærkning

Vær opmærksom på, at Vertimec EC er klassificeret med flere forskellige sundhedseffekter og miljøeffekter, som det fremgår af den gældende etiket. Læs denne grundigt før brug.

Brugsanvisningen er
GODKENDT

Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Tolderlundvej 5
5000 Odense C

Frøen

5. juli 2019