

Brugsanvisning for anvendelse af Vertimec (reg.nr. 1-192) mod trips i porrer på arealer med stor forekomst af trips, hvor de tilladte behandlinger med Lamdex har været udført.

Behandlingen må gennemføres i perioden fra den 1. juli til den 28. oktober 2021

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Vertimec EC mod trips (*Limothrips cerealium*) i porrer på arealer med stor forekomst af trips, hvor de tilladte behandlinger med Lamdex har været udført.

Vilkår

Der anvendes maksimalt 0,5 L Vertimec EC pr. ha, som må udbringes højst tre gange med minimum syv dages interval. Der må kun behandles på porrearealer med stor forekomst af trips, hvor de tilladte behandlinger med Lamdex har været udført.

Behandlingen må gennemføres i perioden fra den 1. juli til den 28. oktober 2021

Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

Brugere skal anvende handsker og arbejdstøj ved blanding, påfyldning og udbringning og afdriftsreducerende udstyr ved udbringning.

Ved håndtering af behandlede porrer på friland skal der anvendes arbejdstøj og kemisk bestandige handsker.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Ved samtidig brug af afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion, da ikke nærmere end 5 meter.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i biernes flyvetid fra kl. 03 til kl. 21.

Fjern blomstrende ukrudt i marken inden sprøjtning.

For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes nærmere end 20 meter fra marker med blomstrende afgrøder.

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3 områder for at beskytte leddyr.

Udsprøjtning

Vertimec EC er et kontaktmiddel med nogen translaminær virkning. Derfor er det vigtigt, at der anvendes en sprøjteteknik, hvor der opnås en god dækning af planterne. Ved konventionel sprøjteteknik anvendes op til 400 L vand pr. ha, mens der med luftassisteret sprøjte anvendes ca. 250 L vand pr. ha. Det anbefales, at der anvendes afdriftsreducerende dyser, fx ISO 05 lavdriftsdyse, som vil give 400 L vand ved 3 bar og 6 km/t. Sprøjtning foretages enten tidlig morgen eller sen aften, idet midlet nedbrydes i sollys. På dette tidspunkt er planterne også saftspændte og dækket med dug, hvilket øger muligheden for indtrængning af sprøjteevasken i bladskederne.

Bemærkning

Farligt for bier. Vær opmærksom på, at Vertimec EC er klassificeret med flere forskellige sundhedseffekter og miljøeffekter, som det fremgår af den gældende etiket. Læs denne grundigt før brug.

Brugsanvisningen er
GODKENDT

Miljø- og Fødevarerministeriet
Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

Frauniska Lind

30. juni 2021