

# Brugsanvisning til mindre anvendelse af Floramite 240 SC (558-5) til bekæmpelse af spindemider i solbær, ribs, hindbær og brombær i væksthus og på friland

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Grøn Plantebeskyttelse ApS kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

# Vejledning for Floramite 240 SC (558-5) til bekæmpelse af spindemider i solbær, ribs, hindbær og brombær i væksthuse og på friland

## *Insektmiddel:*

- Må kun anvendes i solbær, ribs, hindbær og brombær i væksthuse og på friland til bekæmpelse af spindemider
- Til anvendelse på friland: Bær beskyttelseshandsker ved opblanding og udsprøjtning.
- Til anvendelse i væksthuse: Bær beskyttelseshandsker ved opblanding. Ved håndtering og plukning af solbær, ribs, hindbær og brombær i væksthuse, skal der anvendes kemisk bestandige handsker.
- Ikke senere end 7 dage før høst
- Max 2 behandlinger pr. sæson - minimum 7 dage mellem behandlinger
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

## *Advarsel:*

"Se Floramite 240 SC etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

# Brugsanvisning for Floramite 240 SC (558-5) til bekæmpelse af spindemider i solbær, ribs, hindbær og brombær i væksthuse og på friland

## *Skadegører: Spindemider*

## *Dosering:*

Floramite 240 SC	Dosis l/ha
Max dosering pr. sprøjtning	0,45

## *Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:*

Der behandles når de første spindemider konstateres. I kulturer med tæt løv, hvor det er vanskeligt at ramme spindemiderne, skal behandlingen gentages efter 7 dage.

Ved korrekt brug har Floramite hurtig virkning som kontaktmiddel og derudover en langtidsvirkning. Floramite har generelt god virkning mod spindemider, men virkningen er bedst dokumenteret for væksthusspindemiden (*Tetranychus urticae*) Floramite bekæmper alle mobile stadier, men der er desuden også en rimelig virkning på æg. Ramte mider bliver hyperaktive efter få timer og tager ikke føde til sig. De dør efter 3-4 dage.

På friland anvendes traktormonterede specialproduceret tågesprøjte, der afsætter væsken inde i buskene.

I væksthuse anvendes, mellem rækkerne, selvkørende sprøjte der sprøjter ind i buskene.

## *Antal behandlinger:*

Max 2 behandlinger pr. sæson.

## *Risiko for skade:*

Floramite 240 SC er uskadelig for bier og humlebier samt relativt uvirksom mod nytteinsekter. Derfor er produktet anvendeligt i integreret produktion (IP).

11. maj 2015