

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Floramite 240 SC (558-5) til bekæmpelse af spindemider i agurk og tomat i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. HorticAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Floramite 240 SC (558-5) til bekæmpelse af spindemider i agurk og tomat i åbne væksthuse

Midemiddel:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af spindemider i agurk og tomat i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, koncentration af sprøjtevæsken, antal behandlinger og interval skal overholdes
- Må i tomat og agurk ikke anvendes senere end 1 dag før høst
- Ved anvendelse i agurk og tomat: For at beskytte grundvandet må der på samme areal højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august – 31. juli). Max 2 behandlede kulturer pr. areal pr. vækstår.

Advarsel:

”Se Floramite 240 SC etiketten”.

Brugsanvisning

Anvendelse: Til bekæmpelse af spindemider i åbne væksthuse.

Afgrøde	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. kultur	Antal behandlede kulturer pr. væksthuseareal pr. vækstår	Sprøjtefrist
Tomat og agurk dyrket i jorden , uden recirkulering. Eller i vækstmedieblokke , som står på jorden.	0,6 L/ha <u>Svarende til:</u> Max. 150 liter 0,040 % opløsning pr. 1000 m ² (= 0,6 L Floramite 240 SC pr. ha) *	Max 2 (min. 7 dages interval)	Max 2 kulturer pr. vækstår pr. areal behandlet med aktivstoffet bifenazate.	1 dag

*0,04 % opløsning (= 40 ml Floramite 240 SC i 100 L vand)

Sprøjteudstyr: Vertikal sprøjtebom.

Sprøjtetidspunkt:

Der behandles ved behov i hht. brugsanvisningen

Forebyggelse af resistens:

Hvis Floramite 240 SC anvendes mere end én gang skal midlet indgå i en strategi, hvor der imellem behandlingerne anvendes et spindemiddel med en anden virkemekanisme (f.eks. Nissorun 250 SC) for at forebygge resistens. Tjek altid godkendelsesstatus og følg brugsanvisningen for andre midler.

Risiko for skade:

Læs etiketten.